الرياضيات البحتة

الصف الثالث الثانوى

كتاب الطالب

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم

٢٠٢٦-٢٠٢٧م

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

الاســـم : .....

الفـــصل : .....

المدرســة: .....

إعداد

أ/ كمال يونس كبشة

أ.د/ عفاف أبو الفتوح صالح

أ / سيرافيم إلياس اسكندر

أ.د/ محمد حسين فهمى

أ / أسامة جابر عبد الحافظ

أ/ إبراهيم عبد اللطيف الصغير

مراجعة وتعديل

د/ محمد محى عبد السلام

أ / شريف عاطف البرهامى

أ/ ماجد محمد حسن

د / مدحت عطية شعراوى

د/ محمد عبد العاطى حجاج

أ/ سمير محمد سعداوى

أ/ عثمان مصطفى عثمان

إشراف علمى

أ/ منال عزقول - مستشار الرياضيات

إشراف تربوى

د/ أكرم حسن - رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج

رقم الإيـــداع ٢٠١٦ / ٨٧٠٥

الرقم الدولى 978 - 977 - 706 - 033 - 2

nezakr.natega4dk.net

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدنا ونحن نقدم هذا الكتاب أن نوضح الفلسفة التى تم فى ضوئها بناء المادة التعليمية ونوجزها فيمايلى:

١ تنمية وحدة المعرفة وتكاملها فى الرياضيات، ودمج المفاهيم والترابط بين كل مجالات الرياضيات المدرسية.

٢ تزويد المتعلم بما هو وظيفى من معلومات ومفاهيم وخطط لحل المشكلات.

٣ تبنّى مدخل المعايير القومية للتعليم فى مصر والمستويات التعليمية وذلك من خلال:

أ) تحديد ما ينبغى على المتعلم أن يتعلمه ولماذا يتعلمه.

ب) تحديد مخرجات التعلم بدقة، وقد ركزت على مايلى:

أن يظل تعلم الرياضيات هدف يسعى المتعلم لتحقيقه طوال حياته – أن يكون المتعلم محبًّا للرياضيات ومبادرًا بدراستها – أن يكون المتعلم قادرًا على العمل منفردًا أو ضمن فريق – أن يكون المتعلم نشطًا ومثابرًا ومواظبًا ومبتكرًا – أن يكون المتعلم قادرًا على التواصل بلغة الرياضيات.

٤ اقتراح أساليب وطرق للتدريس وذلك من خلال كتاب (دليل المعلم).

٥ اقتراح أنشطة متنوعة تتناسب مع المحتوى ليختار المتعلم النشاط الملائم له.

٦ احترام الرياضيات واحترام المساهمات الإنسانية منها على مستوى العالم والأمة والوطن، وتعرف مساهمات وإنجازات العلماء المسلمين والعرب والأجانب.

وفى ضوء ما سبق روعى فى هذا الكتاب ما يلى:

★ يتضمن كتاب الرياضيات البحتة: الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل، وتم تقسيم الكتاب إلى وحدات متكاملة ومترابطة لكل منها مقدمة توضح مخرجات التعلم المستهدفة ومخطط تنظيمى لها والمصطلحات الواردة بها باللغة العربية والإنجليزية، ومقسمة إلى دروس يوضح الهدف من تدريسها للطالب تحت عنوان سوف تتعلم، ويبدأ كل درس من دروس كل وحدة بالفكرة الأساسية لمحتوى الدرس وروعى عرض المادة العلمية من السهل إلى الصعب ويتضمن مجموعة من الأنشطة التى تتناول الربط بالمواد الأخرى والحياة العملية والتى تناسب القدرات المختلفة للطلاب وتراعى الفروق الفردية من خلال بند اكتشف الخطأ لمعالجة بعض الأخطاء الشائعة لدى الطلاب وتؤكد على العمل التعاونى، وتتكامل مع الموضوع كما يتضمن الكتاب بعض القضايا المرتبطة بالبيئة المحيطة وكيفية معالجتها.

★ كما قدم فى كل درس أمثلة تبدأ من السهل إلى الصعب، وتشمل مستويات تفكير متنوعة، مع تدريبات عليها تحت عنوان حاول أن تحل وينتهى كل درس ببند «تمارين» وتشمل مسائل متنوعة تتناول المفاهيم والمهارات التي درسها الطالب في الدرس.

وأخيرًا .نتمنى أن نكون قد وفقنا فى إنجاز هذا العمل لما فيه خير لأولادنا، ولمصرنا العزيزة.

والله من وراء القصد، وهو يهدى إلى سواء السبيل

nezakr.natega4dk.net

المحتويات

أولاً: الجـــبـر و الهندسة الفراغية

الوحدة الأولى: نظرية ذات الحدين

١ – ١ نظرية ذات الحدين بأس صحيح موجب ٤

١ – ٢ إيجاد الحد المشتمل على س ك من مفكوك ذات الحدين ١٣

١ – ٣ النسبة بين حدين متتاليين من مفكوك ذات الحدين ١٨

الوحدة الثانية: الأعداد المركبة

٢ – ١ الصورة المثلثية للعدد المركب ٢٤

٢ – ٢ نظرية ديموافر ٣٦

٢ – ٣ الجذور التكعيبية للواحد الصحيح ٤١

الوحدة الثالثة: الهندسة والقياس فى بعدين وثلاثة أبعاد

٣ – ١ النظام الإحداثي المتعامد في ثلاثة أبعاد ٤٨

٣ – ٢ المتجهات في الفراغ ٥٤

٣ – ٣ ضرب المتجهات ٦٣

الوحدة الرابعة: الخطوط المستقيمة والمستويات فى الفراغ

٤ – ١ معادلة المستقيم فى الفراغ ٨٠

٤ – ٢ معادلة المستوى فى الفراغ ٩٠

nezakr.natega4dk.net

المحتويات

ثانياً: التفاضل والتكامل

متطلبات قبلية فى التفاضل والتكامل ١٠٤

الوحدة الأولى: الاشتقاق وتطبيقاته

١ – ١ الاشتقاق الضمنى والبارامترى ١٠٨

١ – ٢ المشتقات العليا للدالة ١١٣

١ – ٣ مشتقات الدوال الأسية واللوغارتمية ١١٧

١ – ٤ المعدلات الزمنية المرتبطة ١٢٨

الوحدة الثانية: سلوك الدالة ورسم المنحنيات

٢ – ١ تزايد وتناقص الدوال ١٣٨

٢ – ٢ القيم العظمى والصغرى (القيم القصوى). ١٤٢

٢ – ٣ دراسة المنحنيات ١٤٨

٢ – ٤ تطبيقات على القيم العظمى والصغرى ١٥٨

الوحدة الثالثة: التكامل المحدد وتطبيقاته

٣ – ١ تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية ١٦٦

٣ – ٢ طرق التكامل ١٧٢

٣ – ٣ التكامل المحدد ١٨٢

٣ – ٤ تطبيقات على التكامل المحدد ١٨٩

نتيجة نت

nezakr.natega4dk.net

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net


أولاً: الجبر والهندسة الفراغية

nezakr.natega4dk.net

الجـــبـر

الوحدة الأولى

نظرية ذات الحدين
Binomial theorem



مقدمة الوحدة

وُلِد نصر الدين الطوسى (١٢٠١م - ١٢٧٤م) بجهرود، قُرب طوس الواقعة فى إيران، من أسرة علم وفلسفة، تتلمذ على يدى كمال الدين الموصلى ومعين الدين المصرى، فدرس عليهما الحكمة والفلسفة وعلم الفلك والرياضيات، له باع طويل فى حساب عدد الإمكانات لحدوث الظواهر المختلفة، كما استخدم التباديل والتوافيق، وكان لكاردن (١٥٠١م -١٥٧٦م) اهتمامات فى حساب عدد الإمكانات بطريقة مبدأ العد الأساسى، مما أتاح له مجالاً كبيرًا فى معمارية الحاسوب (Computer Architecture) وهى عبارة عن تصميم وبنية العمليات الوظيفية للحاسوب، وتتناول هذه الوحدة مبدأ العد والعلاقة بين التباديل والتوافيق واستخداماتها فى حل بعض المشكلات الرياضية، وتعرف على نظرية ذات الحدين، وحل بعض التطبيقات الرياضية والحياتية عليها.

أهداف الوحدة

فى نهاية هذه الوحدة، وبعد تنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن:

- يتعرف نظرية ذى الحدين بأس صحيح موجب.
- يستنتج الحد العام فى مفكوك ذى الحدين.
- يستنتج النسبة بين كل حد والحد السابق له فى مفكوك ذى الحدين.
- يوجد معامل أى حد فى مكفوك ذى الحدين وفقًا لرتبة هذا الحد.
- يوجد معامل أى قوة للمتغير س فى مفكوك $(س+ص)^{ن}$
- يوجد الحد الخالى من س فى مفكوك $(س + ص)^{ن}$
- يوجد معامل أكبر حد فى مفكوك ذى الحدين
- يوجد الحد الأوسط فى مفكوك ذى الحدين عندما ن عدد زوجى والحدان الأوسطان عندما ن عدد فردى.
- يستنتج علاقات بين التوافيق مستخدمًا مفكوك ذى الحدين
- يستنتج العلاقة بين مثلث باسكال ومعاملات مفكوك ذى الحدين، ويستنتج بعض الأنماط فى مثلث باسكال.
- يحل تطبيقات رياضية وحياتية متنوعة على نظرية ذى الحدين.

nezakr.natega4dk.net

مصطلحات أساسية

- نظرية ذات الحدين — *Binomial Theorem*

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية — *Scientific calculator*

دروس الوحدة

الدرس (١ - ١): نظرية ذات الحدين بأس صحيح موجب

الدرس (١ - ٢): إيجاد الحد المشتمل على س^{ك} من مفكوك ذات الحدين

الدرس (١ - ٣): النسبة بين حدين متتاليين من مفكوك ذات الحدين

مخطط تنظيمي للوحدة



nezakr.natega4dk.net

١ - ١ نظرية ذات الحدين بأُسٍّ صحيح موجب

Binomial theorem for positive integer power

سوف تتعلم

- الربط بين مثلث باسكال ومعاملات مفكوك ذى الحدين.
- الصورة العامة لمفكوك $(س + أ)^{ن}$ حيث ن $\in$ صـ$^{+}$
- الصورة العامة للحد العام ح$_{ر+١}$ من مفكوك $(س + أ)^{ن}$
- رتبة وقيمة الحد الأوسط والحدين الأوسطين

مصطلحات أساسية

- مفكوك — The expansion
- ذات حدين — Binomial
- الحد العام — The general term
- الحد الأوسط — The middle term

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية — Scientific calculator
- برامج رسومية — Graphical programs

فكر و ناقش

نعلم أن:

$(س + أ)^{١} = س + أ$

$(س + أ)^{٢} = س^{٢} + ٢س أ + أ^{٢}$

ويمكن استنتاج أن:


$(س + أ)^{٣} = س^{٣} + ٣س^{٢} أ + ٣س أ^{٢} + أ^{٣}$

$(س + أ)^{٤} = س^{٤} + ٤س^{٣} أ + ٦س^{٢} أ^{٢} + ٤س أ^{٣} + أ^{٤}$

- ما العلاقة بين عدد الحدود وقيمة الأس؟
- ما العلاقة بين قوى المتغيرين س ، أ فى كل حد من حدود المفكوك؟
- ماذا تلاحظ عن معاملات الحدود فى كل حدود المفكوك؟
- هل يمكن استخدام مثلث باسكال للتعبير عن المعاملات؟
- حاول استنتاج قاعدة إيجاد مفكوك $(أ + ب)^{ن}$

مثلث باسكال *Pascal triangle*

لاحظ أن: معاملات المفكوك تتبع نمطًا يمثله مثلث باسكال



- ويمكن كتابة عناصر مثلث باسكال باستخدام التوافيق كما فى الشكل التالى:

nezakr.nategа4dk.net



بملاحظة الصف الثانى مثلا من مثلث باسكال نلاحظ أن ١، ٢، ١ تمثل $و_{٠}^{٢}$، $و_{١}^{٢}$، $و_{٢}^{٢}$ على الترتيب وأن مجموع هذه العناصر $و_{٠}^{٢}$، $و_{١}^{٢}$، $و_{٢}^{٢}$ تمثل عدد المجموعات الجزئية التى يمكن تكوينها من مجموعة تحتوى على عنصرين حيث

$و_{٠}^{٢} + و_{١}^{٢} + و_{٢}^{٢} = ٤ = ٢^{٢}$

١
١ ١
١ ٢ ١

المجموعة {س ، ص} مجموعاتها الجزئية ϕ ، {س} ، {ص}، {س ، ص}

وبالمثل فإن: مجموع عناصر الصف الثالث

$و_{٠}^{٣}$، $و_{١}^{٣}$ ، $و_{٢}^{٣}$ ، $و_{٣}^{٣}$ تمثل عدد المجموعات الجزئية التى نحصل عليها من مجموعة تحتوى على ٣ عناصر وعدد هذه المجموعات ٨ = $٢^{٣}$

١
١ ١
١ ٢ ١
١ ٣ ٣ ١

أى $و_{٠}^{٣} + و_{١}^{٣} + و_{٢}^{٣} + و_{٣}^{٣} = ٢^{٣}$

وعلى وجه العموم إذا كان لدينا مجموعة عدد عناصرها ن فإن عدد المجموعات الجزئية التى يمكن الحصول عليها منها = $٢^{ن}$ أى $و_{٠}^{ن} + و_{١}^{ن} + و_{٢}^{ن} + ... + و_{ن}^{ن} = ٢^{ن}$

تعبير شفهى: بالاستعانة بمثلث باسكال

١) أوجد معاملات (أ + ب)⁶ على صورة توافيق.

٢) أوجد معاملات (أ + ب)⁵ على صورة توافيق.

تعلم

مفكوك ذى الحدين

إذا كان أ ، س ∈ ع ، ن ∈ صـ⁺ يكون:

١ - $(س + أ)^{ن} = س^{ن} + و_{١}^{ن} س^{ن-١} أ + و_{٢}^{ن} س^{ن-٢} أ^{٢} + ... + أ^{ن}$

٢ - $(س - أ)^{ن} = س^{ن} - و_{١}^{ن} س^{ن-١} أ + و_{٢}^{ن} س^{ن-٢} أ^{٢} - ... + (-أ)^{ن}$

ملاحظات على مفكوك ذى الحدين $(س + أ)^{ن}$

١) عدد حدود المفكوك (ن + ١) حدًا

٢) المفكوك مرتب حسب قوى س تنازليًا ومرتب حسب قوى أ تصاعديًا.

٣) مجموع قوى س وقوى أ فى أى حد يساوى ن.

٤) دليل و فى أى حد من حدود المفكوك يقل واحدًا صحيحًا عن رتبة ذلك الحد.

مثال
كتابة مفكوك ذات الحدين

(١) اكتب مفكوك $(٢س + ٣ص)^{٤}$

الحل

$(٢س + ٣ص)^{٤} = (٢س)^{٤} + {}^{٤}و_{١}(٢س)^{٣}(٣ص) + {}^{٤}و_{٢}(٢س)^{٢}(٣ص)^{٢} + {}^{٤}و_{٣}(٢س)(٣ص)^{٣} + (٣ص)^{٤}$

$= ١٦س^{٤} + ٩٦س^{٣}ص + ٢١٦س^{٢}ص^{٢} + ٢١٦س ص^{٣} + ٨١ص^{٤}$

حاول أن تحل

(١) اكتب مفكوك:

أ $(٣س + ص)^{٥}$ ب $(س^{٢} - ١)^{٦}$

حالات خاصة من مفكوك ذى الحدين:

أ $(١ + س)^{ن} = ١ + {}^{ن}و_{١}س + {}^{ن}و_{٢}س^{٢} + ... + س^{ن}$

ب $(١ - س)^{ن} = ١ - {}^{ن}و_{١}س + {}^{ن}و_{٢}س^{٢} - ... + (-س)^{ن}$

مثال

(٢) اكتب مفكوك $(١ + س)^{٦}$ ، ثم استخدم ذلك فى إيجاد قيمة عددية للمقدار: ${}^{٦}و_{٠} + {}^{٦}و_{١} + {}^{٦}و_{٢} + ... + {}^{٦}و_{٦}$

الحل

$(١ + س)^{٦} = ١ + {}^{٦}و_{١}س + {}^{٦}و_{٢}س^{٢} + {}^{٦}و_{٣}س^{٣} + {}^{٦}و_{٤}س^{٤} + {}^{٦}و_{٥}س^{٥} + س^{٦}$

بوضع س = ١ فى الطرفين

$(١ + ١)^{٦} = ١ + {}^{٦}و_{١} + {}^{٦}و_{٢} + {}^{٦}و_{٣} + ... + ١$

$٦٢ = {}^{٦}و_{٠} + {}^{٦}و_{١} + {}^{٦}و_{٢} + {}^{٦}و_{٣} + ... + {}^{٦}و_{٦}$

الحد العام من مفكوك ذات الحدين

The general term of the expansion of binomial

فى مفكوك $(س + ص)^{ن} = س^{ن} + {}^{ن}و_{١}س^{ن-١}ص + {}^{ن}و_{٢}س^{ن-٢}ص^{٢} + ... + ص^{ن}$

لاحظ أن $ع_{٢} = {}^{ن}و_{١}س^{ن-١}ص^{١}$ ، $ع_{٣} = {}^{ن}و_{٢}س^{ن-٢}ص^{٢}$

وبالمثل يكون: $ع_{٩} = {}^{ن}و_{٨}س^{ن-٨}ص^{٨}$

وبفرض الحد العام $ع_{ر+١}$ حيث $٠ \leq ر \leq ن$ فإن حيث $ع_{ر+١}$ يمكن كتابته على الصورة:

$$ع_{ر+١} = {}^{ن}و_{ر}(س)^{ن-ر}(ص)^{ر}$$

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٣) من مفكوك $(س + \frac{٢}{س})^{٨}$ أوجد معامل الحد السادس

الحل

$ع_٦ = {}^{٨}و_٥ (س)^{٣} (\frac{٢}{س})^{٥} = {}^{٨}و_٥ \times ٢^{٥} س^{-٢} = ١٧٩٢ س^{-٢}$

ومعامل هذا الحد = ١٧٩٢

لاحظ معامل $ع_{ر+١} = {}^{ن}و_{ر}$ (معامل الحد الأول)$^{ن-ر}$ (معامل الحد الثانى)^{ر}

حاول أن تحل

(٢) فى مفكوك $(٢س + \frac{١}{٢})^{٧}$، أوجد كل من $ع_٣$ ، $ع_٧$ حسب قوى س التنازلية، و إذا كان $ع_٣ = ع_٧$ ، أوجد قيمة س

مثال

(٤) من مفكوك $(٣س^{٢} - \frac{١}{٢س})^{١٣}$ ، أوجد الحد العاشر من النهاية.

الحل

الحد العاشر من النهاية فى مفكوك $(٣س^{٢} - \frac{١}{٢س})^{١٣}$ هو الحد العاشر من البداية فى مفكوك $(\frac{-١}{٢س} + ٣س^{٢})^{١٣}$

$ع_{١٠} = {}^{١٣}و_{٩} (\frac{-١}{٢س})^{٤} (٣س^{٢})^{٩} = \frac{٧١٥ \times ٣^{٩}}{٢^{٤}} س^{١٤}$

حل آخر

لاحظ أنه يمكن حساب رتبة الحد العاشر من النهاية فى مفكوك $(٣س^{٢} - \frac{١}{٢س})^{١٣}$، وتكون رتبته مساوية

$١٤ - ١٠ + ١ = ٥$

ويكون $ع_{١٠}$ من النهاية هو $ع_٥$ من البداية $ع_٥ = {}^{١٣}و_{٤} (٣س^{٢})^{٩} (\frac{-١}{٢س})^{٤} = \frac{٧١٥ \times ٣^{٩}}{٢^{٤}} س^{١٤}$

حاول أن تحل

(٣) من مفكوك $(٢س - \frac{١}{٣س^{٢}})^{١١}$ أوجد الحد الرابع من النهاية:

قاعدة

١) $(س + أ)^{ن} + (س - أ)^{ن} = ٢ (ع_١ + ع_٣ + ع_٥ + ...)$

٢) $(س + أ)^{ن} - (س - أ)^{ن} = ٢ (ع_٢ + ع_٤ + ع_٦ + ...)$ من حدود $(س + أ)^{ن}$

مثال

(٥) أوجد فى ابسط صورة $(س + ٢)^{٦} + (س - ٢)^{٦}$

الحل

$(س + ٢)^{٦} + (س - ٢)^{٦} = ٢ (ع_١ + ع_٣ + ع_٥ + ع_٧)$

$= ٢ (س^{٦} + {}^{٦}و_{٢} س^{٤} \times ٢^{٢} + {}^{٦}و_{٤} س^{٢} \times ٢^{٤} + ٦^{٢}) = ٢ (س^{٦} + ٦٠ س^{٤} + ٢٤٠ س^{٢} + ٦٤)$

حاول أن تحل

٤) أوجد فى أبسط صورة $(١ + \sqrt{س})^{٥} - (١ - \sqrt{س})^{٥}$

مثال

٦) من مفكوك $(٣ + س)^{١١} - ١١ و_{١} (٣ + س)^{١٠} (١ - ٢س) + ١١ و_{٢} (٣ + س)^{٩} (١ - ٢س)^{٢} - \ldots\ldots - (١ - ٢س)^{١١}$

أوجد الحد الخامس حسب قوى س التصاعدية.

الحل

المقدار يمثل مفكوك $[(٣ + س) - (١ - ٢س)]^{١١} = (٢ + ٣س)^{١١}$

ويكون:

$ع_{٥} = ١١ و_{٤} (٢)^{٧} (٣س)^{٤} = ٣٣٠ \times ٢^{٧} \times ٣^{٤} س^{٤} = ٣٤٢١٤٤٠ س^{٤}$

حاول أن تحل

٥) من مفكوك $(١ - س)^{٨} + ٢٤ س (١ - س)^{٧} + ٢٥٢ س^{٢} (١ - س)^{٦} + \ldots\ldots + ٦٥٦١ س^{٨}$ ، أوجد القيمة العددية للحد السادس حسب قوى س التصاعدية عندما س = ٢

مثال

٧) إذا كان $(١ + جـ س)^{ن} = ١ + ٢٠ س + أ_{١} س^{٢} + أ_{٢} س^{٣} + \ldots\ldots + أ_{ن-١} س^{ن}$

وكان $١٦ أ_{١} = ٣ أ_{٢}$ أوجد قيمة كل من ن، جـ حيث جـ ≠ ٠

الحل

$(١ + جـ س)^{ن} = ١ + {}^{ن}و_{١} جـ س + {}^{ن}و_{٢} جـ^{٢} س^{٢} + {}^{ن}و_{٣} جـ^{٣} س^{٣} + \ldots\ldots$

$\therefore {}^{ن}و_{١} جـ = ٢٠ \quad \therefore ن جـ = ٢٠ \quad \therefore جـ = \frac{٢٠}{ن}$ (١)

$\therefore ١٦ \times {}^{ن}و_{٢} جـ^{٢} = ٣ \times {}^{ن}و_{٣} جـ^{٣} \quad \therefore ١٦ \times {}^{ن}و_{٢} = ٣ \times {}^{ن}و_{٣} جـ$ (٢)

بالتعويض من (١) فى (٢)

$\therefore ١٦ \times {}^{ن}و_{٢} = ٣ \times {}^{ن}و_{٣} \times \frac{٢٠}{ن}$

$\therefore ١٦ ن = ٣ \times \frac{{}^{ن}و_{٣}}{{}^{ن}و_{٢}} \times ٢٠$

$\therefore ١٦ن = \frac{ن - ٢}{٣} \times ٢٠ \quad \therefore ن = ١٠$

بالتعويض فى المعادلة (١)

$\therefore جـ = \frac{٢٠}{١٠} = ٢$

حاول أن تحل

٦) من مفكوك $(١ + جـ س)^{١٠}$ إذا كان معامل الحد الثالث يساوى ١٨٠، وكان الحد الخامس يساوى ٢١٠ أوجد قيمة كل من جـ ، س حيث جـ عدد صحيح موجب.

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٨) (أ) أثبت أن $\frac{{}^{ن}و_{ر}}{{}^{ن-١}و_{ر-١}} = \frac{ن}{ر}$

(ب) إذا كانت النسبة بين $ع_{٦}$ من مفكوك $(س + \frac{١}{س})^{١٥}$، $ع_{٥}$ من مفكوك $(س - \frac{١}{س^{٣}})^{١٤}$ تساوى $\frac{٨}{٩}$ أوجد قيمة س

الحل

$${}^{ن}و_{ر} \div {}^{ن-١}و_{ر-١} = \frac{|ن}{|ر \; |ن-ر} \times \frac{ر \; |ر-١ \; |ن-ر+١}{|ن-١} = \frac{ن \; |ن-١ \; |ر-١}{ر \; |ر-١ \; |ن-١} = \frac{ن}{ر}$$

$$\frac{ع_{٦} \text{ من } (س + \frac{١}{س})^{١٥}}{ع_{٥} \text{ من } (س - \frac{١}{س^{٣}})^{١٤}} = \frac{{}^{١٥}و_{٥} \; س^{١٠} \; (\frac{١}{س})^{٥}}{{}^{١٤}و_{٤} \; س^{١٠} \; (\frac{-١}{س^{٣}})^{٤}} = \frac{٨}{٩}$$

$\therefore ٣س^{٣} = \frac{٨}{٩}$ $\therefore س^{٣} = \frac{٨}{٢٧}$ $\therefore س = \frac{٢}{٣}$

الحد الأوسط فى مفكوك $(س + أ)^{ن}$

The middle term

فى مفكوك $(س + أ)^{ن}$ نجد أن عدد حدود المفكوك = ن + ١

أولًا: إذا كانت ن عددًا زوجيًّا، فإن عدد حدود المفكوك هو عدد فردى، و يوجد للمفكوك حد أوسط وحيد رتبته

$$\frac{ن + ٢}{٢} = (\frac{ن}{٢} + ١)$$

ثانيًا: إذا كانت ن عددًا فرديًّا، فإن عدد حدود المفكوك هو عدد زوجى، و يوجد للمفكوك حدان أوسطان رتبتاهما

$$\frac{ن + ١}{٢} \text{ ، } \frac{ن + ٣}{٢}$$

مثال

(٩) أوجد الحد الأوسط فى مفكوك $(٢س + \frac{١}{٢س^{٣}})^{١٢}$

الحل

رتبة الحد الأوسط $= \frac{١٢}{٢} + ١ = ٧$

$$ع_{٧} = {}^{١٢}و_{٦} \; (٢س)^{٦} \; (\frac{١}{٢س^{٣}})^{٦} = {}^{١٢}و_{٦} \; (٢)^{٦} \; (\frac{١}{٢})^{٦} \; س^{٦ - ١٢} = {}^{١٢}و_{٦} \; س^{-٦}$$

حاول أن تحل

(٧) أوجد الحد الأوسط من مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{٢س})^{١٠}$ ، و إذا كانت قيمة هذا الحد $= \frac{٢٨}{٢٧}$ أوجد قيمة س

مثال

(١٠) أوجد الحدين الأوسطين فى مفكوك $(\frac{س^{٢}}{٣} + \frac{٣}{س})^{١٥}$

الحل

رتبة الحدين الأوسطين تساوى $\frac{١٥ + ١}{٢}$ والذى يليه أى $ع_{٨}$ ، $ع_{٩}$

$ع_{٨} = {}^{١٥}و_{٧}\left(\frac{س^{٢}}{٣}\right)^{٨}\left(\frac{٣}{س}\right)^{٧} = {}^{١٥}و_{٧} \times ٣^{٨-٧} \times س^{١٦-٧} = {}^{١٥}و_{٧} \times \frac{١}{٣}س^{٩} = ٢١٤٥س^{٩}$

$ع_{٩} = {}^{١٥}و_{٨}\left(\frac{س^{٢}}{٣}\right)^{٧}\left(\frac{٣}{س}\right)^{٨} = {}^{١٥}و_{٨} \times ٣^{٨-٧} \times س^{١٤-٨} = {}^{١٥}و_{٨} \times ٣س^{٦} = ١٩٣٠٥س^{٦}$

حاول أن تحل

(٨) إذا كان الحدان الأوسطان من مفكوك $(٣س + ٢ص)^{١٣}$ متساويين فأثبت أن $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{٣}$

مثال

(١١) أوجد الحد الأوسط من مفكوك $(٣ + ٢س)^{٨} + (٣ - ٢س)^{٨}$

الحل

المفكوك $= ٢(ع_{١} + ع_{٣} + ع_{٥} + ع_{٧} + ع_{٩})$

∴ الحد الأوسط $= ٢ع_{٥}$

$= ٢ \times {}^{٨}و_{٤}(٣)^{٤}(٢س)^{٤} = ١٨١٤٤٠س^{٤}$

حاول أن تحل

(٩) أوجد الحد الأوسط أو الحدين الأوسطين من مفكوك $\left(\sqrt{٢}س + \frac{١}{\sqrt{٢}س}\right)^{١٠} + \left(\sqrt{٢}س - \frac{١}{\sqrt{٢}س}\right)^{١٠}$

تمـارين (١ - ١)

اختر الإجابة الصحيحة:

(١) إذا كان رتبتا الحدان الأوسطان فى مفكوك $(س + ص)^{ن}$ هما ٨،٧ فإن ن تساوى:

أ) ١٣ ب) ١٥

جـ) ١٦ د) ٥٦

(٢) إذا كان $١ + ٥س + \frac{٥ \times ٤}{١ \times ٢}س^{٢} + \frac{٥ \times ٤ \times ٣}{١ \times ٢ \times ٣}س^{٣} + ... + س^{٥} = ١٠٢٤$ فإن س تساوى:

أ) ١ ب) ٢

جـ) ١٠ د) ٣

(٣) مجموع معاملات حدود مفكوك $(س^{٢} - \frac{١}{س})^{٧}$ يساوى:

أ) $٢^{٧}$ ب) $٢^{٥}$

جـ) $٢^{٦}$ د) صفر

nezakr.nategа4dk.net

(٤) معامل الحد الخامس من مفكوك $(١ + ٢س)^{١٠}$.

أ) $١٦^{١٠}و_{٥}$ ب) $\frac{١}{١٦}{}^{١٠}و_{٥}$

جـ) $١٦^{١٠}و_{٤}$ د) $\frac{١}{١٦}{}^{١٠}و_{٤}$

(٥) فى مفكوك ذى الحدين إذا كان الحد العام هو $^{١٢}و_{ر}\,س^{٢٤-٤ر}$ يكون الحد المشتمل على $س^{١٢}$ هو:

أ) $ع_{٣}$ ب) $ع_{٤}$

جـ) $ع_{٥}$ د) لايوجد

(٦) إذا كان الحدان الأوسطان من مفكوك $(أ + ٢ب)^{٢ن+١}$ متساويين فإن:

أ) $\frac{أ}{ب} = \frac{١}{٢}$ ب) $أ = ٤ب$

جـ) $أ = ٨ب$ د) $أ = ٢ب$

(٧) إذا كان الحد الأوسط فى مفكوك $(\frac{أ^{٢}}{٣} + \frac{ب}{أ})^{٨ن}$ هو الحد التاسع فإن ن تساوى:

أ) ١ ب) ٢

جـ) ٣ د) ٤

(٨) فى مفكوك $(١ + ب س)^{٩}$ يكون معامل الحد السادس هو:

أ) $^{٩}و_{٥}$ ب) $^{٩}و_{٦}$

جـ) $^{٩}و_{٥}ب^{٥}$ د) $^{٩}و_{٦}ب^{٦}$

(٩) فى مفكوك ذى الحدين لدينا ٧ حدود موجبة، ٦ حدود سالبة فإن المقدار يكون على الصورة:

أ) $(أ - ب)^{١٢}$ ب) $(أ - ب)^{١٣}$

جـ) $(أ + ب)^{١٢}$ د) $(أ - ب)^{١٣}$

ثانيًا : أجب عما يأتى:

(١٠) إذا كان $١ + ٨س + {}^{٨}و_{٢}\,س^{٢} + ... + س^{٨} = ٢٥٦$ أوجد قيمة س

(١١) أوجد قيمة س التى تحقق $(١ + \sqrt{٣})^{٦} - (١ - \sqrt{٣})^{٦} = ٤٨٠\sqrt{٣}$ س

(١٢) باستخدام المفكوك : $(١ + س)^{١٠} = ١ + {}^{١٠}و_{١}\,س + {}^{١٠}و_{٢}\,س^{٢} + ... + س^{١٠}$ أثبت أن:

أ) $١ + {}^{١٠}و_{١} + {}^{١٠}و_{٢} + ... + {}^{١٠}و_{١٠} = ٢^{١٠}$ ب) $١ - {}^{١٠}و_{١} + {}^{١٠}و_{٢} - ..... + {}^{١٠}و_{١٠} =$ صفر

(١٣) اكتب مفكوك كلًّا من :

أ) $(\frac{٢}{س} + \frac{س}{٢})^{٤}$ ب) $(س - \frac{١}{س})^{٥}$

جـ) $(س + \sqrt{٢})^{٤} + (س - \sqrt{٢})^{٤}$ د) $(\sqrt{٣} + ٢س)^{٥} - (\sqrt{٣} - ٢س)^{٥}$

(١٤) من مفكوك $(١ + س)^{ن}$ حسب قوى س التصاعدية إذا كان $ع_{٣} = ٢٨س^{٢}$ ، $ع_{٥} = ١١٢٠$ أوجد قيمة كل من: ن، س

(١٥) من مفكوك $(١ + س)^{ن}$ إذا كان معامل الحد السادس يساوى معامل الحد العاشر أوجد قيمة ن.

(١٦) من مفكوك $(أ س + ب)^{١٠}$ حسب قوى س التنازلية إذا كان معامل $ع_{٦} = \frac{٦٣}{٨}$ اثبت ان ٢ أب = ١

(١٧) من مفكوك $(٢س^{٢} + \frac{١}{٢س})^{١٢}$ أوجد الحد الأوسط.

(١٨) من مفكوك $(\frac{س^{٢}}{٢} - \frac{٢}{س})^{١١}$ أوجد الحدين الأوسطين.

(١٩) من مفكوك $س^{٤}(س - \frac{١}{س})^{٩}$ حسب قوى س التنازلية، أوجد الحد الرابع من النهاية.

(٢٠) إذا كان الحد الأوسط من مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{٢س})^{١٠}$ يساوى $\frac{٢٨}{٢٧}$ فأوجد قيمة س.

(٢١) أوجد النسبة بين الحد الأوسط والحد الخامس من مفكوك $(\frac{٢س}{٣} + \frac{٣}{٢س})^{١٠}$ ، ثم أوجد القيمة العددية للنسبة عندما س = ٣

(٢٢) إذا كانت النسبة بين الحد الخامس من مفكوك $(س + \frac{١}{س})^{١٥}$ والحد الرابع من مفكوك $(س - \frac{١}{٢س})^{١٤}$ تساوى ١٦- : ١٥ أوجد قيمة س

nezakr.natega4dk.net

٢ - ١ إيجاد الحد المشتمل على س^{ك} من مفكوك ذات الحدين

Finding the term contain x^R in the expansion of binomial

سوف تتعلم

- استخدام الحد العام فى إيجاد الحد المشتمل على س^{ك} والحد الخالى من س .
- إيجاد معامل الحد المشتمل على س^{ك} من المفكوك .
- إيجاد معامل أكبر قوة لـ س.

مصطلحات أساسية

- حد عام — General term
- حد خالٍ من س — term Free of x
- أكبر قوة — Heightest power
- معامل حد — Coefficient

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية — Scientific calculator

فكر و ناقش

تعلمنا فى الدرس السابق أن :

$$(س^{٢} - \frac{١}{٢س})^{٢٠} = (س^{٢})^{٢٠} - {}^{٢٠}و_{١}(س^{٢})^{١٩}(\frac{١}{٢س}) + {}^{٢٠}و_{٢}(س^{٢})^{١٨}(\frac{١}{٢}س)^{٢} - {}^{٢٠}و_{٣}(س^{٢})^{١٧}(\frac{١}{٢س})^{٣} + \ldots\ldots + (\frac{-١}{٢س})^{٢٠}$$

هل من السهل أن نُوجِد الحد المشتمل على س^{١٦} أو س^{٢٤} أو الحد الخالى من س أو بدون الاسترسال فى كتابة حدود المفكوك؟

نجد أن طريقة البحث بإيجاد المفكوك تكون شاقة؛ ولهذا لإيجاد الحد المشتمل على س^{ك} من المفكوك نتبع الآتى :

١- نفترض أن هذا الحد هو الحد العام ع$_{ر+١}$ ونوجد هذا الحد بدلالة ر.

٢- نوجد مجموع قوى س فى الحد العام بدلالة ر ونضع هذا المجموع مساويًا للقوة المطلوبة ك، ومنها نوجد ر التى تحقق احتواء هذا الحد على القوة المطلوبة ك ولدينا:

(أ) ر ∈ ط يكون ر + ١ هو الحد المطلوب.

(ب) ر ∉ ط لا يوجد حد يحتوى على القوة المطلوبة من المفكوك.

فى حالة البحث عن الحد الخالى من س نضع مجموع قوى س من الحد العام = صفر

مثال

(١) من مفكوك $(\frac{٣س}{٢} + \frac{٢}{٣س})^{١١}$ أوجد معامل س فى هذا المفكوك .

الحل

$$ع_{ر+١} = {}^{١١}و_{ر}(\frac{٣س}{٢})^{١١-ر}(\frac{٢}{٣س})^{ر} = {}^{١١}و_{ر}(\frac{٣}{٢})^{١١-ر}(\frac{٢}{٣})^{ر}س^{١١-٢ر}$$

وبمقارنة القوى $س^{١١-٢ر} = س^{١}$

$١١ - ٢ر = ١$ ⟹ $ر = ٥$

الحد المطلوب هو الحد السادس. معامل $ع_{٦} = {}^{١١}و_{٥}(\frac{٣}{٢})^{٦}(\frac{٢}{٣})^{٥} = ٦٩٣$

حاول أن تحل

(١) أوجد معامل $س^{٨}$ فى مفكوك $(\frac{٢س}{٣} - \frac{٣}{س})^{١٢}$

مثال

(٢) من مفكوك $(٢س - \frac{١}{٢س^{٢}})^{٩}$ أوجد :

(أ) معامل $س^{٣}$ (ب) الحد الخالى من س

(جـ) أثبت أن المفكوك لا يحتوى على حد يشتمل على $س^{٢}$

الحل

$ع_{ر+١} = {}^{٩}ق_{ر} (٢س)^{٩-ر} (\frac{-١}{٢س^{٢}})^{ر} = {}^{٩}ق_{ر} (-١)^{ر} (٢)^{٩-٢ر} س^{٩-٣ر}$

(أ) لإيجاد معامل $س^{٣}$

$س^{٩-٣ر} = س^{٣}$ $\quad ٩ - ٣ر = ٣$ $\quad ر = ٢$

الحد الثالث يحتوى على $س^{٣}$

معامل $ع_{٣} = {}^{٩}ق_{٢} \times ٢^{٥} = ٣٦ \times ٣٢ = ١١٥٢$

(ب) لإيجاد الحد الخالى من س $\quad ٩ - ٣ر = صفر$ $\quad ر = ٣$

الحد المطلوب هو $ع_{٤} = {}^{٩}ق_{٣} (-١)^{٣} (٢)^{٣} = -٦٧٢$

(جـ) بوضع $٩ - ٣ر = ٢$ $\quad \therefore ٣ر = ٧$ $\quad \therefore ر = \frac{٧}{٣} \notin ط$

∴ هذا المفكوك لا يشتمل على $س^{٢}$

حاول أن تحل

(٢) (أ) أوجد الحد الخالى من س فى مفكوك $(٢س^{٢} - \frac{١}{س})^{١٢}$

(ب) أوجد معامل $س^{-١٠}$ فى مفكوك $(\frac{س^{٢}}{٣} - \frac{٢}{س^{٢}})^{١٥}$

(جـ) من مفكوك $(أ س + \frac{١}{ب س})^{١٠}$ حسب قوى س التنازلية إذا كان الحد الخالى من س يساوى معامل الحد السابع، أثبت أن $٦أ = ٥ب$

مثال

(٣) إذا كان ن عددًا صحيحًا موجبًا أثبت أنه لا يوجد حدٌّ خالٍ من س من مفكوك $(س^{٥} + \frac{١}{س^{٢}})^{ن}$ إلا عندما ن مضاعف للعدد ٧ ثم أوجد هذا الحد فى حالة ن = ٧

nezakr.nateg4dk.net

الحل

$ح_{ر+١} = ن_{و_ر} (س^{٥})^{ن-ر} (\frac{١}{٢س})^{ر} = ن_{و_ر} س^{٥ن-٧ر}$

$س^{٥ن-٧ر} = س^{صفر}$ ٥ن - ٧ر = صفر ∴ $ر = \frac{٥ن}{٧}$ ∋ ط

$\frac{٥ن}{٧}$ ∋ ط عندما ن مضاعف للعدد ٧

عندما ن = ٧ ∴ ر = ٥ الحد الخالى من س هو $ح_{٦}$

$ح_{٦} = ^{٧}و_{٥} = ٢١$

حاول أن تحل

(٣) من مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{س})^{ن٣}$ أوجد :

(أ) معامل الحد الذى يحتوى على $س^{ن٣}$

(ب) إذا كانت ن = ٦، أوجد النسبة بين معامل الحد الذى يشتمل على $س^{ن٣}$ ومعامل الحد الأوسط

مثال

(٤) من مفكوك $(٢ + \frac{س}{٣})^{٩}$ أوجد قيمة س التى تجعل الحدين الأوسطين متساويين.

الحل

رتبة الحدين الأوسطين $\frac{٩+١}{٢}$ والذى يليه أى $ح_{٥}$ ، $ح_{٦}$

∵ $ح_{٥} = ح_{٦}$ ∴ $^{٩}و_{٤} (٢)^{٥} (\frac{س}{٣})^{٤} = ^{٩}و_{٥} (٢)^{٤} (\frac{س}{٣})^{٥}$

$\frac{س}{٣} = ٢$ ∴ س = ٦

تمـــاريـن الدرس (١ - ٢)

اختر الإجابة الصحيحة:

(١) الحد المشتمل على $س^{٤}$ فى مفكوك $(١ + ٢س)^{١٠}$ يساوى:

(أ) $^{١٥}و_{٤}$ (ب) $\frac{١}{١٦} ^{١٠}و_{٤}$ (ج) $١٦ ^{١٠}و_{٤}$ (د) $٣٢ \times ^{١٠}و_{٥}$

(٢) فى مفكوك $(س + \frac{١}{س})^{١٠}$ يكون الحد الخالى من س هو:

(أ) $ح_{٤}$ (ب) $ح_{٥}$ (ج) $ح_{٦}$ (د) لايوجد حد خال من س

(٣) فى مفكوك $س^{٣} (١ + س)^{٧}$ يكون معامل الحد المشتمل على $س^{٤}$ هو:

(أ) $^{٧}و_{٤}$ (ب) $^{٧}و_{٣}$ (ج) $^{٧}و_{١}$ (د) ٢١

(٤) فى مفكوك $(س^{٢} + \frac{٢}{س})^{٦}$ يكون الحد الخالى من س هو الحد

أ الثالث. ب الرابع. ج الخامس. د لا يوجد حد خال من س

(٥) فى مفكوك $(أس^{٢} + \frac{١}{أس})^{١١}$ إذا كان معاملا $س^{٤}$، $س^{٧}$ متساويين فإن أ =

أ ١ ب -١ ج ±١ د ±٢

(٦) إذا كان الحد الخال من س فى مفكوك $(س + \frac{١}{س})^{ن}$ هو $ع_{٧}$ فإن ن =

أ ٦ ب ١٠ ج ١٢ د ٨

(٧) فى مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{أس})^{٨}$ إذا كان معامل الحد الأوسط يساوى معامل $س^{٧}$ فإن أ =

أ $\frac{٤}{٥}$ ب $\frac{-٤}{٥}$ ج $\frac{-٥}{٤}$ د $\frac{٥}{٤}$

(٨) فى مفكوك $(أ س + \frac{١}{ب س})^{١٠}$ حسب قوى س التنازلية إذا كان الحد الخالي من س يساوى معامل الحد السابع فإن:

أ أ ب = $\frac{٦}{٥}$ ب أ ب = $\frac{٥}{٦}$ ج أ ب = $\frac{٣٦}{٢٥}$ د أ ب = $\frac{٢٥}{٣٦}$

(٩) الحد الخالى من س فى مفكوك $(٢ س + \frac{١}{٣س})^{٨}$

أ ٣٥ ب ١٤٠ ج ٧٠ د ٥٦

(١٠) فى مفكوك $(١ + أ س)^{٧}$ حسب قوى س التصاعدية إذا كان معامل $ع_{٥} = ٥٦٠$ فإن أ =

أ ٢ ب ٤ ج ±٢ د ±٤

اجب عن الاسئلة الآتية :

(١١) فى مفكوك $(٤س^{٢} + \frac{١}{٣س})^{١٢}$ أوجد الحد الخالى من س

(١٢) أوجد معامل $س^{١٢}$ فى مفكوك $س^{٢} (\frac{س^{٢}}{٢} + \frac{٢}{٣س})^{١٥}$

(١٣) إذا كان الحد السادس فى مفكوك $(٢ س - \frac{١}{٣س})^{ن}$ حسب قوى س التنازلية خاليًا من س، أوجد قيمة ن، ثم ابحث هل احد حدود هذا المفكوك يشتمل على $س^{-٦}$ أم لا؟

(١٤) فى مفكوك $(٢ س - \frac{١}{س^{٢}})^{٩}$ أوجد :

أولًا: معامل $س^{٣}$ **ثانيًا:** الحد الخالى من س

ثالثًا: أثبت أن هذا المفكوك لا يحتوى على حد يشتمل على $س^{٢}$

(١٥) أثبت أن $ن و_{ر} : ن-١ و_{ر-١} = \frac{ن}{ر}$ وإذا كانت النسبة بين معامل $ع_{١١}$ فى مفكوك $(١ + س^{٢})^{ن}$ ومعامل $ع_{١٠}$ فى مفكوك $(١ - ص)^{ن-١}$ تساوى ٣- : ٢ أوجد قيمة ن.

(١٦) أوجد معامل $(\frac{س}{ص})^{٤}$ من مفكوك $(\frac{٢س}{ص} + \frac{ص}{٢س})^{١٠}$

(١٧) أوجد معامل $س^{ن}$ فى مفكوك $(١ + س)^{٢ن}$ ، ثم أثبت أنه يساوى ضعف معامل $س^{ن}$ من مفكوك $(١ + س)^{٢ن-١}$

nezakr.nateg4dk.net

(١٨) فى مفكوك $(س + \frac{١}{س})^{٢ن}$ أثبت أن الحد الخالى من س هو الحد الأوسط، ثم أوجد قيمة هذا الحد عندما ن = ٨

(١٩) فى مفكوك $(س^{ك} + \frac{١}{س})^{٦}$ حيث ك عدد صحيح موجب .أوجد :

أولا: قيمة ك التى تجعل للمفكوك حدًّا خاليًا من س

ثانيًا: النسبة بين الحد الخالى من س ومعامل الحد الأوسط لأكبر قيمة من قيم ك التى حصلت عليها من أولًا.

(٢٠) فى مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{أس})^{١٢}$ إذا كانت النسبة بين الحد الخالى من س ومعامل $س^{٣}$ من هذا المفكوك تساوى ٥ : ١٦ ، أوجد قيمة أ ثم أوجد قيمة الحد الأوسط عندما س = ٢.

(٢١) فى مفكوك $(٢س^{٢} + \frac{أ}{س^{٣}})^{١٠}$ إذا كان معامل $س^{٥}$ يساوى معامل $س^{١٥}$ أوجد قيمة أ.

(٢٢) فى مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{٨س})^{١٣}$ حسب قوى س التنازلية :

أولًا: أثبت أنه لا يوجد حد خالٍ من س **ثانيًا:** إذا كان $ع_{٤} = ع_{١١}$ أوجد قيمة س

(٢٣) فى مفكوك $(س + \frac{١}{س^{٢}})^{٩}$ أوجد:

اولًا: رتبة وقيمة الحد الخالى من س

ثانيا: قيمة س التى تجعل مجموع الحدين الأوسطين فى المفكوك يساوى صفر.

(٢٤) أوجد قيمة الحد الخالى من س فى مفكوك $(٩س^{٢} + \frac{١}{٣س})^{٩}$، ثم أوجد قيمة س التى تجعل الحدين الأوسطين متساويين.

(٢٥) فى مفكوك $(س^{٢} + \frac{١}{س})^{٣ن}$ اثبت أن الحد الخالى من س يساوى معامل الحد الذى يحتوى على $س^{٣ن}$ ، و إذا كانت ن = ٦ فاوجد النسبة بين الحد الخالى من س ومعامل الحد الأوسط.

١ - ٣ النسبة بين حدين متتاليين من مفكوك ذات الحدين

سوف تتعلم
- إيجاد النسبة بين حدين متتاليين.
- إيجاد النسبة بين معاملي حدين متتاليين.

مصطلحات أساسية
- حدان متتاليان Consecutive terms

الأدوات المستخدمة
- آلة حاسبة علمية
Scientific calculator

من مفكوك $(س + ا)^{ن}$ وبفرض أن الحدين المتتاليين هما $ع_{ر}$ ، $ع_{ر+١}$

$$\frac{ع_{ر+١}}{ع_{ر}} = \frac{\text{ن}_{ر}\,(س)^{ن-ر}\,(ا)^{ر}}{\text{ن}_{ر-١}\,(س)^{ن-ر+١}\,(ا)^{ر-١}}$$

$$= \frac{\text{ن}_{ر}}{\text{ن}_{ر-١}} \times \frac{ا}{س}$$

$$= \frac{\lfloor ن}{\lfloor ر \lfloor ن - ر} \times \frac{\lfloor ر - ١ \lfloor ن - ر + ١}{\lfloor ن} \times \frac{ا}{س}$$

$$= \frac{\lfloor ر - ١ \lfloor (ن - ر + ١)}{ر \lfloor ر - ١ \lfloor ن - ر} \times \frac{ا}{س}$$

$$\frac{ع_{ر+١}}{ع_{ر}} = \frac{ن - ر + ١}{ر} \times \frac{\text{الحد الثاني}}{\text{الحد الأول}}$$

ويكون : $\frac{\text{معامل } ع_{ر+١}}{\text{معامل } ع_{ر}} = \frac{ن - ر + ١}{ر} \times \frac{\text{معامل الحد الثاني}}{\text{معامل الحد الأول}}$

مثال

(١) من مفكوك $(س + ٢ص)^{١٢}$ أوجد كلًّا من :

أ $\frac{ع_{٣}}{ع_{٢}}$ ب $\frac{\text{معامل } ع_{٧}}{\text{معامل } ع_{٨}}$ جـ $\frac{ع_{٦}}{ع_{٤}}$ د $\frac{\text{معامل } ع_{٨}}{\text{معامل } ع_{٦}}$

الحل

أ $\frac{ع_{٣}}{ع_{٢}} = \frac{١٢ - ٢ + ١}{٢} \times (\frac{٢ص}{س})$

$= \frac{١١}{٢} \times \frac{٢ص}{س} = \frac{١١ص}{س}$

ب $\frac{\text{معامل } ع_{٧}}{\text{معامل } ع_{٨}} = \frac{٧}{١٢ - ٧ + ١} \times \frac{١}{٢} = \frac{٧}{١٢}$

جـ $\frac{ع_{٦}}{ع_{٤}} = \frac{ع_{٦}}{ع_{٥}} \times \frac{ع_{٥}}{ع_{٤}}$

$= \frac{١٢ - ٥ + ١}{٥} \times (\frac{٢ص}{س}) \times \frac{١٢ - ٤ + ١}{٤} (\frac{٢ص}{س})$

$= \frac{٨}{٥} \times \frac{٢ص}{س} \times \frac{٩}{٤} \times \frac{٢ص}{س} = \frac{٧٢ ص^{٢}}{٥ س^{٢}}$

nezakr.nategа4dk.net

د) $\frac{\text{معامل } ع_{٨}}{\text{معامل } ع_{٦}} = \frac{\text{معامل } ع_{٨}}{\text{معامل } ع_{٧}} \times \frac{\text{معامل } ع_{٧}}{\text{معامل } ع_{٦}}$

$= \frac{١٢ - ٧ + ١}{٧} \times \frac{٢}{١} \times \frac{١٢ - ٦ + ١}{٦} \times \frac{٢}{١}$

$= \frac{٦}{٧} \times \frac{٢}{١} \times \frac{٧}{٦} \times \frac{٢}{١} = ٤$

حاول أن تحل

(١) من مفكوك $(س^{٢} + \frac{٢}{س})^{٨}$

أولاً: أوجد النسبة بين الحدين الخامس والسادس، و إذا كانت هذه النسبة تساوى ٨ : ٢٥ أوجد قيمة س

ثانيًا: أثبت أن هذا المفكوك لا يحتوى على حد خالٍ من س

مثال

(٢) من مفكوك $(س + ص)^{٨}$ إذا كان $٢ ع_{٥} = ع_{٤} + ع_{٦}$ أوجد $\frac{س}{ص}$ عدديًّا.

الحل

$ع_{٤} + ع_{٦} = ٢ ع_{٥}$ بالقسمة على $ع_{٥}$

$\frac{ع_{٤}}{ع_{٥}} + \frac{ع_{٦}}{ع_{٥}} = ٢$

$\frac{٤}{١ + ٤ - ٨} (\frac{س}{ص}) + \frac{٨ - ٥ + ١}{٥} (\frac{ص}{س}) = ٢$

$\frac{٤س}{٥ص} + \frac{٤ص}{٥س} = \frac{٢}{١}$ بالضرب × ٥ س ص

$٤س^{٢} + ٤ص^{٢} = ١٠ س ص$

$٤س^{٢} - ١٠ س ص + ٤ص^{٢} = صفر$ ÷ ٢

$٢س^{٢} - ٥ س ص + ٢ ص^{٢} = ٠$

$(٢ س - ص) (س - ٢ ص) = ٠$

$٢ س = ص$ أو $س = ٢ ص$

$\frac{س}{ص} = \frac{١}{٢}$ أو $\frac{س}{ص} = \frac{٢}{١}$

حاول أن تحل

(٢) من مفكوك $(\sqrt{س} + \frac{١}{س})^{٨}$ إذا كان $ع_{٤}، ع_{٥}، ٢٥ ع_{٧}، ع_{٦}$ متتابعة أوجد قيمة س

مثال

(٣) إذا كانت معاملات ثلاثة حدود متتالية من مفكوك $(١ + س)^{ن}$ هى ٣٥ ، ٢١، ٧ حسب قوى س التصاعدية، أوجد قيمة كل من ن و رتب الحدود الثلاثة.

الحل

بفرض $ع_{ر}، ع_{ر+١}، ع_{ر+٢}$ هي الحدود المطلوبة

$\frac{\text{معامل } ع_{ر+١}}{\text{معامل } ع_{ر}} = \frac{ن - ر + ١}{ر} = \frac{٢١}{٣٥}$

$٥ ن - ٥ ر + ٥ = ٣ ر$

$٥ ن - ٨ ر = -٥$ (١)

$\frac{\text{معامل } ع_{ر+٢}}{\text{معامل } ع_{ر+١}} = \frac{ن - (ر + ١) + ١}{ر + ١} = \frac{٧}{٢١}$

$\frac{ن - ر}{ر + ١} = \frac{١}{٣}$

$\frac{ن - ر + ١}{ر} = \frac{٣}{٥}$

٣ن - ٣ ر = ر + ١ ، ٣ن - ٤ ر = ١ (٢)

وبحل المعادلتين: (١) ، (٢) ∴ ن = ٧ ، ر = ٥

حاول أن تحل

(٣) إذا كانت الحدود: الثالث ، الرابع ، الخامس من مفكوك (س + ص)^ن هى على الترتيب ١١٢، ٤٤٨ ، ١١٢٠ ، أوجد قيم كل من ن، ص، س

مثال

إيجاد أكبر حد

(٤) أوجد أكبر حد فى مفكوك (س +ص)^١٠ عندما س = ٢ ، ص = ٣

الحل

∵ $\frac{ع_{ر+١}}{ع_ر} = \frac{١٠ + ١ - ر}{ر} \times \frac{٣}{٢}$ ∴ $\frac{ع_{ر+١}}{ع_ر} = \frac{١١ - ر}{ر} \times \frac{٣}{٢} = \frac{٣٣ - ٣ر}{٢ر}$

أولًا: $\frac{٣٣ - ٣ر}{٢ر} \leqslant ١$ ∴ ٣٣ - ٣ر ≤ ٢ر ∴ ٣٣ ≤ ٥ر ∴ ر ≥ ٦,٦

من ذلك نستنتج أن ع٧ > ع٦ > ع٥ > ..... > ع١

ثانيًا: $\frac{٣٣-٣ر}{٢ر} \geqslant ١$ ∴ ٣٣ - ٣ر ≥ ٢ر ∴ ٣٣ ≥ ٥ر ∴ ر ≤ ٦,٦

من ذلك نستنتج أن ع١١ < ع١٠ < ع٩ < ع٨ < ع٧

∴ ع٧ هو أكبر حد فى مفكوك (س +ص)^١٠ ويساوي ١٠ق٦ س^٤ ص^٦ = ٢٤٤٩٤٤٠

تمـــارين (١-٣)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) فى مفكوك (س+ص)^١٠ الحد التاسع : الحد الثامن تساوى .....

أ) $\frac{٣ص}{٨س}$ ب) $\frac{٣س}{٨ص}$

جـ) $\frac{٨ص}{٣س}$ د) $\frac{٨س}{٣ص}$

(٢) فى مفكوك (١ - س)^١٢ معامل الحد السادس : معامل الحد الخامس .....

أ) $(\frac{٨}{٥})$ ب) $\frac{٥}{٨}$

جـ) $\frac{-٨}{٥}$ د) $\frac{-٥}{٨}$

(٣) فى مفكوك (س + ص)^٨ تكون نسبة $\frac{ع_٦}{ع_٤}$ = ...

أ) $\frac{٢٥ ص^٢}{١٦ س^٢}$ ب) $\frac{٢٥س^٢}{١٦ ص^٢}$

جـ) ١ د) $\frac{ص^٢}{س^٢}$

nezakr.nategа4dk.net

٤ في مفكوك (أ - ٢ب)^{١١} إذا كانت النسبة بين الحدين الأوسطين على الترتيب تساوى $\frac{-٣}{٢}$ فإن أ : ب = ...

أ) ٩ : ٤ ب) ٤ : ٩

جـ) ١ د) -١

ثانيًا : أجب عن الأسئلة الآتية:

٥ من مفكوك $(٢س^{٢} + \frac{٣}{س^{٣}})^{١١}$ أوجد كلًّا من:

أ) $\frac{ع_{٣}}{ع_{٢}}$ ب) $\frac{ع_{٤}}{ع_{٥}}$

جـ) $\frac{ع_{٦}}{ع_{٨}}$ د) $\frac{\text{معامل } ع_{٤}}{\text{معامل } ع_{٦}}$

٦ في مفكوك $(١ + س)^{١٢}$ إذا كان $ع_{٣} = ٢ع_{٢}$ فأوجد قيمة س .....

٧ في مفكوك $(أ + ب)^{ن}$ إذا كان $ع_{٢} = ٢٤٠$ ، $ع_{٣} = ٧٢٠$ ، $ع_{٤} = ١٠٨٠$ فأوجد قيمة كلًّا من أ ، ب ، ن


٨ إذا كانت $ع_{٢}$: $ع_{٣}$ من مفكوك $(أ + ب)^{ن}$ تساوى النسبة بين $ع_{٣}$: $ع_{٤}$ من مفكوك $(أ + ب)^{ن + ٣}$ فأوجد قيمة ن

٩ في مفكوك $(١ + م س)^{ن}$ إذا كانت $٤ع_{٦} = ٧ع_{٨}$، $\frac{ع_{٤}}{ع_{٦}} = \frac{١}{٤}$ ملاحظة وذلك عندما س = ١ فأوجد قيمة كل من م ، ن

١٠ أوجد عدديًا اكبر حد في مفكوك $(٣ - ٥س)^{١٥}$ عندما س = $\frac{١}{٥}$.

١١ في مفكوك $(س + ص)^{ن}$ حسب قوى س التنازلية إذا كان الحد الثاني وسط حسابى بين الحد الأول والحد الثالث عندما س = ٢ ص فأوجد قيمة ن.

الوحدة الثانية



الأعداد المركبة
Complex numbers

مقدمة الوحدة

يعد (جان روبير أرجاند) من أعلام الرياضيين البارزين، وهو أول من درس الأعداد المركبة complex numbers تفصيليًا واستخدمها فى إثبات أن لجميع المعادلات الجبرية جذورًا سواء حقيقية أم تخيلية، وتمثل الأعداد المركبة بالشكل أو المخطط المعروف بمخطط Argand Diagram تكريمًا للعالم الفرنسى أرجاند، إما بنقطة (س، ص) حيث س العدد الحقيقى على المحور السينى، وتمثل ص العدد التخيلى على المحور الصادى أو بكمية متجهه (Vector) مقدارها يساوى $\sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$ واتجاهها ظا$^{-١}$ $\frac{ص}{س}$. كما ستعرف فى هذه الوحدة علي الجذور التكعيبية للواحد الصحيح وحل تطبيقات على الأعداد المركبة التى تدخل فى حياتنا كالكهرباء والديناميكا والنظرية النسبية ، وميادين الفيزياء المختلفة ، وهذه الأعداد هى أعداد مرنة لها القدرة على الوصول إلى النتيجة النهائية بشكل مرض.

أهداف الوحدة

فى نهاية الوحدة وبعد تنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على أن:

- يمثل العدد المركب ومرافقه بيانيًا بنقاط (أزواج مرتبه) فى مستوى إحداثى
- يحدد المقياس والسعة للعدد المركب.
- يتعرف السعة الأساسية للعدد المركب.
- يتعرف الصور المثلثية للعدد المركب.
- يتعرف نظرية ديموافر وتطبيقاتها.
- يستنتج الجذور النونية لأى عدد مركب.
- يعبر عن جا ن θ، جتا ن θ بدلالة النسب المثلثية للزاوية ومضاعفاتها.
- يتعرف مفكوك جا θ، وجتا θ كمتسلسلات.
- يستنتج قانون أويلر من خلال المتسلسلات.
- يتعرف ويطبق طرق التحويل بين الصور المختلفة للعدد المركب.
- يتعرف الجذور التكعيبية للواحد الصحيح.
- يتعرف المقياس والسعة لحاصل ضرب عددين مركبين ولخارج قسمتهما.
- يجرى العمليات الأساسية على العدد المركب فى الصورة المثلثية.
- يحل تطبيقات على الجذور التكعيبية للواحد الصحيح.
- يستخدم الأعداد المركبة فى حل المشكلات الرياضية.
- يستخدم بعض برامج الحاسوب فى حل مشكلات رياضية تتضمن أعدادًا مركبة.
- يستنتج خواص عمليتى الجمع والضرب على الأعداد المركبة.
- يستنتج خواص العددين المترافقين.
- يستنتج خواص الجذور التكعيبية للواحد الصحيح

nezakr.nategа4dk.net

مصطلحات أساسية

مستوى أرجاند	*Argand plane*	صور مثلثة	*Trigonmetric form*	جذر تكعيبى	*cubic root*		
مرافق	*conjugate*	نظرية ديموافر	*De Moivre's thearem*	دائرة الوحدة	*Unitcircle*		
مقياس	*Modulus*	جذر	*root*	قطبى	*Polar*		
سعة أساسية	*principle omplitude*	جذر تربيعى	*square root*				


الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية

دروس الوحدة

الدرس (٢-١): الصورة المثلثية للعدد المركب
الدرس (٢-٢): نظرية ديموافر
الدرس (٢-٣): الجذور التكعيبية للواحد الصحيح

مخطط تنظيمى للوحدة




nezakr.natega4dk.net

١-٢ الصورة المثلثية للعدد المركب

Polar form of a complex number

سبق أن درست الأعداد المركبة، وعلمت أن العدد المركب يمكن كتابته على الصورة ع = س + ص ت (الصورة الجبرية)، حيث س ، ص عددان حقيقيان ، ت^{٢} = - ١ و فى هذا الدرس سوف نتعرف على صورة أخرى لكتابة العدد المركب، وكيفية تمثيله بيانيًّا.

الإحداثيات القطبية والديكارتية:



الشكل المقابل يمثل دائرة طول نصف قطرها ل، أ (س ، ص) تقع على الدائرة وتقابل زاوية θ .

جتاθ = $\frac{\text{س}}{\text{ل}}$ ، جاθ = $\frac{\text{ص}}{\text{ل}}$

س = ل جتاθ ، ص = ل جاθ

حيث ل = $\sqrt{\text{س}^{٢} + \text{ص}^{٢}}$ ، ظاθ = $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$ أى أن:

θ = ظا$^{-١}$ $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$ و إذا تأملنا المستوى الديكارتى على أنه مستوى قطبى بحيث ينطبق المحور القطبى على الجزء الموجب لمحور السينات فإنه يمكننا تحويل الإحداثيات القطبية إلى ديكارتية والعكس.

تحويل الإحداثيات القطبية إلى احداثيات ديكارتية

إذا كانت النقطة أ فى الإحداثيات القطبية هى (ل، θ) فإن الإحداثيات الديكارتية لنفس النقطة هى (س، ص) حيث :


س = ل جتاθ ، ص = ل جاθ

ويكون: (س، ص) = (ل جتاθ ، ل جاθ)

مستوى أرجاند

قام العالم الرياضى "أرجاند" بتمثيل العدد المركب ع بيانيًّا على مستوى إحداثيات متعامدة، وجعل المحور الأفقى س س$'$ يمثل الجزء الحقيقى من العدد المركب وجعل المحور الرأسى ص ص$'$ يمثل الجزء التخيلى من العدد المركب. فتكون النقطة التى إحداثيها (س، ص) تمثل العدد المركب س + ت ص

مثال



(١) فى شكل أرجاند المجاور نلاحظ أن النقطتين اللتين تمثلان العددين ع ، - ع متماثلتان بالنسبة لنقطة الأصل (و).

سوف تتعلم

- التمثيل البيانى للعدد المركب ومرافقة فى مستوى أرجاند.
- التمثيل البيانى لمجموع عددين مركبين.
- مقياس العدد المركب.
- سعة العدد المركب.
- السعة الأساسية للعدد المركب.
- الصورة المثلثية للعدد المركب.
- المقياس و السعة لحاصل ضرب عددين مركبين وخارج قسمتهما.

مصطلحات أساسية

مستوى أرجاند	*Argand plane*
مرافق	*Conjugate*
مقياس	*Modulus*
سعة أساسية	*Principle amplitude*
صورة مثلثية	*Trigonmetric form*

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية

Scientific calculator

نتيجة نت
nezakr.nategа4dk.net

كذلك نلاحظ أن النقطتين اللتين تمثلان العددين المترافقين ع، $\overline{ع}$ متماثلتان بالنسبة للمحور $\overleftrightarrow{س س}$

حاول أن تحل

(١) مَثِّل على شكل أرجاند كل من الأعداد:


ع = ٣ + ٤ت ، $\overline{ع}$ ، - ع ، ١ + ع

تفكير ناقد: ما الذى تمثله جميع الأعداد المركبة ع التى جزءها الحقيقى يساوى ٢ على شكل أرجاند.

تعلم ١

المقياس والسعة للعدد المركب

The modulus and the amplitude (argument) of a complex number



إذا كان ع = س + ص ت عددًا مركبًا تمثله نقطة ع(س ، ص) فى مستوى أرجاند، فإن مقياس العدد ع هو بُعده عن نقطة الأصل و . و يرمز لمقياس العدد ع بالرمز |ع| أو ل وتسمى θ بسعة العدد المركب، ويكون:

ل = $\sqrt{س^٢ + ص^٢}$ ، ظا θ = $\frac{ص}{س}$ أن أى θ = ظا$^{-١}$ $\frac{ص}{س}$

حيث $\frac{-\pi}{٢}$ < ظا$^{-١}$ $\frac{ص}{س}$ < $\frac{\pi}{٢}$

الصورة المثلثية (القطبية) للعدد المركب

Polar form of a complex number

إذا كان ع = س + ص ت عددًا مركبًا مقياسه ل وسعته الأساسية θ حيث θ ∈]-π ، π] فإنه يكتب بالصورة ع = ل (جتا θ + ت جا θ) ويتحدد قياس θ تبعًا للحالات الآتية:

أ) س > ٠ ، ص > ٠ فإن θ تقع فى الربع الأول θ = ظا$^{-١}$ ($\frac{ص}{س}$)

ب) س < ٠ ، ص > ٠ فإن θ تقع فى الربع الثانى θ = π + ظا$^{-١}$ ($\frac{ص}{س}$)

جـ) س < ٠ ، ص < ٠ فإن θ تقع في الربع الثالث θ = -π + ظا$^{-١}$ ($\frac{ص}{س}$)

د) س > ٠ ، ص < ٠ فإن θ تقع فى الربع الرابع θ = ظا$^{-١}$ ($\frac{ص}{س}$)

لاحظ أن

- س > ٠ ، ص = ٠ فإن θ = ٠
- س < ٠ ، ص = ٠ فإن θ = π
- س = ٠ ، ص > ٠ فإن θ = $\frac{\pi}{٢}$
- س = ٠ ، ص < ٠ فإن θ = $\frac{-\pi}{٢}$

مثال

(٢) أوجد المقياس والسعة الأساسية لكل من الأعداد المركبة الآتية:

أ) ع$_١$ = $-\sqrt{٣}$ + ت ب) ع$_٢$ = - ١ - ت

الحل


∵ صورة العدد المركب هى : ع = س + ت ص فإن :

أ) س = $-\sqrt{٣}$ ، ص = ١

∴ العدد ع$_١$ يقع فى الربع الثانى

ل = $\sqrt{س^٢ + ص^٢}$ = $\sqrt{(-\sqrt{٣})^٢ + (١)^٢}$ = $\sqrt{٤}$ = ٢

θ = π + ظا$^{-١}$ ($\frac{١}{-\sqrt{٣}}$) = π - $\frac{\pi}{٦}$ = $\frac{٥\pi}{٦}$




nezakr.natega4dk.net

ب س = - ١ ، ص = - ١

∴ العدد ع٢ يقع فى الربع الثالث

ل = $\sqrt{س^2 + ص^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$\theta = -\pi + ظا^{-1}(\frac{-1}{-1}) = -\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{-3\pi}{4}$



حاول أن تحل

(٢) أوجد المقياس والسعة الأساسية لكل من الأعداد المركبة الآتية:

أ ع١ = $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ ت

ب ع٢ = ١ - $\sqrt{3}$ ت

جـ ع٣ = - $\sqrt{3}$ ت

د ع٤ = ٥

تذكر أن

$\frac{\theta^{ج}}{\pi} = \frac{\theta^{°}}{١٨٠^{°}}$

ويستخدم هذا القانون للتحويل من قياس ستينى إلى قياس دائرى والعكس.

خواص المقياس والسعة لعدد مركب

لكل عدد مركب ع = س + ص ت و سعته θ يكون:

١) |ع| ≥ صفر

٢) سعة العدد المركب تأخذ عددًا غير منتهٍ من القيم، وذلك بإضافة عدد صحيح من دورات $\pi 2$.

أى إن سعة العدد المركب تساوى $\theta + \pi 2$ ن حيث ن عدد صحيح.

٣) |ع| = | $\overline{ع}$ | = |-ع| = | -$\overline{ع}$ | حيث $\overline{ع}$ هو مرافق العدد ع

٤) ع $\overline{ع}$ = |ع|^2 = | $\overline{ع}$ |^2

تفكير ناقد: إذا كانت السعة الأساسية للعدد ع هى θ فأوجد السعة الأساسية لكل من الأعداد -ع ، $\overline{ع}$ ، $\frac{1}{ع}$

مثال

(٣) اكتب كلًّا من الأعداد المركبة الآتية بالصورة المثلثية:

أ ع١ = ٢ - ٢$\sqrt{3}$ ت

ب ع٢ = - ٤ت

جـ ع٣ = $\frac{-4}{\sqrt{3} + ت}$

د ع٤ = - ٢

الحل

∵ صورة العدد المركب هى : س + ت ص لذلك فإن:

أ س = ٢ ، ص = - ٢$\sqrt{3}$


∴ ع١ يقع فى الربع الرابع

ل = |ع١| = $\sqrt{س^2 + ص^2} = \sqrt{(2)^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{16} = 4$


$\theta = ظا^{-1}(\frac{-2\sqrt{3}}{2}) = \frac{-\pi}{3}$

∴ ع١ = ل (جتا θ + ت جا θ)

$= 4 (جتا(\frac{-\pi}{3}) + ت جا(\frac{-\pi}{3}))$



nezakr.natega4dk.net




(ب) ∵ س = ٠ ، ص = -٤

∴ ع٢ يقع على محور ص

ل = |ع٢| = $\sqrt{س^2 + ص^2}$ = $\sqrt{(٠)^2 + (-٤)^2}$ = ٤

$\theta = \frac{-\pi}{٢}$ ع٢ = ٤(جتا($\frac{-\pi}{٢}$) + ت جا($\frac{-\pi}{٢}$))

(جـ) ع٣ = $\frac{-٤}{\sqrt{٣} + ت}$ × $\frac{\sqrt{٣} - ت}{\sqrt{٣} - ت}$ = $-\sqrt{٣} + ت$



س = $-\sqrt{٣}$ ، ص = ١ ∴ ع٣ تقع فى الربع الثانى

ل = |ع٣| = $\sqrt{س^2 + ص^2}$ = $\sqrt{٣ + ١}$ = ٢

$\theta = \pi + ظا^{-١}(\frac{-١}{\sqrt{٣}}) = \frac{٥\pi}{٦}$

ع٣ = ٢ (جتا $\frac{٥\pi}{٦}$ + ت جا $\frac{٥\pi}{٦}$)

(د) ∵ س = -٣ ، ص = ٠ ∴ ع٤ يقع على محور س

ل = |ع| = $\sqrt{(-٣)^2 + (٠)^2}$ = ٣

$\theta = \pi$ ∴ ع٤ = ٣(جتا π + ت جا π)

تذكر أن

- ١ = جتا ٠ + ت جا ٠
- -١ = جتا π + ت جا π
- ت = جتا $\frac{\pi}{٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{٢}$
- -ت = جتا $\frac{-\pi}{٢}$ + ت جا $\frac{-\pi}{٢}$

حاول أن تحل

(٣) اكتب كلًّا من الأعداد الآتية فى الصورة المثلثية:

(أ) ع١ = ٨ (ب) ع٢ = ٥ت (جـ) ع٣ = -٣ - ٣ت

مثال

(٤) أوجد المقياس والسعة الأساسية لكل من الأعداد الآتية:

(أ) ع١ = -٨ (جتا ٤٥° + ت جا ٤٥°)

(ب) ع٢ = ٢ (جا $\frac{٤}{٣}\pi$ - ت جتا $\frac{٤}{٣}\pi$)


تذكر أن

جتاθ - ت جاθ = جتا(-θ) + ت جا(-θ)

الحل

(أ) ع١ = -٨ (جتا ٤٥° + ت جا ٤٥°)

= ٨(- جتا ٤٥° - ت جا ٤٥°)



∵ س < صفر ، ص < صفر ∴ ع١ يقع فى الربع الثالث

∵ - جتا ٤٥° = جتا(١٨٠° + ٤٥°) ، - جا ٤٥° = جا(١٨٠° + ٤٥°)

∴ ع١ = ٨(جتا ٢٢٥° + ت جا ٢٢٥°) = ٨(جتا -١٣٥° + ت جا -١٣٥°)

∴ مقياس العدد ع١ = ٨ ، السعة الأساسية θ = -١٣٥° = $\frac{-٣\pi}{٤}$

nezakr.natega4dk.net

ب $ع_٢ = ٢ (جا \frac{٤}{٣}\pi - ت جتا \frac{٤}{٣}\pi)$

∵ س < 0 ، ص < 0

∴ جا $\frac{٤}{٣}\pi$ = جتا $(\frac{٣}{٢}\pi + \frac{٤}{٣}\pi)$ = جتا $\frac{١٧}{٦}\pi$ = جتا $(\frac{٥}{٦}\pi)$

- جتا $\frac{٤}{٣}\pi$ = جا $(\frac{٣}{٢}\pi + \frac{٤}{٣}\pi)$ = جا $(\frac{١٧}{٦}\pi)$ = جا $(\frac{٥}{٦}\pi)$

∴ $ع_٢$ = ٢(جتا $\frac{٥}{٦}\pi$ + ت جا $\frac{٥}{٦}\pi$))

∴ مقياس العدد $ع_٢ = ٢$، السعة الأساسية $\frac{٥}{٦}\pi$

تذكر أن

جا $(\frac{\pi}{٢} + \theta)$ = جتا θ

جتا $(\frac{\pi}{٢} + \theta)$ = - جا θ

جا $(\frac{٣\pi}{٢} + \theta)$ = - جتا θ

جتا $(\frac{٣\pi}{٢} + \theta)$ = جا θ

حاول أن تحل

(٤) أوجد المقياس والسعة الأساسية لكل من الأعداد المركبة الآتية:

أ $ع_١ = ٢ (جتا \frac{\pi}{٣} - ت جا \frac{\pi}{٣})$

ب $ع_٢ = \frac{-١}{٢\sqrt{}}$ (جا ٤٥° - ت جا ٤٥°)

تعلم ٣

ضرب وقسمة الأعداد المركبة باستخدام الصورة المثلثية

multiplying and dividing complex numbers using the polar form

إذا كان $ع_١ = ل_١(جتا \theta_١ + ت جا \theta_١)$ ، $ع_٢ = ل_٢(جتا \theta_٢ + ت جا \theta_٢)$ فإن

١) $ع_١ ع_٢ = ل_١ل_٢ (جتا \theta_١ + ت جا \theta_١)(جتا \theta_٢ + ت جا \theta_٢)$

$= ل_١ل_٢ (جتا(\theta_١ + \theta_٢) + ت جا(\theta_١ + \theta_٢))$ (١)

أى إن $|ع_١ ع_٢| = ل_١ل_٢ = |ع_١||ع_٢|$

سعة $(ع_١ ع_٢) = \theta_١ + \theta_٢$

٢) $\frac{ع_١}{ع_٢} = \frac{ل_١}{ل_٢} \times \frac{جتا \theta_١ + ت جا \theta_١}{جتا \theta_٢ + ت جا \theta_٢} = \frac{ل_١}{ل_٢} (جتا(\theta_١ - \theta_٢) + ت جا(\theta_١ - \theta_٢))$ (٢)

أى إن $|\frac{ع_١}{ع_٢}| = \frac{ل_١}{ل_٢} = \frac{|ع_١|}{|ع_٢|}$ ، سعة $(\frac{ع_١}{ع_٢}) = \theta_١ - \theta_٢$

استعن بمعلمك لإثبات صحة العلاقات (١) ، (٢)

مثال

(٥) عَبِّر عن ٣ (جتا $\frac{٥}{١٢}\pi$ + ت جا $\frac{٥}{١٢}\pi$) × ٤ (جتا $\frac{\pi}{١٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{١٢}$) بالصورة س + ص ت

الحل

٣ (جتا $\frac{٥}{١٢}\pi$ + ت جا $\frac{٥}{١٢}\pi$) × ٤(جتا $\frac{\pi}{١٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{١٢}$)

= ٣ × ٤((جتا $\frac{٥}{١٢}\pi$ + $\frac{\pi}{١٢}$) + ت جا($\frac{٥}{١٢}\pi$ + $\frac{\pi}{١٢}$))

= ١٢ (جتا $\frac{\pi}{٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{٢}$) = ١٢(٠ + ت (١)) = ١٢ ت

nezakr.natega4dk.net


حاول أن تحل

(٥) عبر عن ٢(جتا $\frac{\pi}{١٥}$ + ت جا $\frac{\pi}{١٥}$) × ٣(جتا $\frac{-\pi٢}{٥}$ + ت جا $\frac{-\pi٢}{٥}$)) بالصورة س + ت ص

مثال

(٦) إذا كان ع١ ، ع٢ عددين مركبين ممثلين على مستوى أرجاند كما بالشكل المقابل، أوجد على الصورة س + ص ت العدد $\frac{ع٢}{ع١}$

الحل



من الرسم |ع١| = ٢ ، سعة ع١ = ٩٠° + ١٠° = ١٠٠°

∴ ع١ = ٢(جتا ١٠٠° + ت جا ١٠٠°)

|ع٢| = ٤ ، سعة ع٢ = - ٢٠°

∴ ع٢ = ٤ (جتا (- ٢٠°) + ت جا (- ٢٠°))

∴ $\frac{ع٢}{ع١} = \frac{٤}{٢} \times \frac{\text{جتا}(-٢٠°) + \text{ت جا}(-٢٠°)}{(\text{جتا}١٠٠° + \text{ت جا}١٠٠°)}$


= ٢ [جتا(- ٢٠° - ١٠٠°) + ت جا(- ٢٠° - ١٠٠°)]

= ٢ (جتا(- ١٢٠°) + ت جا (- ١٢٠°))

= ٢ (- $\frac{١}{٢}$ - ت × $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$) = - ١ - $\sqrt{٣}$ ت

حاول أن تحل

(٦) باستخدام مستوى أرجاند المقابل، أوجد $\frac{ع٢}{ع١}$ على الصورة س + ص ت



نتائج:

١) إذا كان ع = ل(جتا θ + ت جا θ) فإن

(أ) $\frac{١}{ع}$ = $\frac{١}{ل}$ (جتا (- θ) + ت جا (- θ))

(ب) ع^{٢} = ل^{٢}(جتا ٢ θ + ت جا ٢ θ)

٢) يمكن تعميم حاصل ضرب عدد محدود من الأعداد المركبة فإذا كان ع١، ع٢، ... عن أعدادًا مركبة وكان:

ع١ = ل١(جتا $\theta_١$ + ت جا $\theta_١$) ، ع٢ = ل٢(جتا $\theta_٢$ + ت جا $\theta_٢$)، ..... ، عن = لن(جتا $\theta_ن$ + ت جا $\theta_ن$)

فان: ع١ ع٢ ..... عن = ل١ ل٢ ..... لن(جتا ($\theta_١ + \theta_٢ +$ ..... $+ \theta_ن$) + ت جا ($\theta_١ + \theta_٢ +$ ..... $+ \theta_ن$))

وفى الحالة الخاصة عندما ع١ = ع٢ = ... = عن = ل(جتا θ + ت جا θ) يكون:

$$ع^{ن} = ل^{ن}(\text{جتا ن}\theta + \text{ت جا ن}\theta)$$

مثال

(٧) ضع العدد ١ - ت على الصورة المثلثية، ثم أوجد (١ - ت)^{٨}

nezakr.natega4dk.net

الحل

∵ س = ١ ، ص = - ١ ∴ ل = $\sqrt{س^٢ + ص^٢}$ = $\sqrt{١^٢ + (-١)^٢}$ = $\sqrt{٢}$

∵ س > ٠ ، ص < ٠ ∴ ع يقع فى الربع الرابع

θ = طا$^{-١}$($\frac{-١}{١}$) = $\frac{-\pi}{٤}$ ∴ ١ - ت = $\sqrt{٢}$ (جتا $\frac{-\pi}{٤}$ + ت جا $\frac{-\pi}{٤}$)

∴ (١ - ت)^٨ = ($\sqrt{٢}$)^٨ جتا($\frac{-\pi}{٤}$) + ت جا ($\frac{-\pi}{٤}$))^٨

= ١٦ (جتا (- ٢π) + ت جا (- ٢π))

= ١٦ (جتا ٠ + ت جا ٠) = ١٦

٩ حاول أن تحل

(٧) إذا كان ع$_١$ = ٢(جتا ١٠° + ت جا ١٠°) ، ع$_٢$ = ٣(جتا ٤٠° + ت جا ٤٠°)

أوجد العدد ع$_١$ ع$_٢$ على الصورة س + ص ت

الصورة الأسية للعدد المركب (صورة أويلر)

Exponential form of a complex number (Euler form)

كل دالة فى المتغير س يمكن التعبير عنها كمتسلسلة من قوى س تسمى متسلسلة ماكلورين (Maclaurin series)

وفيما يلى نورد مفكوك ماكلورين لبعض الدوال محل الدراسة فى هذه الوحدة.

١) دالة الجيب ص = جا س

جا س = $\frac{س}{|١}$ - $\frac{س^٣}{|٣}$ + $\frac{س^٥}{|٥}$ - ..... + (- ١)^ن × $\frac{س^{٢ن+١}}{|٢ن+١}$ + ...

(دالة الجيب دالة فردية جا(- س) = - جا س لذلك المفكوك يحتوى على قوى س الفردية)

٢) دالة جيب التمام ص = جتا س

جتا س = ١ - $\frac{س^٢}{|٢}$ + $\frac{س^٤}{|٤}$ - ..... + (- ١)^ن × $\frac{س^{٢ن}}{|٢ن}$ + ...

(دالة جيب التمام هى دالة زوجية لأن جتا(- س) = جتا س لذلك المفكوك يحتوى على قوى س الزوجية)

٣) الدالة الأسية ص = هـ^{س}

هـ^{س} = ١ + $\frac{س}{|١}$ + $\frac{س^٢}{|٢}$ + $\frac{س^٣}{|٣}$ ..... + $\frac{س^ن}{|ن}$ + ...

لاحظ أن

هـ$^{ت س}$ = ١ + $\frac{ت س}{|١}$ + $\frac{ت^٢ س^٢}{|٢}$ + $\frac{ت^٣ س^٣}{|٣}$ + ... + $\frac{ت^ن س^ن}{|ن}$ + ...

= ١ + $\frac{ت س}{|١}$ - $\frac{س^٢}{|٢}$ - $\frac{ت س^٣}{|٣}$ + ...

= (١ - $\frac{س^٢}{|٢}$ + $\frac{س^٤}{|٤}$ - .....) + ت ($\frac{س}{|١}$ - $\frac{س^٣}{|٣}$ + ...)

هـ$^{ت س}$ = جتا س + ت جا س

أى إن العدد المركب ع = س + ت ص = ل(جتاθ + ت جاθ) يمكن كتابته على الصورة:

ع = ل هـ$^{\theta ت}$ وتسمى صورة أويلر حيث θ بالتقدير الدائرى.

أضف إلى معلوماتك

معادلة أويلر هـ$^{\pi ت}$ + ١ = صفر و هى تربط بين أشهر ٥ ثوابت.

فى صورة أويلر θ يجب أن يكون بالتقدير الدائرى.

nezakr.nategа4dk.net

مثال

(٨) اكتب كلًّا من الأعداد المركبة الآتية على الصورة الأسية (صورة أويلر):

(أ) $ع_١ = ١ + ت$ (ب) $ع_٢ = -١ + \sqrt{٣}\, ت$ (جـ) $ع_٣ = هـ^{٣} + \frac{\pi}{٦} ت$ (د) $ع_٤ = -٢ ت$

الحل

(أ) $ع_١ = ١ + ت$ ∴ س = ١ ، ص = ١

$ل = |ع_١| = \sqrt{(١)^٢ + (١)^٢} = \sqrt{٢}$

∵ س > ٠ ، ص > ٠ ∴ $ع_١$ يقع فى الربع الأول

$\theta = ظا^{-١}(\frac{١}{١}) = \frac{\pi}{٤}$ ∴ $ع_١ = ل\, هـ^{\theta ت} = \sqrt{٢}\, هـ^{\frac{\pi}{٤} ت}$

(ب) $ع_٢ = -١ + \sqrt{٣}\, ت$ ∴ س = -١ ، ص = $\sqrt{٣}$

$ل = \sqrt{(-١)^٢ + (-\sqrt{٣})^٢} = ٢$

∵ س < ٠ ، ص > ٠ ∴ $ع_٢$ يقع فى الربع الثانى

∴ $\theta = \pi + ظا^{-١}(-\sqrt{٣}) = \frac{٢}{٣}\pi$ ∴ $ع_٢ = ل\, هـ^{\theta ت} = ٢\, هـ^{\frac{٢}{٣}\pi ت}$

(جـ) $ع_٣ = هـ^{٣ + \frac{\pi}{٦} ت} = هـ^{٣} \times هـ^{\frac{\pi}{٦} ت}$ ويكون $ل = |ع_٣| = هـ^{٣}$ ، سعة $ع_٣ = \frac{\pi}{٦}$

(د) ∵ $ع_٤ = -٢ ت$ ∴ س = ٠ ، ص = -٢ ∴ $ل = \sqrt{(٠)^٢ + (-٢)^٢} = \sqrt{٤} = ٢$

∵ س = ٠ ، ص = -٢ ∴ $ع_٤$ يقع على محور ص

∴ $\theta = \frac{-\pi}{٢}$ ∴ $ع_٤ = ٢\, هـ^{\frac{-\pi}{٢} ت}$

حاول أن تحل

(٨) إذا كان $ع = \frac{\sqrt{٢}\, ت}{١ + ت}$ فاكتب العدد ع بالصورة الأسية.

ضرب وقسمة الأعداد المركبة باستخدام الصورة الأسية

إذا كان $ع_١ = ل_١\, هـ^{\theta_١ ت}$ ، $ع_٢ = ل_٢\, هـ^{\theta_٢ ت}$

فإن $ع_١ ع_٢ = ل_١ ل_٢\, هـ^{\theta_١ ت} \times هـ^{\theta_٢ ت} = ل_١ ل_٢\, هـ^{(\theta_١ + \theta_٢) ت}$ ،

$\frac{ع_١}{ع_٢} = \frac{ل_١}{ل_٢} \times \frac{هـ^{\theta_١ ت}}{هـ^{\theta_٢ ت}} = \frac{ل_١}{ل_٢}\, هـ^{(\theta_١ - \theta_٢) ت}$

مثال

(٩) أوجد ناتج كل مما يأتى فى الصورة الأسية:

(أ) ٢(جتا ٢٥° + ت جا ٢٥°) × ٢(جا ١٥٨° - ت جتا ١٥٨°)

(ب) $(\frac{١ + ت}{١ - ت})^{٧}$

nezakr.natega4dk.net

الحل

(أ) تحويل ع٢ إلى الصورة المثلثية القياسية كالآتى:

∵ (جا ١٥٨° - ت جا ١٥٨°) = جا (٩٠° + ٦٨°) - ت جتا (٩٠° + ٦٨°) = جتا ٦٨° + ت جا ٦٨°

∴ ٣ (جتا ٢٥° + ت جا ٢٥°) × ٢ (جتا ٦٨° + ت جا ٦٨°)

= ٦ (جتا (٢٥° + ٦٨°) + ت جا (٢٥° + ٦٨°))

= ٦ (جتا ٩٣° + ت جا ٩٣°) = ٦ هـ^{١,٦٢ت}

(ب) ∵ ١ + ت = $\sqrt{٢}$ (جتا ٤٥° + ت جا ٤٥°)

١ - ت = $\sqrt{٢}$ (جتا (-٤٥°) + ت جا (-٤٥°))

∴ $\left(\frac{١ + ت}{١ - ت}\right)$ = جتا (٤٥° + ٤٥°) + ت جا (٤٥° + ٤٥°)

= جتا ٩٠° + ت جا ٩٠° = جتا $\frac{\pi}{٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{٢}$

∴ $\left(\frac{١ + ت}{١ - ت}\right)^{٧}$ = (جتا $\frac{\pi}{٢}$ + ت جا $\frac{\pi}{٢}$)^{٧} = جتا $\frac{\pi ٧}{٢}$ + ت جا $\frac{\pi ٧}{٢}$

= جتا $(\frac{-\pi}{٢})$ + ت جا $(\frac{-\pi}{٢})$ = هـ$^{\frac{-\pi}{٢}ت}$

لاحظ أن

$\frac{\theta^{ج}}{\pi} = \frac{٩٣°}{١٨٠°}$

أى أن: $\theta^{ج} = \frac{٩٣°}{١٨٠°} \times \pi$

$\theta^{ج} \simeq ١,٦٢$

حاول أن تحل

(٩) إذا كان ع١ = ١ - $\sqrt{٣}$ ت ، ع٢ = ١ + ت ، أوجد كلًّا مما يأتى فى الصورة المثلثية:

(أ) ع١ ع٢ (ب) $\frac{ع_٢}{ع_١}$ (جـ) (ع٢)^{٦}

مثال

(١٠) عبر عن ع = $\sqrt{٢}$ هـ$^{\frac{\pi ٣}{٤}ت}$ بالصورة الجبرية س + ص ت حيث س ، ص ∈ ح

الحل

∵ ع = $\sqrt{٢}$ هـ$^{\frac{\pi ٣}{٤}ت}$ ∴ ل = |ع| = $\sqrt{٢}$ ، $\theta = \frac{\pi ٣}{٤}$

∴ ع = $\sqrt{٢}$ (جتا $\frac{\pi ٣}{٤}$ + ت جا $\frac{\pi ٣}{٤}$)

= $\sqrt{٢}$ ($\frac{-١}{\sqrt{٢}}$ + $\frac{١}{\sqrt{٢}}$ت)

= - ١ + ت

لاحظ أن

جتا $\frac{\pi ٣}{٤}$ = جتا ١٣٥° = $\frac{-١}{\sqrt{٢}}$

جا $\frac{\pi ٣}{٤}$ = جا ١٣٥° = $\frac{١}{\sqrt{٢}}$

حاول أن تحل

(١٠) عبر عن ع = ٨ هـ$^{\frac{\pi}{٦}ت}$ بالصورة الجبرية س + ص ت حيث س ، ص ∈ ح

nezakr.natega4dk.net

تمـارين (٢ - ١)

اكمل ما يأتى

(١) العدد ع = ٣ - ٤ت يُمثَّل على شكل أرجاند بالنقطة أ حيث أ = (..... ، .....)

(٢) إذا كانت نقطة أ تمثل العدد ع على مستوى أرجاند، ب تمثل العدد $\overline{ع}$ على مستوى أرجاند، فإن ب صورة أ بالانعكاس فى .....

(٣) مقياس العدد المركب ع = - ٥ ت يساوى .....

(٤) إذا كان ع = $\frac{٢ - ت}{٢ + ت}$ فإن |ع| = ...

(٥) إذا كانت θ هى السعة الأساسية للعدد المركب ع فإن سعة $\overline{ع}$ هى .....

(٦) إذا كان ع = $\frac{١}{\overline{ع}}$ فإن |ع| = ...

(٧) الصورة الأسية للعدد - ١ + ت هى .....

(٨) إذا كان ع = ١ + $\sqrt{٣}$ ت فإن السعة الأساسية العدد $(١ + \sqrt{٣}\,ت)^{٨}$ هى .....

(٩) الصورة المثلثية للعدد ع = ٢ - ٢$\sqrt{٣}$ ت هى .....

(١٠) إذا كانت سعة العدد المركب ع هى θ فإن سعة العدد المركب ٢ ع هى .....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١١) إذا كان ع = ٢$\sqrt{٢}$ (جا ٣٠° + ت جتا ٣٠°) فإن السعة الأساسية للعدد ع تساوى

أ ٣٠° ب ٦٠° ج ٩٠° د ١٢٠°

(١٢) إذا كان ع = $(١ + \sqrt{٣}\,ت)^{ن}$ و كان |ع| = ٨ فإن السعة الأساسية للعدد ع تساوى

أ $\frac{\pi}{٢}$ ب $\frac{\pi}{٣}$ ج $\frac{\pi}{٦}$ د π

(١٣) إذا كان ع$_١$ = ل$_١$ (جتا $\theta_١$ + ت جا $\theta_١$) ، ع$_٢$ = ل$_٢$ (جتا $\theta_٢$ + ت جا $\theta_٢$) وكان $\theta_١ + \theta_٢ = \pi$ فإن ع$_١$ ع$_٢$ =

أ ل$_١$ل$_٢$ ب - ل$_١$ل$_٢$ ج ل$_١$ل$_٢$ت د - ل$_١$ل$_٢$ت

(١٤) سعة العدد المركب ع = - ٣ تساوى

أ صفر° ب ٩٠° ج ١٨٠° د ٢٧٠°

(١٥) إذا كان ع = -١ + $\sqrt{٣}$ ت فإن $|\overline{ع}|$ =

أ -١ - $\sqrt{٣}$ ت ب $\sqrt{٢}$ ج ٢ د - ٢

nezakr.natega4dk.net

(١٦) إذا كان ع$_{١}$ = - ١ - ت فإن الصورة الأسية للعدد ع هى

(أ) هـ$^{\frac{\pi ٣}{٤}}$ ت (ب) هـ$^{\frac{\pi ٥}{٤}}$ ت (جـ) $\sqrt{٢}$ هـ$^{\frac{\pi ٣٠}{٤}}$ ت (د) $\sqrt{٢}$ هـ^{٢٢٥} ت


(١٧) إذا كان ع$_{١}$ = ٢ + ٢ $\sqrt{٣}$ ت ، ع$_{٢}$ = - ٣ - ٣ $\sqrt{٣}$ فإن سعة العدد ع$_{١}$ + ع$_{٢}$ =

(أ) ٦٠° (ب) ٢٤٠° (جـ) ١٨٠° (د) ٣٠٠°

(١٨) إذا كان س + ص ت = $\frac{أ + ب ت}{أ - ب ت}$ فإن س^{٢} + ص^{٢} =

(أ) أ^{٢} + ب^{٢} (ب) أ^{٢} - ب^{٢} (جـ) ٢أ ب (د) ١

(١٩) الشكل المقابل يمثل العدد المركب



(أ) ٣(جتا ٣٠° + ت جا ٣٠°)

(ب) ٣(جتا ٦٠° + ت جا ٦٠°)

(جـ) ٣(جتا ١٢٠° + ت جا ١٢٠°)

(د) ٣(جتا ١٥٠° + ت جا ١٥٠°)


(٢٠) إذا كان ع عددًا مركبًا سعته الأساسية θ فإن سعة $\frac{١}{ع}$ هى .....

(أ) θ (ب) θ - (جـ) θ - π (د) θ + π -


أجب عمَّا يأتى:

(٢١) اكتب كلًّا من الأعداد المركبة الآتية بالصورة المثلثية:


(أ)



(ب)



(جـ)



(د) ع$_{٤}$ = - $\sqrt{٣}$ + ٤ت

(هـ) ع$_{٥}$ = ٤ (جتا ٤٠° - ت جا ٤٠°)

(٢٢) أوجد المقياس والسعة الأساسية لكل من الأعداد المركبة الآتية:

(أ) ع$_{١}$ = - ١ + ت

(ب) ع$_{٢}$ = $\frac{٤}{\sqrt{٣} - ت}$

(جـ) ع$_{٣}$ = - ٢(جتا ٤٥° + ت جا ٤٥°)

(د) ع$_{٤}$ = ١ + ت ظا ٢٠°

nezakr.natega4dk.net


(٢٣) إذا كان ع١ = جتا ١١٤° + ت جا ٦٦° ، ع٢ = جتا ٤٢° + ت جا ١٣٨°

ع٣ = جا ٢٤ + ت جا ١١٤، أوجد الصورة الجبرية للعدد: $\frac{ع_١ ع_٢}{ع_٣}$

(٢٤) إذا كان ع١ = ٢ (جتا ٧٥° + ت جا ٧٥°) ، ع٢ = ٤ (جتا ١٥° + ت جا ١٥°)، أوجد على الصورة الأسية العدد:

ع١ع٢ ، $\frac{ع_١}{ع_٢}$

(٢٥) فى الشكل المقابل أوجد على الصورة الأسية العدد: $\frac{ع_١}{ع_٢}$



(٢٦) اكتب كلًّا من الأعداد الآتية بالصورة الجبرية:

أ ع١ = هـ $^{\frac{\pi}{٣}ت}$

ب ع٢ = ٢ هـ $^{\frac{\pi ٣}{٤}ت}$

جـ ع٣ = ٣ هـ $^{\frac{\pi -}{٦}ت}$

(٢٧) إذا كان ع= ٢(جتا $\frac{\pi}{٣}$ + ت جا $\frac{\pi}{٣}$) أثبت أن $\frac{١}{ع}$ = $\frac{١}{٢}$ هـ $^{\frac{\pi ٥}{٣}ت}$

(٢٨) إذا كان ع= $\sqrt{٣}$ + ت أوجد بالصورة الجبرية ع^{٦}

(٢٩) إذا كان ع= $\frac{(ا + ب) + ت (ا - ب)}{(ا - ب) - ت (ا + ب)}$ فأوجدالعدد ع فى أبسط صورة ثم أوجد |ع| حيث ا ، ب ∈ ح

(٣٠) **تفكير إبداعى:** إذا كان ع١ = جتا ٧٥ + ت جا ٧٥ ، ع٢ = جتا ١٥ + ت جا ١٥، أوجد بالصورة المثلثية للعدد: ع١ + ع٢

(٣١) إذا كان سعة ع١ = $\frac{\pi}{٣}$ ، و سعة ع٢ = $\frac{\pi ٣}{٤}$ ، سعة ع٣ = $\frac{\pi}{٦}$ أوجد:

أ سعة ($ع_١^{٢}$ $ع_٢^{٢}$) ب سعة (٢ع١ . ع٢) جـ سعة ($\frac{ع_١ ع_٢}{ع_٣}$) د سعة ($ع_٢^{٦}$)

(٣٢) **تفكير إبداعى:** أثبت أن جتا θ = $\frac{١}{٢}$ (هـ$^{\theta ت}$ + هـ$^{-\theta ت}$)، جا θ = $\frac{-ت}{٢}$ (هـ$^{\theta ت}$ - هـ$^{-\theta ت}$)

nezakr.nateqa4dk.net

نظرية ديموافر

De Moivre's theorem

فكر و ناقش

أ إذا كان ع عددًا مركبًا مقياسه ل، وسعته الأساسية θ فأوجد:
١) مقياس العدد ع^{٣} ٢) سعة العدد ع^{٣}

ب إذا كان ع عددًا مركبًا، وكان السعة الأساسية للعدد ع^{٣} هي θ فإن السعة الأساسية للعدد ع هي .....

سوف تتعلم
- نظرية ديموافر لأس صحيح موجب.
- نظرية ديموافر لأس نسبي موجب.
- جذور العدد المركب.
- تمثيل جذور العدد المركب على شكل أرجاند.

تعلم

نظرية ديموافر بأس صحيح

إذا كان ن عددًا صحيحًا موجبًا

فإن (جتا θ + ت جا θ)^{ن} = جتا نθ + ت جا نθ

مصطلحات أساسية
- نظرية ديموافر *demoivres thearem*
- جذر *root*

مثال

١ عبر عن جتا ٣θ بدلالة قوى جتا θ

الحل

∵ (جتا θ + ت جا θ)^{٣} = جتا ٣θ + ت جا ٣θ (١) نظرية ديموافر

أيضًا (جتا θ + ت جا θ)^{٣} = جتا$^{٣}\theta$ + ٣ق$_{١}$ جتا$^{٢}\theta$ (ت جا θ)

+ ٣ق$_{٢}$ جتا θ (ت جا θ)^{٢} + (ت جا θ)^{٣} (نظرية ذات الحدين)

= جتا$^{٣}\theta$ + ٣ ت جتا$^{٢}\theta$ جا θ - ٣ جتا θ جا$^{٢}\theta$ - ت جا$^{٣}\theta$ (٢)

من (١) ، (٢) بمساواة الجزء الحقيقي

∵ جا$^{٢}\theta$ + جتا$^{٢}\theta$ = ١ ∴ جا$^{٢}\theta$ = ١ - جتا$^{٢}\theta$

∴ جتا٣θ = جتا$^{٣}\theta$ - ٣ جتا θ جا$^{٢}\theta$

= جتا$^{٣}\theta$ - ٣ جتا θ (١ - جتا$^{٢}\theta$)

= جتا$^{٣}\theta$ - ٣ جتا θ + ٣ جتا$^{٣}\theta$

= ٤ جتا$^{٣}\theta$ - ٣ جتا θ

حاول أن تحل

١ عبر عن جا ٣θ بدلالة قوى جا θ

nezakr.natega4dk.net

نظرية ديموافر بأس نسبى موجب

نعلم أن جتا θ + ت جا θ = جتا (θ + ٢ر π) + ت جا (θ + ٢ر π)؛ حيث ر عدد صحيح.

فإذا كان ك عددًا موجبًا فإن (جتاθ + ت جا θ)$^{\frac{1}{ك}}$ = جتا $\frac{\theta + ٢ر\pi}{ك}$ + ت جا $\frac{\theta + ٢ر\pi}{ك}$

أي إن مقدار (جتاθ + ت جا θ)$^{\frac{1}{ك}}$ يأخذ قيمًا متعددة تبعًا لقيم ر، ويكون عدد هذه القيم المختلفة يساوى ك من القيم، التي نحصل عليها بوضع قيم ر= ... ، -٢ ، -١ ، ٠ ، ١ ، ٢ .... التي تجعل السعة $\frac{\theta + ٢ر\pi}{ك}$ محصورة بين $-\pi$ ، π

مثال

(٢) أوجد بالصورة المثلثية وبالصورة الأسية جذور المعادلة الآتية في ك ع^{٤} = ٨(١ - $\sqrt{٣}$ ت)
ثم اكتب مجموعة حل المعادلة.

الحل

∵ ع^{٤} = ٨ - ٨ $\sqrt{٣}$ ت ∴ س = ٨ ، ص = - ٨ $\sqrt{٣}$

ل = $\sqrt{(٨)^{٢}+(-٨\sqrt{٣})^{٢}}$ = ١٦ ، ظاθ = $\frac{-٨\sqrt{٣}}{٨}$ = - $\sqrt{٣}$

∵ س < ٠ ، ص < ٠ ∴ ع^{٤} تقع فى الربع الرابع

θ = ظا$^{-١}$ (- $\sqrt{٣}$) = - $\frac{\pi}{٣}$

∴ ع^{٤} = ١٦ (جتا $\frac{-\pi}{٣}$) + ت جا ($\frac{-\pi}{٣}$))

∴ ع = ٢ (جتا$\frac{١}{٤}$ (- $\frac{\pi}{٣}$ + ٢رπ) + ت جا$\frac{١}{٤}$ (- $\frac{\pi}{٣}$ + ٢رπ))

عندما ر = ٠ فإن ع$_{١}$ = ٢ (جتا($\frac{-\pi}{١٢}$) + ت جا ($\frac{-\pi}{١٢}$)) = ٢ هـ$^{\frac{-\pi}{١٢}ت}$

عندما ر = ١ فإن ع$_{٢}$ = ٢ (جتا($\frac{\pi ٥}{١٢}$) + ت جا ($\frac{\pi ٥}{١٢}$)) = ٢ هـ $^{\frac{\pi ٥}{١٢}ت}$

عندما ر = - ١ فإن ع$_{٣}$ = ٢ (جتا($\frac{-\pi ٧}{١٢}$) + ت جا ($\frac{-\pi ٧}{١٢}$)) = ٢ هـ $^{\frac{-\pi ٧}{١٢}ت}$

عندما ر = ٢ فإن ع$_{٤}$ = ٢ (جتا($\frac{\pi ١١}{١٢}$) + ت جا ($\frac{\pi ١١}{١٢}$)) = ٢ هـ $^{\frac{\pi ١١}{١٢}ت}$

∴ مجموعة الحل = {٢هـ $^{\frac{-\pi}{١٢}ت}$ ، ٢ هـ $^{\frac{\pi ٥}{١٢}ت}$ ، ٢هـ $^{\frac{-\pi ٧}{١٢}ت}$ ، ٢ هـ $^{\frac{\pi ١١}{١٢}ت}$ }

حاول أن تحل

(٢) أوجد في ك مجموعة حل المعادلة ع^{٤} = ٢ + ٢ $\sqrt{٣}$ ت

مثال

(٣) أوجد جذور المعادلة ع^{٣} = ١، ومَثِّل الجذور على مستوى أرجاند.

الحل

ع^{٣} = ١

= جتا٠° + ت جا٠°

∴ ع = (جتا٠° + ت جا٠°)$^{\frac{١}{٣}}$


nezakr.natega4dk.net

= جتا $\frac{1}{3}$ (π ٢ر) + ت جا $\frac{1}{3}$ (π ٢ر)

عندما ر = ٠ فإن ع$_1$ = جتا ٠° + ت جا ٠° = ١

عندما ر = ١ فإن ع$_2$ = جتا $\frac{\pi ٢}{3}$ + ت جا $\frac{\pi ٢}{3}$

عندما ر = - ١ فإن ع$_3$ = جتا $\frac{-\pi ٢}{3}$ + ت جا $\frac{-\pi ٢}{3}$



نلاحظ أن الجذور تقسم الدائرة التي مركزها نقطة الأصل، وطول نصف قطرها الوحدة إلى ٣ أقواس متساوية، وقياس كل منها ١٢٠°(إحداثيات النقط تكون رؤوس مثلث متساوى الأضلاع).

حاول أن تحل

(٣) أوجد جذور المعادلة ع^4 = ١ ومثل الجذور على مستوى أرجاند.

الجذور النونية

المعادلة س^ن = أ حيث أ عدد مركب يكون لها ن من الجذور على الصورة س = أ$^{\frac{1}{ن}}$.

يمكن حسابها بإيجاد الصورة المثلثية للعدد أ ثم تطبيق نظرية ديموافر، وتقع الجذور جميعًا في مستوى أرجاند على دائرة واحدة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها |أ|$^{\frac{1}{ن}}$. وتكون رؤوس مضلعًا منتظمًا، عدد أضلاعه ن.

مثال

(الجذور الخماسية للعدد - ٣٢)

(٤) مثل على شكل أرجاند الجذور الخماسية للعدد - ٣٢

الحل

الجذور الخماسية للعدد - ٣٢ هي حلول المعادلة ع^٥ = - ٣٢

وبتحويل العدد - ٣٢ إلى الصورة المثلثية.

∴ ع^٥ = ٣٢ (جتا π + ت جا π)


∴ ع = ٣٢$^{\frac{1}{٥}}$ (جتا π + ت جا π)$^{\frac{1}{٥}}$

= ٢ (جتا $\frac{1}{٥}$ (π + ٢ر π) + ت جا $\frac{1}{٥}$ (π + ٢ر π)).

نوجد الجذر الأول وذلك بوضع ر = صفر

∴ ع = ٢ (جتا $\frac{\pi}{٥}$ + ت جا $\frac{\pi}{٥}$) = ٢ (جتا ٣٦° + ت جا ٣٦°)

وتكون قياس الزاوية بين كل جذر والذي يليه هي $\frac{٣٦٠}{٥}$ = ٧٢°



ع$_2$ = ٢ (جتا (٣٦° + ٧٢°) + ت جا (٣٦° + ٧٢°)) = ٢ (جتا ١٠٨° + ت جا ١٠٨°)

ع$_3$ = ٢ (جتا(٣٦° + ٢ × ٧٢°) + ت جا (٣٦° + ٢ × ٧٢°)) = ٢ (جتا ١٨٠° + ت جا ١٨٠°)

ع$_4$ = ٢ (جتا (٣٦° + ٣×٧٢°) + ت جا (٣٦° + ٣ × ٧٢°)) = ٢ (جتا ٢٥٢° + ت جا ٢٥٢°)

= ٢ (جتا (- ١٠٨°) + ت جا (- ١٠٨°))

nezakr.nategа4dk.net

ع$_{٥}$ = ٢ (جتا (٣٦° + ٤ × ٧٢°) + ت جا (٣٦° + ٤×٧٢°)) = ٢ (جتا ٣٢٤° + ت جا ٣٢٤°)

= ٢ (جتا -٣٦° + ت جا - ٣٦°)

حاول أن تحل

(٤) مثِّل على شكل أرجاند الجذور السداسية للعدد ١

مثال

(٥) أوجد الجذور التربيعية للعدد ٣+ ٤ ت

الحل

نفرض أن (٣+ ٤ت)$^{\frac{١}{٢}}$ = س + ص ت بتربيع الطرفين

∴ ٣+ ٤ت = س^{٢} - ص^{٢} + ٢ س ص ت

بمساواة الجزء الحقيقي بالجزء الحقيقي والجزء التخيلي بالجزء التخيلي

∴ س^{٢} - ص^{٢} = ٣ ⟵ (١) ، ٢ س ص = ٤ ⟵ (٢) بتربيع (١) ، (٢) والجمع

∴ س^{٤} - ٢ س^{٢} ص^{٢} + ص^{٤} + ٤س^{٢} ص^{٢} = ٩ + ١٦ ∴ س^{٤} + ٢س^{٢} ص^{٢} + ص^{٤} = ٢٥

∴ (س^{٢} + ص^{٢})^{٢} = ٢٥ ∴ (س^{٢}+ ص^{٢})= ٥ ⟵ (٣)

بجمع (١)، (٣) ⟵ ٢ س^{٢} = ٨ ومنها س = ± ٢ عند س = ٢ بالتعويض في (٢) ⟵ ص = ١

عند س = -٢ بالتعويض فى (٢) ⟵ ص = -١

∴ الجذر الأول = ٢ + ت ∴ الجذر الثاني = - ٢ - ت

حاول أن تحل

(٥) أوجد الجذرين التربيعين للعدد ٧ - ٢٤ت

مثال

(٦) أوجد في ك مجموعة حل المعادلة (١ - ت) س^{٢} - (٦ - ٤ت) س +٩ - ٧ ت = ٠

الحل

يمكن وضع المعادلة على الصورة:

س^{٢} - $\frac{٦ - ٤ت}{١ - ت}$ س + $\frac{٩ - ٧ت}{١ - ت}$ = ٠ س^{٢} - (٥ + ت) س + ٨ + ت = ٠

باستخدام القانون العام لحل المعادلة التربيعية:

س = $\frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤ أجـ}}{٢ أ}$ = $\frac{(٥ + ت) \pm \sqrt{(٥ + ت)^{٢} - ٤×١(٨ + ت)}}{٢}$

س = $\frac{(٥ + ت) \pm \sqrt{٢٤ + ١٠ت - ٣٢ - ٤ت}}{٢}$

س = $\frac{(٥ + ت) \pm \sqrt{-٨ + ٦ت}}{٢}$

نفرض أن أ + ب ت = $\sqrt{-٨ + ٦ت}$ بتربيع الطرفين

nezakr.natega4dk.net

$أ^{٢} - ب^{٢} + ٢أ ب ت = -٨ + ٦ت$

$أ^{٢} - ب^{٢} = -٨$ (١)　　$٢أب = ٦$ (٢)

$أ^{٢} + ب^{٢} = ١٠$ (٣)　　من (١)، (٣)　$أ^{٢} = ١$　　$\therefore أ = \pm ١$　　$\therefore ب = \pm ٣$

$\therefore أ + ب ت = \pm (١ + ٣ت)$

$\therefore س = \frac{٥ + ت \pm (١ + ٣ت)}{٢}$　　$س = ٣ + ٢ت$　　أو　　$س = ٢ - ت$

حاول أن تحل

٦ أوجد في ك مجموعة حل المعادلة $س^{٢} + (١ + ت) س - ٦ + ٣ت = ٠$

تمـــارين (٢ - ٢)

١ باستخدام نظرية ديموافر أثبت صحة المتطابقات الآتية:

أ $جتا ٤\theta = ٨ جتا^{٤}\theta - ٨ جتا^{٢}\theta + ١$

ب $جا ٥\theta = ١٦ جا^{٥}\theta - ٢٠ جا^{٣}\theta + ٥ جا\theta$

٢ أوجد في ك مجموعة حل كل من المعادلات الآتية؛ اكتب الجذور على صورة $س + ص ت$:

أ $ع^{٤} = ١٦$　　ب $ع^{٣} + ٨ = ٠$　　ج $ع^{٣} + ٨ت = ٠$

٣ أوجد مجموعة حل المعادلة $ع^{٥} + ٢٤٣ = ٠$ حيث $ع \ni ك$

٤ أوجد مجموعة حل المعادلة $ع^{٤} = ٢ + ٢\sqrt{٣}ت$. اكتب الحل على الصورة الأسية.

٥ أوجد الجذور التربيعية لكل من:

أ $٢ - ٢\sqrt{٣}ت$　　ب $١ - ت$　　ج $٨ت$

د $٣ + ٤ت$　　هـ $٥ - ١٢ت$

٦ أوجد الجذور التكعيبية للعدد ٨ ومثل هذه الجذور على شكل أرجاند.

٧ أوجد الجذور الرابعة للعدد -١ ومثل هذه الجذور على شكل أرجاند.

٨ إذا كان $\frac{٧ - ١١ت}{٤ + ت} = أ + ب ت$، أوجد قيم المقدار $(\sqrt{-ب} + أ ت)^{\frac{٢}{٣}}$

٩ ضع العدد $٢\sqrt{٢}(١ + ت)$ على الصورة المثلثية، ثم أوجد جذوره التربيعية على الصورة الأسية.

١٠ إذا كان $ع = ٨ - ٦ت$ أوجد $ع^{\frac{٢}{٣}}$ على الصورة الجبرية.

١١ **تفكير إبداعي:** أثبت أن $جتا^{٤}\theta = \frac{١}{٨}(جتا ٤\theta + ٤ جتا ٢\theta + ٣)$

nezakr.nategа4dk.net

٢ - ٣ الجذور التكعيبية للواحد الصحيح

Cubic roots of unity

عمل تعاونى :

باستخدام نظرية ديمواڤر أوجد مجموعة حل المعادلة ع^{٣} = ١

أوجد الجذور السابقة بالصورة الجبرية.

أوجد مجموع الجذور الثلاثة . ماذا تلاحظ؟

تعلم

سوف تتعلم

- الجذور التكعيبية للواحد الصحيح.
- خواص الجذور التكعيبية للواحد الصحيح.
- تمثيل الجذور التكعيبية للواحد هندسيًا
- مرافق الأعداد أ + ب ت ، أ + ω ب

مصطلحات أساسية

جذر	Root
جذر تربيعى	Square root
جذر تكعيبي	Cubic root
دائرة الوحدة	Unit circle
مرافق	Conjugate

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية — Scientific calculator
- برامج رسومية — Graphical programs

الجذور التكعيبية للواحد الصحيح *Cubic roots of unity*

باستخدام نظرية ديمواڤر نجد أن: مجموعة حل المعادلة ع^{٣} = ١ هى:

$$١ ، -\frac{١}{٢} + \frac{\sqrt{٣}}{٢} ت ، -\frac{١}{٢} - \frac{\sqrt{٣}}{٢} ت .$$

ونلاحظ أن مربع أحد الجذرين المركبين يساوى الجذر الآخر؛

ولذلك يمكن أن نفرض الجذور التكعيبية على الصورة ١ ، ω ، $\omega^{٢}$

حيث $\omega = -\frac{١}{٢} \pm \frac{\sqrt{٣}}{٢} ت$ ، $\omega^{٢} = -\frac{١}{٢} \mp \frac{\sqrt{٣}}{٢} ت$

تفكير ناقد:

هل يمكنك إيجاد الجذور التكعيبية للواحد الصحيح باستخدام الصورة الجبرية للعدد المركب؟

خواص الجذور التكعيبية للواحد الصحيح:

إذا كانت ١ ، ω ، $\omega^{٢}$ هى الجذور التكعيبية للواحد الصحيح فإن


١- ١ + ω + $\omega^{٢}$ = صفر (مجموع الجذور = صفر)

$(١ + \omega = -\omega^{٢} ، ١ + \omega^{٢} = -\omega ، \omega + \omega^{٢} = -١)$

٢- $\omega^{٣} = ١$

$(\omega = \frac{١}{\omega^{٢}} ، \omega^{٢} = \frac{١}{\omega})$

٣- الجذور التكعيبية للواحد الصحيح تقع على دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ١ وتكوّن رؤوس مثلث متساوى الأضلاع.



٤- $(\omega - \omega^{٢}) = \pm\sqrt{٣}$ ت ، $(\omega^{٢} - \omega) = \pm\sqrt{٣}$ ت

nezakr.natega4dk.net

مثال

(١) إذا كانت ١ ، ω ، $\omega^{٢}$ ، هى الجذور التكعيبية للواحد الصحيح . أوجد قيمة كل من:

(أ) $٥ + ٥\omega + ٥\omega^{٢}$ (ب) $(١ - \frac{٢}{\omega} - \frac{٢}{\omega^{٢}})(٣ + ٥\omega + ٥\omega^{٢})$

الحل

(أ) المقدار = $٥(١ + \omega + \omega^{٢})$ بأخذ العدد ٥ عامل مشترك

= ٥ × صفر = صفر

(ب) المقدار = $(١ - \frac{٢}{\omega} - \frac{٢}{\omega^{٢}})(٣ + ٥\omega + ٥\omega^{٢})$ بالتعويض عن $\frac{١}{\omega} = \omega^{٢}$ ، $\frac{١}{\omega^{٢}} = \omega$

$= (١ - ٢\omega^{٢} - ٢\omega)(٣ + ٥\omega + ٥\omega^{٢}) = (١ - ٢(\omega + \omega^{٢}))((٣ + ٥(\omega + \omega^{٢}))$

$= (١ - ٢(-١))(٣ + ٥(-١)) = (١ + ٢)(٣ - ٥) = -٦$

حاول أن تحل

(١) إذا كانت ١ ، ω ، $\omega^{٢}$ هى الجذور التكعيبية للواحد الصحيح . أوجد قيمة:

(أ) $(٢ + ٥\omega + ٢\omega^{٢})^{٥}$ (ب) $(\frac{١}{\omega} + \omega)^{٢} + (\frac{١}{\omega^{٢}} + \omega^{٢})^{٣}$

مثال

(٢) أثبت أن $[\frac{٥ - ٣\omega^{٢}}{٥\omega - ٣} - \frac{٢ - ٧\omega}{٢\omega^{٢} - ٧}]^{٤} = ٩$

الحل

المقدار $= [\frac{٥ - ٣\omega^{٢}}{٥\omega - ٣} - \frac{٢ - ٧\omega}{٢\omega^{٢} - ٧}]^{٤} = [\frac{٢\omega^{٣} - ٥\omega}{٢\omega^{٢} - ٧} - \frac{٥\omega^{٢} - ٣}{٥\omega - ٣}]^{٤}$

$= [\frac{\omega(٢\omega^{٢} - ٧)}{٢\omega^{٢} - ٧} - \frac{(٥\omega - ٣)\omega^{٢}}{٥\omega - ٣}]^{٤} = [\omega - \omega^{٢}]^{٤} = [\pm \sqrt{-٣}\ ت]^{٤} = ٩$

حاول أن تحل

(٢) أثبت أن $= [\frac{أ + ب\omega + جـ\omega^{٢}}{أ + ب\omega^{٢} + جـ\omega} - \frac{جـ + أ\omega^{٢} + ب\omega}{جـ + ب\omega^{٢} + أ\omega}]^{٨} = ٨١$

مثال

(٣) أثبت أن س $= \frac{-١ + \sqrt{-٣}}{٢}$ هو أحد حلول المعادلة $س^{١٠} + س^{٥} + ١ =$ صفر

الحل

$\therefore$ س $= \frac{-١ + \sqrt{-٣}}{٢} = \frac{-١ + \sqrt{٣}\ ت}{٢} = -\frac{١}{٢} + \frac{\sqrt{٣}}{٢}\ ت$

أى إن س تمثل أحد الجذور المركبة للواحد الصحيح

عندما س $= \omega$ فإن $\omega^{١٠} + \omega^{٥} + ١ = \omega + \omega^{٢} + ١ =$ صفر

عندما س $= س^{٢}$ فإن $\omega^{٢٠} + \omega^{١٠} + ١ = \omega^{٢} + \omega + ١ = ٠$

nezakr.nategа4dk.net

حاول أن تحل

(٣) كون المعادلة التربيعية التى جذراها $(١ + \omega - \omega^{٢})^{٣}$ ، $(١ - \omega + \omega^{٢})^{٣}$

تمـارين (٢ - ٣)

إذا كان ١ ، ω ، $\omega^{٢}$ هى الجذور التكعيبية للواحد الصحيح :

أكمل ما يأتى:

(١) $(٢ + ٥\omega + ٢\omega^{٢})^{٢} =$ .....

(٢) $(\omega - \omega^{٢})^{٤} =$ .....

(٣) $(\frac{١}{\omega} + \omega)^{٢} (\frac{١}{\omega^{٢}} + \omega^{٢})^{٢} =$ .....

(٤) إذا كان س $= \frac{-١ + \sqrt{٣}\, ت}{٢}$ فإن س^{٨} + س^{٤} = ...

(٥) $(\frac{١}{١ + \omega})(١ + \omega - \frac{٣}{\omega}) =$ .....

(٦) $١ + \omega^{٣} + \omega^{٣} =$ .....

(٧) إذا كان أ $= ٢\omega^{٢} - ٣\omega^{٢}$ ، ب $= ٣ + ٥\omega^{٢}$ فإن أ^{٢} + ب^{٢} = ...

(٨) $\sum_{ر=١}^{٣} \omega^{ر} =$ .....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(٩) مرافق العدد ω يساوى

أ ω ب $\omega^{٢}$

جـ ١ د $-\omega$

(١٠) $(\omega^{٢} + \frac{١}{\omega})(١ + \frac{١}{\omega^{٢}})^{٢} =$

أ ٢ ب صفر

جـ -٣ د -٥

(١١) $(أ + ب\omega + أ\omega^{٢})(أ + ب\omega^{٢} + أ\omega^{٤}) =$

أ ١ ب أ - ب

جـ (أ - ب)^{٢} د ب^{٢} - أ^{٢}

nezakr.natega4dk.net

(١٢) $(١ + ٢\omega^{٥} + \omega^{٢})(\frac{١}{\omega^{٢}} + ٢\omega + ١)(\frac{١}{\omega^{٤}} + \omega + ١) =$

أ صفر ب ١

جـ -١ د ٢

(١٣) $\frac{\text{أ} - \text{ى}\omega}{\text{أ}\omega^{٢} - \text{ى}} - \omega^{٢} =$

أ ٣ت ب $\pm \sqrt{٣}$ ت

جـ -٣ د ٣

(١٤) إذا كان $(١ + \omega)^{٧} = \text{أ} + \text{ب}\omega$ حيث أ ، ب عددان حقيقيان فإن (أ ، ب) =

أ (٠ ، -١) ب (١ ، ١)

جـ (٠ ، ١) د (١ ، -١)

(١٥) إذا كان $(١ + \omega)^{\text{ن}} = (١ + \omega^{٢})^{\text{ن}}$ فإن أقل قيمة لـ ن الصحيحة الموجبة هى

أ ٢ ب ٣

جـ ٥ د ٦

(١٦) $١ + \omega + \omega^{٢} + \omega^{٣} + ... + \omega^{١٠٠} =$

أ صفر ب ١

جـ ω د $-\omega^{٢}$

(١٧) إذا كان $\text{ع} = \omega^{\text{س}}$ فإن $|\text{ع}| =$ ..... حيث س عدد صحيح موجب

أ ١ ب ω

جـ س د $\omega^{٢}$

(١٨) $\sum_{\text{ر}=١}^{٦} \omega^{\text{ر}} + ١ =$

أ صفر ب ٦

جـ ١ د $\omega + ١$

(١٩) أثبت صحة المتطابقات الآتية:

أ $(١ - \omega + \omega^{٢})(١ - \omega^{٢} + \omega^{٤})(١ - \omega^{٤} + \omega^{٨})(١ - \omega^{٨} + \omega^{١٦}) = ٢^{٤}$

ب $(\frac{\omega}{\omega ٢ + ١})^{٢} + (\frac{١ + ٢\omega^{٢}}{\omega^{٢}})^{٢} = \frac{-١٠}{٣}\omega^{٢}$

جـ $[\frac{١}{١ + \omega\text{ت}} - \frac{\omega + \text{ت}}{١ + \omega\text{ت}^{٢}}]^{٨} = ١٦$

د $[\frac{٥ - ٣\omega^{٢}}{٣ - ٥\omega} - \frac{٢ - ٧\omega}{٧ - ٢\omega^{٢}}]^{٢} = -٣$

nezakr.nategа4dk.net

هـ $(ω + ١)^{٨} = ω^{٢}$

و $(ω^{٤} + ω^{٢} + ١)^{٢} + (ω^{٤} + ω^{٢} - ١)^{٢} = ٤ω$

٢٠ أوجد قيمة كل مما يأتى:

أ $٥ + ٣ω + ٣ω^{٢}$

ب $(ω^{٢}٢ω + ω + ١)^{٢} + (ω^{٢}٢ω + ω٢ + ١)^{٢}$

جـ $\frac{(١ - ω^{٢})(١ - ω)^{٢}ω}{(٢ + ω^{٢})(١ + ω٢)}$

د $[\frac{١}{١ + ω٣} - \frac{١}{ω٣ + ١}]^{٢}$

هـ $(١ + \frac{١}{ω} + ت)(١ + \frac{١}{ω^{٢}} + ت)$

٢١ إذا كان س = $\frac{-١ + \sqrt{٣}ت}{٢}$ أثبت أن س^{٦} + ٦س^{٥} + ١٥ س^{٤} + ٢٠س^{٣} + ١٥س^{٢} + ٦س=٠ .

٢٢ إذا كان $\frac{١}{ω + ١}$ ، $\frac{١}{ω^{٢} + ١}$ هما جذرا معادلة تربيعية، فأوجد المعادلة .

٢٣ إذا كان ع = ٢ (ω + ت) (ω^{٢} + ت) أوجد الصور المختلفة للعدد ع، ثم أوجد الجذرين التربيعيين للعدد ع فى الصورة المثلثية.

٢٤ **تفكير إبداعى:** أوجد قيم ن التى تجعل $(٢ + ٥ω^{٢}٢ + ω)^{ن} = (٢ + ٢ω + ٥ω^{٢})^{ن}$

٢٥ أوجد : أ $\sum_{ر = صفر}^{١٠} ω^{ر}$ ب $\sum_{ر = صفر}^{١٠} (١ + ω^{ر} + ω^{٢ر})$

nezakr.natega4dk.net

الهندسة الفراغية

الوحدة الثالثة



الهندسة والقياس فى بعدين وثلاثة أبعاد

Geometry Measurement in two and three dimensions

مقدمة الوحدة

الهندسة هى علم دراسة مختلف أنواع الأشكال وصفاتها، كما أنها دراسة علاقة الأشكال والزوايا والمسافات ببعضها وتنقسم إلى جزأين:

الهندسة المستوية: وتختص بدراسة الأشكال الهندسية التى لها بعدين فقط، الهندسة الفراغية (الفضاء):وتختص بدراسة المجسمات التى لها ثلاثة أبعاد (طول، عرض، أرتفاع) وتتعامل مع فراغات مثل متوازى المستطيلات، والمجسمات الأسطوانية، والأجسام المخروطية والكروية.

وأول من استخدم الهندسة هم الأغريق واكتشف طاليس اثباتات لبعض النظريات ثم جمع أقليدس بعد ذلك كل النتائج الهندسية ونظمها فى كتاب أطلق عليه "المبادئ" ثم تطورت بعد ذلك إلى الهندسة التحليلية وهندسة المثلثات وهندسة منكوفسكى (ذات الأربعة أبعاد) والهندسة اللا إقليدية، وغيرها وفى هذه الوحدة سوف نتناول استخدام المتجهات فى دراسة المستقيمات والمستويات والعلاقة بينهما فى ثلاثة أبعاد.

أهداف الوحدة

فى نهاية هذه الوحدة، وبعد تنفيذ الأنشطة فيها، من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يتعرف النظام الإحداثى ذى الثلاثة أبعاد ويحلل المتجه فى الفراغ.
- يوجد المسافة بين نقطتين فى الفراغ وإحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة فى الفراغ.
- يتعرف على المتجهات فى الفراغ من خلال:
  - تمثيل المتجه بثلاثى مرتب.
  - متجهات الوحدة الأساسية فى الفراغ $\overrightarrow{س}$ = (١، ٠، ٠) ، $\overrightarrow{ص}$ = (٠، ١، ٠)، $\overrightarrow{ع}$ = (٠، ٠، ١).
  - التعبير عن أى متجه بدلالة متجهات الوحدة الأساسية $\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع}$
  - التعبير عن القطعة المستقيمة الموجهه فى الفراغ بدالة أحداثيات طرفيها.
- يتعرف حاصل الضرب القياسى وحاصل الضرب الاتجاهى لمتجهين فى المستوى والفراغ.
- يتعرف خواص حاصل الضرب القياسى والاتجاهى لمتجهين فى المستوى والفراغ.
- يتعرف الزاوية بين متجهين فى الفراغ.
- يتعرف تعامد متجهين فالفراغ.
- يحدد زوايا الاتجاه وجيوب تمامالاتجاه لمتجه فى الفراغ.
- يستخدم حاصل الضرب القياسى لايجاد المركبة الجبرية والاتجاهية لمتجه فى اتجاه متجه آخر
- يتعرف المعنى الهندسى لمعيار الضرب الاتجاهى.
- يتعرف حاصل ضرب الثلاثى القياسى والمعنى الهندسى له.

nezakr.nateg4dk.net

مصطلحات أساسية

فراغ	*space*	مستوى	*plane*	الضرب الثلاثى القياسى			
ثلاثى الأبعاد	*3D*	ضرب قياسي	*scalar product*		*scalar triple product*		
مسقط	*projection*	ضرب اتجاهي	*vector product*	متجه الوضع	*position vector*		
قاعدة اليد اليمنى	*right hand Rule*	مركبة المتجه	*component*	متجه الوحدة	*unit vector*		
متجه ثلاثى الرتب	*3D–vector*			معيار المتجه	*the norm of vector*		

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية


دروس الوحدة

الدرس (١ – ١): النظام الإحداثى المتعامد فى ثلاثة أبعاد.

الدرس (١ – ٢): المتجهات فى الفراغ.

الدرس (١ – ٣): ضرب المتجهات.

مخطط تنظيمى للوحدة



nezakr.natega4dk.net

النظام الإحداثى المتعامد فى ثلاثة أبعاد

The three- dimensional orthogonal coordinate system

سوف تتعلم

- تحديد موقع نقطة فى النظام الإحداثى ثلاثي الأبعاد.
- تعيين إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين فى الفراغ.
- إيجاد البعد بين نقطتين فى الفراغ.

مصطلحات أساسية

- فراغ *space*
- ثلاثي الأبعاد *3d*
- مسقط *projection*
- قاعدة اليد اليمنى *right hand rule*
- مستوى *plane*

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية

Scientific calculator


فكر وناقش

لتحديد موضع جسم على خط مستقيم يلزم معرفة بُعد هذا الجسم عن نقطة ثابتة (اختيارية) عليه، وتسمى نقطة الأصل (و).



وأ = س ∋ ح

لتحديد موضع جسم فى مستوى يلزم معرفة مسقط هذا الجسم على كل من محوري إحداثيات متعامدة.




أ = (س، ص) ∋ ح^{٢}

كيف يمكنك تحديد موضع جسم فى الفراغ؟

تعلم

النظام الإحداثى المتعامد فى ثلاثة أبعاد (ح^{٣})

the three- dimensional orthogonal coordinate system (R^3)




تتعين إحداثيات النقطة أ فى الفراغ بالنسبة إلى ثلاثة محاور متقاطعة فى نقطة واحدة ومتعامدة مثنى مثنى، وذلك بإيجاد مسقط هذه النقطة على كل محور.

فكر: فى النظام ثلاثى الأبعاد الإحداثى السابق، أوجد إحداثيات كل من النقط ب، جـ، ء

nezakr.natega4dk.net


مفاهيم أساسية:



١- قاعدة اليد اليمنى

عند تكوين النظام الإحداثى المتعامد فى ثلاثة أبعاد يجب اتباع قاعدة اليد اليمنى؛ حيث تشير أصابع اليد المنحنية من الاتجاه الموجب لمحور س إلى الاتجاه الموجب لمحور ص، ويشير اتجاه الإبهام إلى الاتجاه الموجب لمحور ع.

٢- مستويات الإحداثيات



- جميع النقط فى الفراغ التي إحداثياتها (س، ص، ٠) تقع فى المستوى الإحداثى س ص وتكون معادلته ع = صفر
- جميع نقط الفراغ التي إحداثياتها (س، ٠، ع) تقع فى المستوى الإحداثى س ع وتكون معادلته ص = صفر
- جميع نقط الفراغ التي إحداثياتها (٠، ص، ع) تقع فى المستوى الإحداثى ص ع وتكون معادلته س = صفر

مثال


(تعيين موضع نقطة فى الفراغ)

(١) عين موضع كل من النقط الآتية باستخدام نظام إحداثي متعامد ثلاثي الأبعاد:


(أ) أ (-٢، ٣، ٢)　(ب) ب (٣، -١، ٥)　(جـ) جـ (٤، ٠، -١)

الحل


(أ) لتعيين النقطة أ (-٢، ٣، ٢) نحدد النقطة (-٢، ٣) فى المستوى س ص، ثم نتحرك فى الاتجاه الموجب لمحور ع وحدتين، فنحصل على النقطة أ (-٢، ٣، ٢)



(ب) لتعيين النقطة ب (٣، -١، ٥) نحدد النقطة (٣، -١) فى المستوى س ص، ثم نتحرك فى الاتجاه الموجب لمحور ع ٥ وحدات، فتحصل على النقطة ب.



nezakr.natega4dk.net



ج لتعيين إحداثيات النقطة
جـ (٤، ٠، -١) نحدد النقطة (٤، ٠)
على محور س، ثم نتحرك فى
الاتجاه السالب لمحور ع وحدة
واحدة.

حاول أن تحل

١ أ عين موضع كل من النقط الآتية باستخدام نظام إحداثي متعامد ثلاثي الأبعاد:
أ (٣، ٢، ٣) ب (-١، ٤، ٣) جـ (٠، ٠، ٤)


ب أكمل:
١- بُعد النقطة أ (-١، ٢، ٣) عن المستوى الإحداثى س ص = ... وحدة طول.
٢- بُعد النقطة ب (٤، -٢، ١) عن المستوى الإحداثى ص ع = ... وحدة طول.

تعلم

تعلم: البعد بين نقطتين فى الفراغ *the distance between two points in space*

إذا كانت أ (س١، ص١، ع١)، ب (س٢، ص٢، ع٢) نقطتين فى الفراغ، فإن البُعد بين النقطتين أ، ب يعطى بالعلاقة

$$أب = \sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢ + (ع_٢ - ع_١)^٢}$$



مثال

٢ أثبت أن المثلث أ ب جـ حيث أ (٢، -١، ٣) ، ب(-٤، ٤ ، ٢) ، جـ (-٢، ٥، ١) قائم الزاوية فى جـ.

الحل

أ ب $= \sqrt{(س_٢ - س_١)^٢ + (ص_٢ - ص_١)^٢ + (ع_٢ - ع_١)^٢}$ قانون البعد بين نقطتين

$= \sqrt{(٢ + ٤)^٢ + (-١ - ٤)^٢ + (٣ - ٢)^٢} = \sqrt{٦٢}$

ب جـ $= \sqrt{(-٤ + ٢)^٢ + (٥ - ٤)^٢ + (١ - ٢)^٢} = \sqrt{٦}$

أ جـ $= \sqrt{(٢ + ٢)^٢ + (-١ - ٥)^٢ + (٣ - ١)^٢} = \sqrt{٥٦}$

nezakr.nateg4dk.net

∵ (أ ب)^{٢} = $(\sqrt{٦٢})^{٢}$ = ٦٢، (ب جـ)^{٢} + (أ جـ)^{٢} = $(\sqrt{٦})^{٢}$ + $(\sqrt{٥٦})^{٢}$ = ٦ + ٥٦ = ٦٢

∴ (أ ب)^{٢} = (ب جـ)^{٢} + (أ جـ)^{٢} ، ق(∠جـ) = ٩٠°

حاول أن تحل

(٢) أثبت أن النقط أ(٤، ٤، ٠) ، ب(٤، ٠، ٤) ، جـ (٠، ٤ ، ٤) هي رؤوس لمثلث متساوى الأضلاع، وأوجد مساحته.

تعلم

إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة

The coordinates of midpoint of a line segment

إذا كانت أ(س١، ص١، ع١)، ب(س٢، ص٢، ع٢) نقطتان فى الفراغ، فإن إحداثيات نقطة جـ التى تقع منتصف $\overline{أب}$ هى:

$$جـ\left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} ، \frac{ع_١ + ع_٢}{٢}\right)$$

مثال

(٣) إذا كانت أ(١، -٣، ٢)، ب (٤، -١، ٤)، أوجد إحداثيات نقطة منتصف $\overline{أب}$

الحل

إحداثيات نقطة المنتصف $= \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} ، \frac{ع_١ + ع_٢}{٢}\right)$

$= \left(\frac{١ + ٤}{٢} ، \frac{-٣ - ١}{٢} ، \frac{٢ + ٤}{٢}\right)$

$= (\frac{٥}{٢} ، -٢ ، ٣)$

حاول أن تحل

(٣) أوجد إحداثيات نقطة منتصف $\overline{جـ ء}$ حيث جـ (٠، ٤، -٢)، ء (-٦، ٣، ٤)

تفكير ناقد: إذا كانت جـ (٢، ٢، ٦) هى نقطة منتصف $\overline{أب}$ حيث أ (١، -٤ ، ٠) أوجد إحداثيات نقطة ب

تمـارين (٣-١)

أكمل ما يأتي:

(١) إذا كانت النقطة (س، ص، ع) تقع فى المستوى الإحداثى س ص فإن ع = ...


(٢) المستقيمان $\overleftrightarrow{س س}$ ، $\overleftrightarrow{ع ع}$ يكونان المستوى الإحداثى ..... الذي معادلته .....

(٣) الشكل المقابل يمثل متوازي مستطيلات فى نظام إحداثي متعامد.

أحد رؤوسه ينطبق على نقطة الأصل و(٠، ٠، ٠)

فإن إحداثيات النقطة ب هى .....

و إحداثيات النقطة جـ هى .....



nezakr.natega4dk.net

(٤) إذا كانت أ (١، -١، ٤) ، ب (٠، -٣، ٢) فإن إحداثيات نقطة منتصف $\overline{أب}$ هى .....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(٥) بُعد النقطة (٣، -١، ٢) عن المستوى الإحداثى س ع يساوي ..... وحدة طول

أ ٣ ب -١

جـ ٢ د ١

(٦) طول العمود المرسوم من النقطة (-٢، ٣، ٤) على محور س يساوي ..... وحدة طول.

أ ٢ ب ٣

جـ ٥ د ٤

(٧) إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة التي طرفاها (-٣، ٢، ٤)، (٥، ١، ٨) هى

أ $(١، \frac{٣}{٢}، ٦)$ ب (٢، -١، ٤)

جـ (٨، -١، ٤) د $(١، -\frac{٣}{٢}، ٢)$

أجب عن الأسئلة الآتية:

(٨) أوجد البعد بين النقطتين أ ، ب فى كل مما يأتي:

أ أ (٧، ٠، ٤) ، ب (١ ، ٠ ، ٠) ب أ (٤، ١، ٩) ، ب (٢ ، ١ ، ٦)


جـ أ (١ ، ١ ، -٧) ، ب (-٢ ، -٣ ، -٧)

(٩) أثبت أن المثلث الذى رؤوسه النقط الآتية هو مثلث قائم الزاوية، وأوجد مساحته:

أ (-٢، ٥ ، ٢)، (٠ ، ٠ ، ٢)، (٠ ، ٤ ، ٠)

ب (-٤ ، ٤ ، ١)، (٢ ، -١ ، ٢)، (-٢ ، ٥ ، ٠)

(١٠) الشكل المقابل يمثل مكعبًا حجمه ٢٧ وحدة مكعبة
أحد رؤوسه ينطبق على نقطة الأصل
أوجد إحداثيات باقي الرؤوس .



nezakr.natega4dk.net

(١١) أثبت أن المثلث الذي رؤوسه النقط (٧، ١، ٣) ، (٥، ٣، ك)، (٣، ٥، ٣) هو مثلث متساوى الساقين، ثم أوجد قيمة (قيم) ك التي تجعل المثلث متساوي الأضلاع.

(١٢) أوجد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة $\overline{أب}$ في كل مما يأتي:

أ أ(٣، -١، ٤) ، ب (٢، ٠، -١)

ب أ(-٣، ٥، ٥) ، ب (-٦، ٤، ٨)

(١٣) إذا كانت جـ (-١، ٤، ٠) منتصف القطعة المستقيمة $\overline{أب}$ حيث ب (٤، -٢، ١) أوجد إحداثيات النقطة أ.

(١٤) **تفكير إبداعي:**
إذا كانت أ ∈ محور س، ب ∈ محور ص، جـ ∈ محور ع وكانت النقطة (١، -١، صفر) منتصف $\overline{أب}$ ، والنقطة (٠، -١، ٢) منتصف $\overline{ب جـ}$. أوجد إحداثيات منتصف $\overline{أجـ}$

(١٥) **الكتابة في الرياضيات:** إذا كانت جميع النقط في الفراغ التي على الصورة (س، ص، ٠) تقع في المستوى الديكارتي س ص ومعادلته ع = ٠، فأوجد معادلة المستوى الذي تقع فيه جميع النقط في الفراغ الذى على الصورة (س، ص، ٢)

(١٦) **اكتشف الخطأ:** إذا كانت النقطة ب (-١، ٤، ٢) منتصف القطعة المستقيمة $\overline{أجـ}$ حيث أ(١ ، ٠ ، ٢) أوجد إحداثيات النقطة جـ

حل أشرف

$$جـ = \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢}، \frac{ص_١ + س_٢}{٢}، \frac{ع_١ ع_٢}{٢}\right)$$

$$= \left(\frac{-١ + ١}{٢}، \frac{٤ + ٠}{٢}، \frac{٢ + ٢}{٢}\right)$$

$$= (٠، ٢، ٠)$$

حل زياد

نفرض جـ (س، ص، ع)

$\therefore \frac{١ + س}{٢} = -١ \longleftarrow$ س = -٣

$\frac{٠ + ص}{٢} = ٤ \longleftarrow$ ص = ٨

$\frac{٢ + ع}{٢} = ٢ \longleftarrow$ ع = ٢

$\therefore$ جـ (-٣، ٨، ٢)

أي الحلين صوابًا؟ ولماذا؟

nezakr.natega4dk.net

المتجهات فى الفراغ

Vectors in space

مقدمة:

درست سابقًا الكميات القياسية والكميات المتجهة، وعلمت أن المتجه يُمثَّل بقطعة مستقيمة موجهة تحدد بمقدار (معيار المتجه)، واتجاه، وفي هذا الدرس نتناول المتجهات فى الفراغ، وهو (نظام إحداثي ذو ثلاثة أبعاد).

سوف تتعلم

- تمثيل المتجه بثلاث رتب.
- متجه الموضع فى الفراغ.
- متجهات الوحدة الأساسية فى الفراغ.
- التعبير عن متجه بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.
- التعبير عن القطعة المستقيمة الموجهة فى الفراغ بدلالة إحداثيات طرفيها.
- تساوي متجهين فى الفراغ.
- معيار المتجه فى الفراغ.
- متجه الوحدة فى اتجاه متجه فى الفراغ.
- جمع المتجهات فى الفراغ.
- ضرب المتجهات فى عدد حقيقي.

مصطلحات أساسية

- متجه الوضع فى الفراغ *Position vector in space*
- معيار المتجه *the norm vector*
- متجه الوحدة *Unit vector*
- الضرب القياسى *Scalar product*
- الضرب الاتجاهى *Vector product*

تعلم

متجه الموضع فى الفراغ *position vector in space*

يعرف متجه الموضع للنقطة أ (أس، أص، أع) بالنسبة لنقطة الأصل و (٠، ٠، ٠) على أنه القطعة المستقيمة الموجهة التي بدايتها نقطة الأصل ونهايتها النقطة أ.

- ويرمز لمتجه موضع النقطة أ بالرمز $\overrightarrow{أ}$ أي أن $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع)
- أس تسمى مركبة المتجه $\overrightarrow{أ}$ فى اتجاه محور س.
- أص تسمى مركبة المتجه $\overrightarrow{أ}$ فى اتجاه محور ص.
- أع تسمى مركبة المتجه $\overrightarrow{أ}$ فى اتجاه محور ع.

معيار المتجه *the norm of vector*

هو طول القطعة المستقيمة الموجهة التي تمثل المتجه.

فإذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع) فإن من قانون البعد بين نقطتين يكون

$$||\overrightarrow{أ}|| = \sqrt{(أس)^٢ + (أص)^٢ + (أع)^٢}$$

مثال

(١) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (٢، -١، ٣) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٠، ٤، -٣) فإن

- مركبة المتجه $\overrightarrow{أ}$ فى اتجاه محور س هى ٢
- مركبة المتجه $\overrightarrow{ب}$ فى اتجاه محور ع هى -٣

$$||\overrightarrow{أ}|| = \sqrt{٢^٢ + (-١)^٢ + (٣)^٢} = \sqrt{١٤}$$

$$||\overrightarrow{ب}|| = \sqrt{(٠)^٢ + (٤)^٢ + (-٣)^٢} = ٥$$

المتجه $\overrightarrow{ب}$ يقع فى المستوى الإحداثى ص ع (تنعدم مركبة $\overrightarrow{ب}$ فى اتجاه محور س

nezakr.nategа4dk.net


حاول أن تحل

(١) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-١، ٤، ٢) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٣، ١، ٠) أوجد

(أ) أس + ب ص (ب) $||\overrightarrow{أ}|| + ||\overrightarrow{ب}||$

جمع المتجهات فى الفراغ

Adding 3 D vectors



إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع)، $\overrightarrow{ب}$ = (ب س، ب ص، ب ع) فإن:

$\overrightarrow{جـ} = \overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$ = (أس + ب س، أص + ب ص، أع + ب ع) = (جـس، جـص، جـع)

مثال

(٢) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-٢، ٣، ١)، $\overrightarrow{ب}$ = (٠، -٢، ٤)، فإن:

$\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$ = (-٢، ٣، ١) + (٠، -٢، ٤) = (-٢+٠، ٣+ (-٢)، ١+ ٤) = (-٢، ١، ٥)

حاول أن تحل

(٢) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (٤، -٤، ٠) ، $\overrightarrow{ب}$ = (-١، ٥، ٢) أوجد $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$

خواص عملية جمع المتجهات فى الفراغ

لأي متجهين $\overrightarrow{أ}$، $\overrightarrow{ب}$ ∈ ح^{٣} فإن:

١- خاصية الانغلاق: $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$ ∈ ح^{٣}

٢- خاصية الإبدال: $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{ب} + \overrightarrow{أ}$

٣- خاصية التجميع: $(\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}) + \overrightarrow{جـ} = \overrightarrow{أ} + (\overrightarrow{ب} + \overrightarrow{جـ})$

٤- العنصر المحايد الجمعي المتجه الصفري: $\overrightarrow{و}$ = (٠، ٠، ٠) هو العنصر المحايد الجمعي فى ح^{٣}

أي أن: $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{و} = \overrightarrow{و} + \overrightarrow{أ} = \overrightarrow{أ}$

٥- المعكوس الجمعي: لكل متجه $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع) ∈ ح^{٣} يوجد

$-\overrightarrow{أ}$ = (-أس، -أص، -أع) ∈ ح^{٣} بحيث: $\overrightarrow{أ} + (-\overrightarrow{أ}) = (-\overrightarrow{أ}) + \overrightarrow{أ} = \overrightarrow{و}$

ضرب المتجه فى عدد حقيقى

Multiplying avector by ascalar

إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع) ∈ ح^{٣} وكان ك ∈ ح فإن:

ك $\overrightarrow{أ}$ = ك (أس، أص، أع) = (ك أس، ك أص، ك أع) ∈ ح^{٣}

nezakr.natega4dk.net

فمثلاً: ٣ (٢، -١، ٤) = (٦، -٣، ١٢)

$\frac{١}{٢}$ (٤، ٩، ٦) = (٢، $\frac{٩}{٢}$، ٣)

-٢ (١، -٣، -٤) = (-٢، ٦، ٨)

خواص ضرب المتجهات فى عدد حقيقى

إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ∈ ح^{٣} وكان ك، ل ∈ ح فإن

١- خاصية التوزيع

- ك ($\overrightarrow{أ}$ + $\overrightarrow{ب}$) = ك $\overrightarrow{أ}$ + ك $\overrightarrow{ب}$
- (ك + ل) $\overrightarrow{أ}$ = ك $\overrightarrow{أ}$ + ل $\overrightarrow{أ}$

٢- خاصية الدمج

- ك (ل $\overrightarrow{أ}$) = ل (ك $\overrightarrow{أ}$) = (ك ل) $\overrightarrow{أ}$

مثال

(٣) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-١، ٥، ٢) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٤، -١، ٣) فإن

١- ٢$\overrightarrow{أ}$ - ٣$\overrightarrow{ب}$ = ٢(-١، ٥، ٢) -٣ (٤، -١، ٣)

= (-٢، ١٠، ٤) + (-١٢، ٣، -٩)

= (-١٤، ١٣، -٥)

٢- أوجد المتجه $\overrightarrow{جـ}$ حيث ٢ $\overrightarrow{جـ}$ + ٣ $\overrightarrow{أ}$ = ٢ $\overrightarrow{ب}$

∴ ٢$\overrightarrow{جـ}$ + ٣$\overrightarrow{أ}$ = ٢$\overrightarrow{ب}$ بإضافة -٣$\overrightarrow{أ}$ للطرفين

∴ ٢$\overrightarrow{جـ}$ = ٢$\overrightarrow{ب}$ - ٣$\overrightarrow{أ}$

∴ ٢$\overrightarrow{جـ}$ = ٢ (٤، -١، ٣) -٣ (-١، ٥، ٢)

= (٨، -٢، ٦) + (٣، -١٥، -٦)

= (١١، -١٧، ٠)

∴ $\overrightarrow{جـ}$ = $\frac{١}{٢}$ (١١، -١٧، ٠) = ($\frac{١١}{٢}$ ، $\frac{-١٧}{٢}$، ٠) بالضرب فى $\frac{١}{٢}$

حاول أن تحل

(٣) إذا كان $\overrightarrow{جـ}$ = (٢، -٣، ١)، $\overrightarrow{ء}$ = (٠، ٢، -٢)

(أ) أوجد ٥$\overrightarrow{جـ}$ - ٢ $\overrightarrow{ء}$

(ب) إذا كان ٣$\overrightarrow{أ}$ - ٤ $\overrightarrow{ء}$ = $\overrightarrow{جـ}$ فأوجد $\overrightarrow{أ}$

nezakr.nategа4dk.net

تساوى المتجهات فى الفراغ

إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (أس، أص، أع)، $\overrightarrow{ب}$ = (ب س، ب ص، ب ع) فإن:

$\overrightarrow{أ} = \overrightarrow{ب}$ إذا و فقط إذا كان: أس = ب س، أص = ب ص، أع = ب ع

مثال

(٤) أوجد قيمة ل ، م، ن التى تجعل المتجهين $\overrightarrow{أ}$ = (ل - ٤، م^{٢} - ٣ ، ١)، $\overrightarrow{ب}$ = (٥، ١، ن^{٢}) متساويين

الحل

∵ $\overrightarrow{أ} = \overrightarrow{ب}$

∴ أس = ب س ⟵ ل - ٤ = ٥ ⟵ ل = ٩

أص = ب ص ⟵ م^{٢} - ٣ = ١ ⟵ م^{٢} = ٤ ⟵ م = ±٢

أع = ب ع ⟵ ن^{٢} = ١ ⟵ ن = ±١

حاول أن تحل

(٤) إذا كان (٢س + ١، ٥، ك + ٤) = (-١، ص^{٢} - ٤، س + ١) فما قيمة س، ص، ك؟

متجه الوحدة

يعرف متجه الوحدة بأنه المتجه الذى معياره يساوى وحدة الأطوال

فمثلًا:


$\overrightarrow{أ}$ = $(\frac{-٣}{١٣}، \frac{٤}{١٣}، \frac{١٢}{١٣})$ متجه وحدة لأن: $||\overrightarrow{أ}|| = \sqrt{(\frac{-٣}{١٣})^{٢} + (\frac{٤}{١٣})^{٢} + (\frac{١٢}{١٣})^{٢}} = ١$

حاول أن تحل

(٥) بين أى المتجهات الآتية يمثل متجه وحدة

$\overrightarrow{أ}$ = $(\frac{١}{٣}، \frac{٢}{٣}، \frac{٢}{٣})$ $\overrightarrow{ب}$ = $(\frac{١}{٥}، \frac{٤}{٥}، \frac{-\sqrt{٥}}{٥})$

متجهات الوحدة الأساسية ($\overrightarrow{س}$، $\overrightarrow{ص}$، $\overrightarrow{ع}$)



هى قطع مستقيمة موجهة بدايتها نقطة الأصل، ومعيارها وحدة الأطوال واتجاهها هو الاتجاهات الموجبة لمحاور الإحداثيات س، ص، ع على الترتيب أى إن:

$\overrightarrow{س}$ = (١، ٠، ٠) ، $\overrightarrow{ص}$ = (٠، ١، ٠)، $\overrightarrow{ع}$ = (٠، ٠، ١)

وتسمى مجموعات المتجهات $\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع}$ مجموعة يمينية من متجهات الوحدة الأساسية

تفكير ناقد

عبر عن المتجهات (-١، ٠، ٠) ، (٠، -١، ٠)، (٠، ٠، -١) بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.

nezakr.natega4dk.net

التعبير عن متجه فى الفراغ بدلالة متجهات الوحدة الأساسية

إذا كان $\overrightarrow{أ} = (أ_س، أ_ص، أ_ع) \in ح^3$ فإن المتجه $\overrightarrow{أ}$ يمكن كتابته على الصورة

$$\overrightarrow{أ} = (أ_س، ٠، ٠) + (٠، أ_ص، ٠) + (٠، ٠، أ_ع)$$
$$= أ_س(١، ٠، ٠) + أ_ص(٠، ١، ٠) + أ_ع(٠، ٠، ١)$$
$$= أ_س \overrightarrow{س} + أ_ص \overrightarrow{ص} + أ_ع \overrightarrow{ع}$$

مثال

(٥) إذا كان $\overrightarrow{أ} = ٢\overrightarrow{س} - ٣\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب} = -\overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص}$ أوجد

(أ) $٢\overrightarrow{أ} - ٣\overrightarrow{ب}$ (ب) $||\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}||$ ، $||\overrightarrow{أ}|| + ||\overrightarrow{ب}||$ ماذا تستنتج؟

الحل

(أ) $٢\overrightarrow{أ} - ٣\overrightarrow{ب} = ٢(٢\overrightarrow{س} - ٣\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}) - ٣(-\overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص})$

$= ٤\overrightarrow{س} - ٦\overrightarrow{ص} + ٢\overrightarrow{ع} + ٣\overrightarrow{س} + ٦\overrightarrow{ص}$

$\therefore ٢\overrightarrow{أ} - ٣\overrightarrow{ب} = ٧\overrightarrow{س} + ٢\overrightarrow{ع}$

(ب) $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب} = (٢\overrightarrow{س} - ٣\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}) + (-\overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص})$

$= \overrightarrow{س} - ٥\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}$

$\therefore ||\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}|| = \sqrt{١^٢ + (-٥)^٢ + ١^٢} = \sqrt{٢٧}$

$||\overrightarrow{أ}|| + ||\overrightarrow{ب}|| = \sqrt{٢^٢ + (-٣)^٢ + ١^٢} + \sqrt{(-١)^٢ + (-٢)^٢}$

$= \sqrt{١٤} + \sqrt{٥}$ نلاحظ أن $||\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}|| \neq ||\overrightarrow{أ}|| + ||\overrightarrow{ب}||$


حاول أن تحل

(٦) إذا كان $\overrightarrow{أ} = -٣\overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع} + ٥\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ب} = -٢\overrightarrow{ع} + ٣\overrightarrow{س}$ أوجد

(أ) $٣\overrightarrow{أ} - ٥\overrightarrow{ب}$ (ب) $||\overrightarrow{أ} - \overrightarrow{ب}||$

التعبير عن قطعة مستقيمة موجهة فى الفراغ بدلالة إحداثيات طرفيها

بفرض أن أ، ب نقطتان فى الفراغ، متجها موضعهما بالنسبة لنقطة الأصل هما $\overrightarrow{وأ}$ ، $\overrightarrow{وب}$ على الترتيب.



$\therefore \overrightarrow{وأ} + \overrightarrow{أب} = \overrightarrow{وب}$

$\therefore \overrightarrow{أب} = \overrightarrow{وب} - \overrightarrow{وأ}$

أو $\overrightarrow{أب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ}$

nezakr.nateg4dk.net

مثال

٦ إذا كان أ (-٢، ٣، ١) ، ب (٤، ٠، ٢) فإن

$\overrightarrow{أب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ}$

$= (٤، ٠، ٢) - (-٢، ٣، ١) = (٦، -٣، ١)$

$\overrightarrow{ب أ} = \overrightarrow{أ} - \overrightarrow{ب}$

$= (-٢، ٣، ١) - (٤، ٠، ٢) = (-٦، ٣، -١)$

نلاحظ أن: $\overrightarrow{أب} = -\overrightarrow{ب أ}$

حاول أن تحل

٧ أ إذا كان أ (٢، -٣، ٠)، ب (١، ٤، -١) أوجد $\overrightarrow{أب}$

ب إذا كان أ (١، ١، -٢)، $\overrightarrow{أب} = (٤، -١، ٢)$ أوجد إحداثيات نقطة ب

متجه الوحدة فى اتجاه متجه معلوم

The unit vector in the direction of agiven vector

إذا كان $\overrightarrow{أ} = (أ_س، أ_ص، أ_ع) \in ح^٣$ فإن متجه الوحدة فى اتجاه المتجه $\overrightarrow{أ}$ يرمز له بالرمز $ى_{\overrightarrow{أ}}$ يعطى بالعلاقة:

$$ى_{\overrightarrow{أ}} = \frac{\overrightarrow{أ}}{||\overrightarrow{أ}||}$$

مثال

٧ إذا كان $\overrightarrow{أ} = (-٢، ٢، ١)$، $\overrightarrow{ب} = (٣، ١، -٢)$ أوجد متجه الوحدة فى اتجاه كل من $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ، $\overrightarrow{أب}$

الحل

$$ى_{\overrightarrow{أ}} = \frac{\overrightarrow{أ}}{||\overrightarrow{أ}||} = \frac{(-٢، ٢، ١)}{\sqrt{١ + ٤ + ٤}} = (\frac{-٢}{٣}، \frac{٢}{٣}، \frac{١}{٣})$$

$$ى_{\overrightarrow{ب}} = \frac{\overrightarrow{ب}}{||\overrightarrow{ب}||} = \frac{(٣، ١، -٢)}{\sqrt{٤ + ١ + ٩}} = (\frac{٣}{\sqrt{١٤}}، \frac{١}{\sqrt{١٤}}، \frac{-٢}{\sqrt{١٤}})$$

$\overrightarrow{أب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ}$

$= (٣، ١، -٢) - (-٢، ٢، ١) = (٥، -١، -٣)$

$\therefore ى_{\overrightarrow{أب}} = \frac{\overrightarrow{أب}}{||\overrightarrow{أب}||}$

$= \frac{(٥، -١، -٣)}{\sqrt{٩ + ١ + ٢٥}} = (\frac{٥}{\sqrt{٣٥}}، \frac{-١}{\sqrt{٣٥}}، \frac{-٣}{\sqrt{٣٥}})$


nezakr.natega4dk.net

حاول أن تحل

(٨) أوجد متجه الوحدة فى اتجاه كل من المتجهات الآتية:

(أ) $\overrightarrow{أ} = (٨، -٤، -٨)$ (ب) $\overrightarrow{ب} = \overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع}$ (ج) $\overrightarrow{جـ} = ٣\overrightarrow{س} - ٤\overrightarrow{ع}$

زوايا الاتجاه وجيوب تمام الاتجاه لمتجه فى الفراغ



إذا كان $\overrightarrow{أ} = (أ_س، أ_ص، أ_ع)$ متجه فى الفراغ وكانت $(\theta_س، \theta_ص، \theta_ع)$ قياسات الزوايا التى يصنعها المتجه مع الاتجاه الموجب لمحاور س، ص، ع على الترتيب فإن:

$أ_س = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_س$ ، $أ_ص = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_ص$ ، $أ_ع = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_ع$

$\therefore \overrightarrow{أ} = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_س \overrightarrow{س} + ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_ص \overrightarrow{ص} + ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_ع \overrightarrow{ع}$

$= ||\overrightarrow{أ}|| (\text{جتا } \theta_س \overrightarrow{س} + \text{جتا } \theta_ص \overrightarrow{ص} + \text{جتا } \theta_ع \overrightarrow{ع})$

$(\theta_س، \theta_ص، \theta_ع)$ تسمى زوايا الاتجاه للمتجه $\overrightarrow{أ}$


حيث $\theta_س$، جتا $\theta_ص$، جتا $\theta_ع \in [\ ٠ ، \pi\ ]$

جتا $\theta_س$، جتا $\theta_ص$، جتا $\theta_ع$ تسمى جيوب تمام الاتجاه للمتجه $\overrightarrow{أ}$

لاحظ أن: جتا $\theta_س \overrightarrow{س}$ + جتا $\theta_ص \overrightarrow{ص}$ + جتا $\theta_ع \overrightarrow{ع}$ تمثل متجه الوحدة فى اتجاه المتجه $\overrightarrow{أ}$ أى إن

$$\text{جتا}^٢\theta_س + \text{جتا}^٢\theta_ص + \text{جتا}^٢\theta_ع = ١$$

مثال



(٨) الشكل المقابل يمثل متجه $\overrightarrow{أ}$ معياره ١٠ وحدات

(أ) عبر عن المتجه $\overrightarrow{أ}$ بالصورة الجبرية (المركبات الكارتيزية)

(ب) أوجد قياسات زوايا الاتجاه للمتجه $\overrightarrow{أ}$

الحل

أولًا نحلل $\overrightarrow{أ}$ إلى مركبتين: الأولى فى اتجاه $\overrightarrow{وع}$ ومقدارها

$أ_ع = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جتا } \theta_ع = ١٠ \text{ جتا } ٤٠ = ٧,٦٦$

والثانية تقع فى المستوى الإحداثى س ص

$أ_{س ص} = ||\overrightarrow{أ}|| \text{ جا } \theta_ع = ١٠ \text{ جا } ٤٠ = ٦,٤٢٨$

الآن نحلل المركبة $أ_{س ص}$ إلى مركبتين: الأولى فى اتجاه $\overrightarrow{وس}$ ومقدارها

$أ_س = أ_{س ص} \text{ جتا } ٧٠ = ٦,٤٢٨ \text{ جتا } ٧٠ = ٢,١٩٩$

والثانية فى اتجاه $\overrightarrow{وص}$ ومقدارها

$أ_ص = أ_{س ص} \text{ جا } ٧٠ = ٦,٤٢٨ \text{ جا } ٧٠ = ٦,٠٤$

nezakr.nateg4dk.net

وبذلك تكون الصورة الكارتيزية للمتجه $\overrightarrow{آ}$ هى

$$\overrightarrow{آ} = أ_س \overrightarrow{س} + أ_ص \overrightarrow{ص} + أ_ع \overrightarrow{ع}$$
$$= ٢,١٩٩ \overrightarrow{س} + ٦,٠٤ \overrightarrow{ص} + ٧,٦٦ \overrightarrow{ع}$$

ثانيًا: ولإيجاد قياسات زوايا الاتجاه نوجد متجه الوحدة فى اتجاه $\overrightarrow{آ}$

$$\overrightarrow{ى_آ} = \frac{\overrightarrow{آ}}{||\overrightarrow{آ}||} = \frac{١}{١٠}(٢,١٩٩ \overrightarrow{س} + ٦,٠٤ \overrightarrow{ص} + ٧,٦٦ \overrightarrow{ع})$$
$$= ٠,٢١٩٩ \overrightarrow{س} + ٠,٦٠٤ \overrightarrow{ص} + ٠,٧٦٦ \overrightarrow{ع}$$


∴ جتا $\theta_س$ = ٠,٢١٩٩ ومنها $\theta_س$ = جتا$^{-١}$ (٠,٢١٩٩) = ٧٧,٣°

جتا $\theta_ص$ = ٠,٦٠٤ ومنها $\theta_ص$ = جتا$^{-١}$ (٠,٦٠٤) = ٥٢,٨٤°

جتا $\theta_ع$ = ٠,٧٦٦ ومنها $\theta_ع$ = جتا$^{-١}$ (٠,٧٦٦) = ٤٠°

حاول أن تحل

(٩) الشكل المقابل يمثل قوة $\overrightarrow{ق}$ مقدارها ٢٠٠ نيوتن



(أ) عبر عن القوة $\overrightarrow{ق}$ بالصورة الجبرية.

(ب) أوجد قياسات زوايا الاتجاه للقوة $\overrightarrow{ق}$.

تمـارين (٣-٢)

أكمل ما يأتى:

(١) إذا كان $\overrightarrow{آ}$ = (-٣، ٤، ٢) فإن $||\overrightarrow{آ}||$ = ...

(٢) إذا كان $\overrightarrow{آ} = \overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص} + ٣\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب} = ٣\overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع}$ فإن $\overrightarrow{آ} - \overrightarrow{ب}$ = ...

(٣) متجه الوحدة فى اتجاه $\overrightarrow{آب}$ حيث أ (-١، ٢، ٠) ، ب (٣، -١، ٢) هو .....

(٤) المتجه $\overrightarrow{آ} = ٣\overrightarrow{س} + \overrightarrow{ص} - ٢\overrightarrow{ع}$ يصنع زاوية قياسها ..... مع الاتجاه الموجب لمحور س.

(٥) المتجه $\overrightarrow{ب} = \overrightarrow{س} + ٢\overrightarrow{ص}$ يصنع زاوية قياسها ..... مع الاتجاه الموجب لمحور ع.

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(٦) إذا كان $\overrightarrow{آ}$ = (-٢، ك، ١) وكان $||\overrightarrow{آ}||$ = ٣ وحدات فإن ك = ...

(أ) ٤ (ب) -٤ (جـ) ± ٢ (د) $\sqrt{١٤}$

nezakr.nateg4dk.net

(٧) إذا كان ٣٠°، ٧٠°، θ هى زوايا الاتجاه لمتجه فإن احدى قيم θ = ...

أ ١٠٠° ب ٨٠° ج ٢٦٠° د ٦٨,٦١°

(٨) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-١، ٥، -٢)، $\overrightarrow{ب}$ = (٣، ١، ١) وكان $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب} + \overrightarrow{جـ} = \overrightarrow{س}$ فإن $\overrightarrow{جـ}$ = ...

أ $\overrightarrow{س} + ٦\overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع}$ ب $-\overrightarrow{س} - ٦\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}$

ج $\overrightarrow{س} + ٤\overrightarrow{ص} - ٣\overrightarrow{ع}$ د $\overrightarrow{س} + ٤\overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع}$

(٩) جيوب تمام زوايا الاتجاه للمتجه $\overrightarrow{أ}$ = (-٢، ١، ٢) هى .....

أ (-٢، ١، ٢) ب $(\frac{-٢}{٣}، \frac{١}{٣}، \frac{٢}{٣})$ ج $(\frac{-٥}{٢}، ٥، \frac{٥}{٢})$ د (-١، ١، ١)

أجب عما يأتى:

(١٠) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (٢، -٣، ١) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٤، -٢، ٠) ، $\overrightarrow{جـ}$ = (-٦، ٠، ٣) أوجد كلًّا من المتجهات الآتية:

أ $\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$ ب $٣\overrightarrow{أ} - \frac{١}{٣}\overrightarrow{جـ}$ ج $\frac{٣}{٢}\overrightarrow{ب} + \frac{٢}{٣}\overrightarrow{جـ}$


(١١) إذا كان $\overrightarrow{أ} = ٢\overrightarrow{س} - ٣\overrightarrow{ص} + ٥\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب} = ٤\overrightarrow{ص} - ٢\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{جـ} = ٤\overrightarrow{س} + ٥\overrightarrow{ص} - ٦\overrightarrow{ع}$ أوجد كلًّا من المتجهات الآتية:

أ $٢\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}$ ب $\frac{١}{٢}\overrightarrow{ب} - \overrightarrow{جـ}$ ج $٣\overrightarrow{أ} - ٢\overrightarrow{جـ}$

(١٢) أوجد معيار كل من المتجهات الآتية:

أ $\overrightarrow{أ}$ = (٢، -١، ٠) ب $\overrightarrow{ب}$ = (١، ٢، -٢) ج $\overrightarrow{جـ} = \overrightarrow{ع}$ د $\overrightarrow{ى} = \overrightarrow{س} - ٤\overrightarrow{ص}$

(١٣) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (ك، ٠، ٠) ، $\overrightarrow{س}$ = (١، ٠، ٠) أثبت أن $||\overrightarrow{أ}|| = |ك| \, ||\overrightarrow{س}||$



(١٤) إذا كانت قوة الشد فى الخيط تساوى ٢١ نيوتن أوجد المركبات الجبرية للقوة $\overrightarrow{ق}$ فى اتجاهات محاور الاحداثيات.

(١٥) **سؤال مفتوح:** إذا كان المتجه $\overrightarrow{أ}$ يوازى المستوى الإحداثى ص ع . ماذا يمكن أن تقول عن إحداثيات المتجه $\overrightarrow{أ}$

(١٦) **سؤال مفتوح:** إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين فى $ح^{٣}$. هل $||\overrightarrow{أ} + \overrightarrow{ب}|| = ||\overrightarrow{أ}|| + ||\overrightarrow{ب}||$ إذا كان الطرفان غير متساويين. أىُّ الطرفين هو الأكبر؟

(١٧) **تفكير إبداع:** أوجد الصورة الإحداثية للمتجه $\overrightarrow{أ}$ الذى معياره ٥ وحدات، ويصنع مع محاور الإحداثيات زوايا اتجاه متساوية فى القياس.

nezakr.nateg4dk.net

٣ - ٣ ضرب المتجهات

Vectors multiplication

تعلمت سابقًا إجراء بعض العمليات على المتجهات، مثل الجمع وضرب المتجه فى عدد حقيقى، ولكنك قد تكون قد تساءلت: هل يمكن إجراء عملية الضرب فى حقل المتجهات؟ والجواب: نعم. هناك نوعان من ضرب المتجهات، هما الضرب القياسى لمتجهين والضرب الاتجاهى لمتجهين. وفى هذا الدرس نتناول هذين النوعين من الضرب بالشرح والتحليل، وخواصهما الجبرية والهندسية، وتطبيقاتهما الفيزيائية؛ ليكون ذلك معينًا لك فى دراسة الميكانيكا.

سوف تتعلم

- الضرب القياسى لمتجهين فى المستوى وفى الفراغ.
- توازى وتعامد متجهين.
- الزاوية بين متجهين.
- مركبة متجه فى اتجاه متجه آخر .
- مسقط متجه فى اتجاه متجه آخر.
- الضرب الاتجاهى لمتجهين فى المستوى وفى الفراغ.
- المعنى الهندسى لحاصل الضرب الاتجاهى.
- المجموعة اليمينية من متجهات الوحدة.
- حاصل الضرب الثلاثى القياسى.
- المعنى الهندسى لحاصل الضرب الثلاثى القياسى.


مصطلحات أساسية

ضرب قياسى	scalar product
ضرب اتجاهى	vectar product
مركبة	component
متجه الوحدة	unit vector
الشغل	work
قاعدة اليد اليمنى	right hand rule
الضرب الثلاثى القياسى	scalar triple product

الضرب القياسى لمتجهين *Scalar product of two vectors (Dot product)*

فكر و ناقش


إذا كان $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$ متجهين، قياس الزاوية بينهما θ فأوجد:



١- المركبة الجبرية للمتجه $\vec{أ}$ فى اتجاه المتجه $\vec{ب}$.

٢- حاصل ضرب معيار المتجه $\vec{ب}$ ومركبة المتجه $\vec{أ}$ فى اتجاه المتجه $\vec{ب}$.

من بند **فكر وناقش** نستنتج أن:




١- المركبة الجبرية للمتجه $\vec{أ}$ فى اتجاه المتجه $\vec{ب}$ تساوى $||\vec{أ}||$ جتا θ

٢- حاصل ضرب معيار المتجه $\vec{ب}$ والمركبة الجبرية للمتجه $\vec{أ}$ فى اتجاه المتجه $\vec{ب}$ يساوى $||\vec{ب}|| \, ||\vec{أ}||$ جتا θ

والقيمة المطلقة لهذا المقدار تعبر عن مساحة المستطيل الذى بعداه معيار المتجه $\vec{ب}$ ومعيار مركبة المتجه $\vec{أ}$ فى اتجاه المتجه $\vec{ب}$.

تعلم

الضرب القياسى لمتجهين *Scalar product of two vectors*



إذا كان $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$ متجهين، قياس الزاوية بينهما θ فإن مساحة المستطيل الذى بعداه معيار أحد المتجهين ومركبة المتجه الآخر عليه تعرف بالضرب القياسى للمتجهين ويرمز لهما بالرمزين $\vec{أ} \cdot \vec{ب}$

nezakr.natega4dk.net

أى إن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = ||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جتا\theta$

مثال

(١) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين، قياس الزاوية ٦٠° وكان $||\overrightarrow{أ}|| = ٢$ ، $||\overrightarrow{ب}|| = ٨$ أوجد $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}$

الحل

$||\overrightarrow{أ}|| = ٢ \quad ||\overrightarrow{ب}|| = ٨ \longleftarrow \quad ||\overrightarrow{أ}|| = ٨ ، ||\overrightarrow{ب}|| = ٤$

من تعريف الضرب القياسى

$\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = ||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جتا\theta$

$= ٨ \times ٤ \times جتا ٦٠° = ١٦$

حاول أن تحل


(١) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين، قياس الزاوية بينهما ١٣٥° وكان $||\overrightarrow{أ}|| = ٦$ ، $||\overrightarrow{ب}|| = ١٠$ أوجد $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}$


تفكير ناقد: ما الحالات التى يكون فيها حاصل الضرب القياسى يساوى الصفر؟

ملحوظات مهمة

١- لتحديد الزاوية بين المتجهين يجب أن يكون المتجهان خارجين (أو داخلين) لنفس النقطة.

٢- قياس الزاوية بين المتجهين $\in [٠ ، \pi]$





مثال

(٢) إذا كانت $\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع}$ متجهات الوحدة لمجموعة يمينية، فأوجد كل من $\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{ع}$

الحل

$\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{س} = ||\overrightarrow{س}|| \, ||\overrightarrow{س}|| \, جتا ٠°$

$= ١ \times ١ \times ١ = ١$

بالمثل $\overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ص} = ١$ ، $\overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{ع} = ١$

تذكر أن

معيار متجه الوحدة يساوى الواحد الصحيح.

حاول أن تحل

(٢) إذا كانت $\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع}$ مجموعة يمينية من متجهات الوحدة، فأوجد كل من $\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{س}$

nezakr.natega4dk.net

خواص الضرب القياسى

من الأمثلة السابقة يمكننا استنتاج خواص الضرب القياسى كما يلى:

١- $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{ب} \cdot \overrightarrow{أ}$ خاصية الإبدال

٢- $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{أ} = ||\overrightarrow{أ}||^{٢}$

٣- $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = ٠$ إذا وفقط إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متعامدين (شرط تعامد متجهين)


٤- $\overrightarrow{أ} \cdot (\overrightarrow{ب} + \overrightarrow{جـ}) = \overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} + \overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{جـ}$ خاصية التوزيع

٥- $(ك \overrightarrow{أ}) \cdot \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{أ} \cdot (ك \overrightarrow{ب}) = ك(\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب})$ حيث ك عددًا حقيقيًا

مثال

(٣) أ ب جـ ء مربع طول ضلعه ١٠سم . أوجد كلًّا من

(أ) $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{ءجـ}$ (ب) $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{بجـ}$ (جـ) $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{جـأ}$



الحل

(أ) ∵ $\overrightarrow{أب}$ ، $\overrightarrow{ءجـ}$ متوازيان وفى نفس الاتجاه


∴ قياس الزاوية بينهما = صفر°

∴ $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{ءجـ} = ||\overrightarrow{أب}|| \, ||\overrightarrow{ءجـ}|| \, جتا ٠°$

$= ١٠ \times ١٠ \times ١ = ١٠٠$

(ب) $\overrightarrow{أب}$ ، $\overrightarrow{بجـ}$ متعامدان قياس الزاوية بينهما ٩٠°

∴ $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{بجـ}$ = صفر



(جـ) ∵ $\overrightarrow{أب}$ ، $\overrightarrow{جـأ}$ لا يبدآن من نفس النقطة

∴ نمد $\overrightarrow{جـأ}$ على امتداده فتصبح قياس الزاوية بينهما ١٣٥°

$\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{جـأ} = ||\overrightarrow{أب}|| \, ||\overrightarrow{جـأ}|| \, جتا ١٣٥$

$= ١٠ \times ١٠ \times \frac{-١}{\sqrt{٢}} \times \sqrt{٢} = -١٠٠$

حل آخر الفقرة (جـ)

$\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{جـأ} = \overrightarrow{أب} \cdot (-\overrightarrow{أجـ})$

$= -\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{أجـ}$

$= -||\overrightarrow{أب}|| \, ||\overrightarrow{جـأ}|| \, جتا ٤٥$

$= -١٠ \times ١٠ \times \frac{١}{\sqrt{٢}} \times \sqrt{٢} = -١٠٠$

nezakr.natega4dk.net

حاول أن تحل

(٣) أ ب جـ مثلث متساوى الأضلاع طول ضلعه ٨ سم. أوجد كلًا من:

أ $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{أجـ}$ ب $\overrightarrow{أب} \cdot \overrightarrow{بجـ}$ جـ $(٢\overrightarrow{أب}) \cdot (٣\overrightarrow{جـب})$

تعلم

الضرب القياسى لمتجهين فى النظام الإحداثى المتعامد

The scalar product of two vectors in orthogonal coordinate system

إذا كان $\overrightarrow{أ} = أ_س \overrightarrow{س} + أ_ص \overrightarrow{ص} + أ_ع \overrightarrow{ع}$، $ب = (ب_س \overrightarrow{س} + ب_ص \overrightarrow{ص} + ب_ع \overrightarrow{ع})$ فإن

$\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = (أ_س \overrightarrow{س} + أ_ص \overrightarrow{ص} + أ_ع \overrightarrow{ع}) \cdot (ب_س \overrightarrow{س} + ب_ص \overrightarrow{ص} + ب_ع \overrightarrow{ع})$ باستخدام خاصية التوزيع

$= أ_س ب_س \overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{س} + أ_س ب_ص \overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{ص} + أ_س ب_ع \overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{ع}$

$+ أ_ص ب_س \overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{س} + أ_ص ب_ص \overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ص} + أ_ص ب_ع \overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ع}$

$+ أ_ع ب_س \overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{س} + أ_ع ب_ص \overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{ص} + أ_ع ب_ع \overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{ع}$

وحيث إن $\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{س} = \overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ص} = \overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{ع} = ١$

$\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{ص} = \overrightarrow{ص} \cdot \overrightarrow{ع} = \overrightarrow{ع} \cdot \overrightarrow{س} =$ صفر

$\therefore \overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = أ_س ب_س + أ_ص ب_ص + أ_ع ب_ع$

ملاحظة

إذا كان $\overrightarrow{أ} = (أ_س ، أ_ص)$، $\overrightarrow{ب} = (ب_س ، ب_ص)$ فى المستوى الإحداثى

فإن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = أ_س ب_س + أ_ص ب_ص$

مثال

(٤) إذا كان $\overrightarrow{أ} = ٢\overrightarrow{س} + ٣\overrightarrow{ص} + ٤\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب} = -\overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}$ أوجد $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}$

الحل

$\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = (٢، ٣، ٤) \cdot (-١، -٢، ١)$

$= ٢ \times -١ + ٣ \times (-٢) + ٤ \times ١$

$= -٢ - ٦ + ٤ = -٤$

حاول أن تحل

(٤) أوجد $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}$ فى كل من الحالات الآتية:

أ $\overrightarrow{أ} = (-١، ٣، ٢)$، $\overrightarrow{ب} = ٤\overrightarrow{س} - ٢\overrightarrow{ص} + ٥\overrightarrow{ع}$ ماذا نستنتج؟


ب $\overrightarrow{أ} = ٢\overrightarrow{س} - \overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ب} = \overrightarrow{ص} - ٣\overrightarrow{س}$

nezakr.nategа4dk.net

تعلم

الزاوية بين متجهين

the angle between two vectors



تعلم أن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = ||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جتا \theta$

حيث θ قياس الزاوية بين المتجهين غير الصفريين $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ، $0° \leq \theta \leq 180°$

$$\therefore جتا \theta = \frac{\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}}{||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}||}$$

حالات خاصة:

١- إذا كان جتا $\theta = 1$ فإن $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متوازيان، وفى نفس الاتجاه.

٢- إذا كان جتا $\theta = -1$ فإن $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متوازيان، وفى عكس الاتجاه.

٣- إذا كان جتا $\theta = 0$ فإن $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متعامدان.

مثال

٥ أوجد قياس الزاوية بين المتجهين $\overrightarrow{أ} = 4\overrightarrow{س} + 3\overrightarrow{ص} + 7\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب} = 2\overrightarrow{س} + 5\overrightarrow{ص} + 4\overrightarrow{ع}$.

الحل

$$||\overrightarrow{أ}|| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 7^2} = \sqrt{74}$$

$$||\overrightarrow{ب}|| = \sqrt{2^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{45}$$


$$جتا \theta = \frac{\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}}{||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}||}$$


$$= \frac{(4، 3، 7) \cdot (2، 5، 4)}{\sqrt{45} \sqrt{74}} = \frac{8 + 15 + 28}{\sqrt{45} \sqrt{74}} = \frac{51}{\sqrt{45} \sqrt{74}}$$

$$\therefore جتا^{-1} \left(\frac{51}{\sqrt{45} \sqrt{74}}\right) = جتا^{-1} (0,8838) = 27,9°$$

حاول أن تحل

٥ أوجد θ فى كل مما يأتى:






nezakr.natega4dk.net

تعلم

مركبة متجه فى اتجاه متجه آخر.



إذا كان $\overrightarrow{آ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين، فإن مركبة المتجه $\overrightarrow{آ}$ فى اتجاه $\overrightarrow{ب}$ (ويرمز لها أ ب) هى

$$أ ب = ||\overrightarrow{آ}|| \text{ جتا } \theta = \frac{\overrightarrow{آ} \cdot \overrightarrow{ب}}{||\overrightarrow{ب}||}$$

ملحوظة: المركبة الاتجاهية للمتجه $\overrightarrow{آ}$ فى اتجاه $\overrightarrow{ب}$ يرمز لها بالرمز $\overrightarrow{أ ب}$ حيث $\overrightarrow{أ ب} = أ ب \frac{\overrightarrow{ب}}{||\overrightarrow{ب}||}$

مثال

٦ أوجد مركبة القوة $\overrightarrow{ق} = ٢\overrightarrow{س} - ٣\overrightarrow{ص} + ٥\overrightarrow{ع}$ فى اتجاه $\overrightarrow{أ ب}$ حيث أ(١، ٤، ٠)، ب(-١، ٢، ٣)

الحل

$$\overrightarrow{أ ب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{آ}$$


$$= (-١، ٢، ٣) - (١، ٤، ٠) = (-٢، -٢، ٣)$$

مركبة القوة $\overrightarrow{ق}$ فى اتجاه $\overrightarrow{أ ب}$ $= \frac{\overrightarrow{ق} \cdot \overrightarrow{أ ب}}{||\overrightarrow{أ ب}||}$

$$= \frac{(٢، -٣، ٥) \cdot (-٢، -٢، ٣)}{\sqrt{(-٢)^٢ + (-٢)^٢ + ٣^٢}} = \frac{١٧}{\sqrt{١٧}} = \sqrt{١٧}$$

حاول أن تحل

٦ الشكل المقابل يمثل مكعبًا طول ضلعه ٢ وحدة طول أوجد مركبة المتجه $\overrightarrow{و آ}$ على المتجه $\overrightarrow{جـ ب}$




تفكير ناقد: متى تنعدم مركبة متجه فى اتجاه متجه آخر؟

nezakr.natega4dk.net

تعلم

الضرب الاتجاهى لمتجهين

Vector product of two vectors (cross product)




إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين فى مستوى، يحصران بينهما زاوية قياسها θ وكان $\overrightarrow{ى}$ متجه وحدة عموديًّا على المستوى الذى يحوى $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ فإن حاصل الضرب الاتجاهى للمتجهين $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ يُعطى بالعلاقة

$$\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = (||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جا\theta) \, \overrightarrow{ى}$$


ويتحدد اتجاه متجه الوحدة $\overrightarrow{ى}$ (لأعلى أم أسفل) طبقًا لقاعدة اليد اليمنى، حيث تشير الأصابع المنحنية لليد اليمنى إلى اتجاه الدوران من المتجه $\overrightarrow{أ}$ إلى المتجه $\overrightarrow{ب}$ فيشير الإبهام إلى اتجاه المتجه $\overrightarrow{ى}$

ملحوظات هامة



١- إذا كان $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}$ فى اتجاه المتجه $\overrightarrow{ى}$ فإن $\overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{أ}$ تكون فى اتجاه المتجه $-\overrightarrow{ى}$ أى أن $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = -\overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{أ}$

٢- بتطبيق قاعدة اليد اليمنى على مجموعة يمينية من متجهات الوحدة المتعامدة فإن




$\overrightarrow{س} \times \overrightarrow{ص} = \overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ص} \times \overrightarrow{ع} = \overrightarrow{س}$

$\overrightarrow{ع} \times \overrightarrow{س} = \overrightarrow{ص}$

$\overrightarrow{س} \times \overrightarrow{ع} = -\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع} \times \overrightarrow{ص} = -\overrightarrow{س}$

$\overrightarrow{ص} \times \overrightarrow{س} = -\overrightarrow{ع}$



٣- لأى متجه $\overrightarrow{أ}$ يكون $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{أ} = \overrightarrow{و}$ حيث $\overrightarrow{و}$ المتجه الصفرى

مثال

(٧) $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهان فى مستوى، قياس الزاوية بينهما ٧٠° فإذا كان $||\overrightarrow{أ}|| = ١٥$ ، $||\overrightarrow{ب}|| = ١٧,٥$ أوجد معيار $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}$

الحل

$\because \overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = (||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جا\theta) \, \overrightarrow{ى}$

$\therefore ||\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}|| = ||\overrightarrow{أ}|| \, ||\overrightarrow{ب}|| \, جا\theta = ١٥ \times ١٧,٥ \times جا ٧٠ = ٢٤٦,٦٧$

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

حاول أن تحل

(٧) إذا كان $\vec{أ} \times \vec{ب} = -٦٥\ \vec{ى}$ وكان $||\vec{أ}|| = ٥$ ، $||\vec{ب}|| = ٢٦$ أوجد قياس الزاوية بين المتجهين $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$

الضرب الاتجاهى فى الإحداثيات الكارتيزية

إذا كان $\vec{أ} = (أ_س ، أ_ص ، أ_ع)$ ، $\vec{ب} = (ب_س ، ب_ص ، ب_ع)$ متجهين فإن

$$\vec{أ} \times \vec{ب} = (أ_س \vec{س} + أ_ص \vec{ص} + أ_ع \vec{ع}) \times (ب_س \vec{س} + ب_ص \vec{ص} + ب_ع \vec{ع})$$

$$= أ_س ب_س \vec{س} \times \vec{س} + أ_س ب_ص \vec{س} \times \vec{ص} + أ_س ب_ع \vec{س} \times \vec{ع}$$

$$+ أ_ص ب_س \vec{ص} \times \vec{س} + أ_ص ب_ص \vec{ص} \times \vec{ص} + أ_ص ب_ع \vec{ص} \times \vec{ع}$$

$$+ أ_ع ب_س \vec{ع} \times \vec{س} + أ_ع ب_ص \vec{ع} \times \vec{ص} + أ_ع ب_ع \vec{ع} \times \vec{ع}$$

وحيث إن $\vec{س} \times \vec{س} = \vec{ص} \times \vec{ص} = \vec{ع} \times \vec{ع} = \vec{و}$

$\vec{س} \times \vec{ص} = \vec{ع}$ ، $\vec{ص} \times \vec{ع} = \vec{س}$ ، $\vec{ع} \times \vec{س} = \vec{ص}$ فإن

$$\vec{أ} \times \vec{ب} = ٠ + أ_س ب_ص \vec{ع} + أ_س ب_ع (-\vec{ص})$$

$$+ أ_ص ب_س (-\vec{ع}) + ٠ + أ_ص ب_ع (\vec{س})$$

$$+ أ_ع ب_س (\vec{ص}) + أ_ع ب_ص (-\vec{س}) + ٠$$

$$= (أ_ص ب_ع - أ_ع ب_ص) \vec{س} + (أ_ع ب_س - أ_س ب_ع) \vec{ص} + (أ_س ب_ص - أ_ص ب_س) \vec{ع}$$

والصورة الأخيرة يمكن كتابتها على شكل محدد على النظم ٣ × ٣ كالآتى:

$$\vec{أ} \times \vec{ب} = \begin{vmatrix} \vec{س} & \vec{ص} & \vec{ع} \\ أ_س & أ_ص & أ_ع \\ ب_س & ب_ص & ب_ع \end{vmatrix}$$

حالة خاصة

إذا كان $\vec{أ} = (أ_س ، أ_ص)$، $\vec{ب} = (ب_س ، ب_ص)$ فى المستوى الإحداثى س ص فإن

$$\vec{أ} \times \vec{ب} = \begin{vmatrix} \vec{س} & \vec{ص} & \vec{ع} \\ أ_س & أ_ص & ٠ \\ ب_س & ب_ص & ٠ \end{vmatrix} = (أ_س ب_ص - أ_ص ب_س) \vec{ع}$$

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٨) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-٢، ٣، ١)، $\overrightarrow{ب}$ = (١، ٢، ٤) أوجد $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}$ ثم استنتج متجه الوحدة العمودى على المستوى الذى يحوى المتجهين $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$

الحل

$$\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{س} & \overrightarrow{ص} & \overrightarrow{ع} \\ -٢ & ٣ & ١ \\ ١ & ٢ & ٤ \end{vmatrix}$$

$$= (٣ \times ٤ - ٢ \times ١)\overrightarrow{س} - (-٢ \times ٤ - ١ \times ١)\overrightarrow{ص} + (-٢ \times ٢ - ٣ \times ١)\overrightarrow{ع}$$

$$= ١٠\overrightarrow{س} + ٩\overrightarrow{ص} - ٧\overrightarrow{ع}$$

متجه الوحدة العمودى على مستوى $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ = $\dfrac{\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}}{\|\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}\|}$

$$\therefore \overrightarrow{ى} = \frac{١٠\overrightarrow{س} + ٩\overrightarrow{ص} - ٧\overrightarrow{ع}}{\sqrt{١٠^٢ + ٩^٢ + (-٧)^٢}} = \frac{١٠}{\sqrt{٢٣٠}}\overrightarrow{س} + \frac{٩}{\sqrt{٢٣٠}}\overrightarrow{ص} - \frac{٧}{\sqrt{٢٣٠}}\overrightarrow{ع}$$

حاول أن تحل

(٨) إذا كان $\|\overrightarrow{أ}\|$ = ٦ وكانت جيوب تمام زوايا الاتجاه للمتجه $\overrightarrow{أ}$ هى على الترتيب $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{-٢}{٣}$ ، $\frac{١}{٣}$ وكان المتجه $\overrightarrow{ب}$ = (-٢، ٣، ٥) أوجد $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}$

خواص حاصل الضرب الاتجاهى لمتجهين

إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين، قياس الزاوية بينهما θ فإن:

١- $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = -\overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{أ}$ (الضرب الاتجاهى عملية غير إبدالية)

٢- $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{أ} = \overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{و}$

٣- إذا كان $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{و}$ فإما $\overrightarrow{أ} // \overrightarrow{ب}$ أو أحد المتجهين أو كلاهما يساوى $\overrightarrow{و}$

٤- $\overrightarrow{أ} \times (\overrightarrow{ب} + \overrightarrow{جـ}) = (\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}) + (\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{جـ})$ خاصية التوزيع

٥- $(ك\overrightarrow{أ}) \times \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{أ} \times (ك\overrightarrow{ب}) = ك(\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب})$ حيث ك عدد حقيقى

توازى متجهين

رأينا فى خواص الضرب الاتجاهى أن المتجهين $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ يكونان متوازيين إذا وفقط إذا كان: $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{و}$

أى $(أ_ص ب_ع - أ_ع ب_ص)\overrightarrow{س} + (أ_ع ب_س - أ_س ب_ع)\overrightarrow{ص} + (أ_س ب_ص - أ_ص ب_س)\overrightarrow{ع} = \overrightarrow{و}$

nezakr.natega4dk.net

أى $\text{ا}_{\text{ص}}\text{ب ع} = \text{ا ع ب}_{\text{ص}}$ ، $\text{ا}_{\text{س}}\text{ب ع} = \text{ا ع ب}_{\text{س}}$ ، $\text{ا}_{\text{س}}\text{ب}_{\text{ص}} = \text{ا}_{\text{ص}}\text{ب}_{\text{س}}$

أى $\frac{\text{ا}_{\text{ص}}}{\text{ب}_{\text{ص}}} = \frac{\text{ا ع}}{\text{ب ع}}$ ، $\frac{\text{ا}_{\text{س}}}{\text{ب}_{\text{س}}} = \frac{\text{ا ع}}{\text{ب ع}}$ ، $\frac{\text{ا}_{\text{ص}}}{\text{ب}_{\text{ص}}} = \frac{\text{ا}_{\text{س}}}{\text{ب}_{\text{س}}}$

أى $\frac{\text{ا}_{\text{س}}}{\text{ب}_{\text{س}}} = \frac{\text{ا}_{\text{ص}}}{\text{ب}_{\text{ص}}} = \frac{\text{ا ع}}{\text{ب ع}}$

وبفرض أى من النسب = ك يكون

$\text{ا}_{\text{س}} = \text{ك ب}_{\text{س}}$ ، $\text{ا}_{\text{ص}} = \text{ك ب}_{\text{ص}}$ ، $\text{ا ع} = \text{ك ب ع}$

$\therefore \overrightarrow{\text{ا}} = \text{ا}_{\text{س}}\overrightarrow{\text{س}} + \text{ا}_{\text{ص}}\overrightarrow{\text{ص}} + \text{ا ع}\overrightarrow{\text{ع}}$

$\therefore \overrightarrow{\text{ا}} = \text{ك}\overrightarrow{\text{ب}}$

عندما تكون ك > ٠ يكون المتجهان متوازيين وفى نفس الاتجاه، وعندما تكون ك < ٠ يكون المتجهان متوازيين وفى عكس الاتجاه.

مثال

(٩) إذا كان المتجه $\overrightarrow{\text{ا}} = (٢\overrightarrow{\text{س}} - ٣\overrightarrow{\text{ص}} + \text{م}\overrightarrow{\text{ع}})$ يوازى المتجه $\overrightarrow{\text{ب}} = (\overrightarrow{\text{س}} + \text{ك}\overrightarrow{\text{ص}} + ٨\overrightarrow{\text{ع}})$

أوجد قيمة كل من م، ك


الحل

$\therefore \overrightarrow{\text{ا}} // \overrightarrow{\text{ب}}$ $\therefore \frac{\text{ا}_{\text{س}}}{\text{ب}_{\text{س}}} = \frac{\text{ا}_{\text{ص}}}{\text{ب}_{\text{ص}}} = \frac{\text{ا ع}}{\text{ب ع}}$

$\therefore \frac{٢}{١} = \frac{-٣}{\text{ك}} = \frac{\text{م}}{٨}$ $\therefore \text{ك} = \frac{-٣ \times ١}{٢} = \frac{-٣}{٢}$ ، $\text{م} = \frac{٨ \times ٢}{١} = ١٦$

حاول أن تحل

(٩) إذا كان $\overrightarrow{\text{ا}} = (٢، -٣)$ وكان $\overrightarrow{\text{ب}} // \overrightarrow{\text{ا}}$ فإذا كان $||\overrightarrow{\text{ب}}|| = ٣\sqrt{١٣}$ أوجد $\overrightarrow{\text{ب}}$.



المعنى الهندسى للضرب الاتجاهى لمتجهين

نعلم أن $||\overrightarrow{\text{ا}} \times \overrightarrow{\text{ب}}|| = ||\overrightarrow{\text{ا}}|| \, ||\overrightarrow{\text{ب}}|| \, \text{جا}\,\theta$

$= ||\overrightarrow{\text{ب}}|| \times \text{ل}$ حيث $\text{ل} = ||\overrightarrow{\text{ا}}|| \, \text{جا}\,\theta$

= مساحة متوازى الأضلاع الذى فيه $\overrightarrow{\text{ب}}$ ، $\overrightarrow{\text{ا}}$ ضلعان متجاوران فيه

= ضعف مساحة المثلث الذى فيه $\overrightarrow{\text{ب}}$ ، $\overrightarrow{\text{ا}}$ ضلعان متجاوران فيه

nezakr.natega4dk.net

مثال

(١٠) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (-٣ ، ١ ، ٢) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٣ ، ٤ ، -١) أوجد مساحة متوازى الأضلاع الذى فيه $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ضلعان متجاوران فيه.

الحل

$\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}$ = (-٣ ، ١ ، ٢) × (٣ ، ٤ ، -١)

$$= \begin{vmatrix} \overrightarrow{س} & \overrightarrow{ص} & \overrightarrow{ع} \\ -٣ & ١ & ٢ \\ ٣ & ٤ & -١ \end{vmatrix} = (-٩)\overrightarrow{س} + ٣\overrightarrow{ص} - ١٥\overrightarrow{ع}$$

$$||\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب}|| = \sqrt{(-٩)^٢ + (٣)^٢ + (-١٥)^٢} = ٣\sqrt{٣٥}$$

∴ مساحة متوازى الضلاع = $٣\sqrt{٣٥}$ وحدة مساحة.

حاول أن تحل

(١٠) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ = (١ ، ٢ ، -٤) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٠ ، ٥ ، -١) أوجد مساحة المثلث الذى فيه $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ضلعان.

تعلم

الضرب الثلاثى القياسى

Scalar triple product

إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ، $\overrightarrow{جـ}$ متجهات فإن المقدار $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{جـ}$ يعرف بحاصل الضرب الثلاثى القياسى. الذى له كثير من التمثيلات فى مجال الاستاتيكا (لاحظ عدم وجود أقواس حيث لا معنى لإجراء الضرب القياسى أولًا)

وبفرض $\overrightarrow{أ}$ = (أس ، أص ، أع)، $\overrightarrow{ب}$ = (ب س ، ب ص ، ب ع) ، $\overrightarrow{جـ}$ = (جـ س ، جـ ص ، جـ ع)

فإن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} \times \overrightarrow{جـ}$

$$= (أس\overrightarrow{س} + أص\overrightarrow{ص} + أع\overrightarrow{ع}) \cdot \begin{vmatrix} \overrightarrow{س} & \overrightarrow{ص} & \overrightarrow{ع} \\ ب س & ب ص & ب ع \\ جـ س & جـ ص & جـ ع \end{vmatrix}$$

$$= (أس\overrightarrow{س} + أص\overrightarrow{ص} + أع\overrightarrow{ع}) \cdot [(ب ص\ جـ ع - ب ع\ جـ ص)\overrightarrow{س} - (ب س\ جـ ع - ب ع\ جـ س)\overrightarrow{ص}$$
$$+ (ب س\ جـ ص - ب ص\ جـ س)\overrightarrow{ع}]$$

$$أس(ب ص\ جـ ع - ب ع\ جـ ص) - أص(ب س\ جـ ع - ب ع\ جـ س) + أع(ب س\ جـ ص - ب ص\ جـ س)$$

$$= \begin{vmatrix} أس & أص & أع \\ ب س & ب ص & ب ع \\ جـ س & جـ ص & جـ ع \end{vmatrix}$$

nezakr.natega4dk.net

خواص الضرب الثلاثى القياسى


١- الضرب الثلاثى القياسى قيمته لا تتغير إذا كانت ترتيب المتجهات فى ترتيب دورى واحد.

$\vec{أ} \cdot (\vec{ب} \times \vec{جـ}) = \vec{ب} \cdot (\vec{جـ} \times \vec{أ}) = \vec{جـ} \cdot (\vec{أ} \times \vec{ب})$ لاحظ الترتيب الدورى $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$ ، $\vec{جـ}$

٢- إذا كانت المتجهات $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$ ، $\vec{جـ}$ فى مستوى واحد فإن حاصل الضرب الثلاثى القياسى ينعدم

أى إن $\vec{أ} \cdot (\vec{ب} \times \vec{جـ}) =$ صفر

المعنى الهندسى لحاصل الضرب الثلاثى القياسى



إذا كان $\vec{أ}$ ، $\vec{ب}$ ، $\vec{جـ}$ ثلاثة متجهات، تكون ثلاثة أحرف غير متوازية فى متوازى سطوح، فإن حجم متوازى السطوح = القيمة المطلقة لحاصل الضرب الثلاثى القياسى.

أى إن حجم متوازى السطوح $= |\vec{أ} \cdot \vec{ب} \times \vec{جـ}|$

مثال

(١١) أوجد حجم متوازى السطوح الذى فيه ثلاثة أحرف متجاورة يمثلها المتجهات $\vec{أ} = (٢، ١، ٣)$، $\vec{ب} = (-١، ٣، ٢)$، $\vec{جـ} = (١، ١، -٢)$

الحل

حجم متوازى السطوح $= |\vec{أ} \cdot \vec{ب} \times \vec{جـ}|$ (١)

$\therefore \vec{أ} \cdot \vec{ب} \times \vec{جـ} = \begin{vmatrix} أ_س & أ_ص & أ_ع \\ ب_س & ب_ص & ب_ع \\ جـ_س & جـ_ص & جـ_ع \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} ٢ & ١ & ٣ \\ -١ & ٣ & ٢ \\ -٢ & ١ & ١ \end{vmatrix} = -٢٨$

أى أن حجم متوازى السطوح $= |-٢٨| = ٢٨$ وحدة حجم

حاول أن تحل

(١١) أوجد حجم متوازى السطوح الذى فيه ثلاثة أحرف غير متوازية، يمثلها المتجهات $\vec{أ} = (٣، -٤، ١)$، $\vec{ب} = (٠، ٢، -٣)$، $\vec{جـ} = (٣، ٢، ٢)$

nezakr.natega4dk.net

تمـــاريـن (٣-٣)

أكمل ما يأتى: إذا كانت $\overrightarrow{س}$ ، $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{ع}$ مجموعة يمينية من متجهات الوحدة:

(١) $\overrightarrow{س} \cdot \overrightarrow{ص} =$ .....

(٢) $\overrightarrow{ص} \times \overrightarrow{ع} =$ .....

(٣) إذا كان $\overrightarrow{أ} = (٢ ، -١)$ ، $\overrightarrow{ب} = (٣ ، -٤)$ فإن مركبة $\overrightarrow{أ}$ فى اتجاه $\overrightarrow{ب}$ تساوى .....

(٤) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهان غير صفريان وكان $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} = ٠$ فإن $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ يكونان .....

(٥) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهان غير صفريان وكان $\overrightarrow{أ} \times \overrightarrow{ب} = \overrightarrow{و}$ فإن $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ يكونان .....

(٦) قياس الزاوية بين المتجهين $٣\overrightarrow{س} - \overrightarrow{ص}$ ، $-٤\overrightarrow{س} + ٦\overrightarrow{ص}$ يساوى .....

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(٧) $\overrightarrow{س} \times \overrightarrow{ص} =$ .....

أ) $\overrightarrow{و}$ ب) ٠

جـ) ١ د) $\overrightarrow{ع}$

(٨) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهى وحدة متعامدين فإن $(\overrightarrow{أ} - ٢\overrightarrow{ب}) \cdot (٣\overrightarrow{أ} + ٥\overrightarrow{ب}) =$

أ) -٨ ب) -٧

جـ) ٢٤ د) ٠

(٩) إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهى وحدة فإن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب} \in$ .....

أ)]٠، ١[ب)]-١، ١[

جـ) [-١، ١] د) $ح^+$

(١٠) قياس الزاوية بين المتجهين (٢ ، -٢، ٢) ، (١، ١، ٤) يساوى .....

أ) $٥٧,٠٢^\circ$ ب) $٣٥,٢٦^\circ$

جـ) $١٣٤,٣٧^\circ$ د) ٠°

(١١) إذا كان المتجهان (٢ ،ك، -٣) ، (٤ ، ٦، -٦) متوازيين فإن ك = ...

أ) ٦ ب) ٣

جـ) -٣ د) ١

nezakr.natega4dk.net

أجب عما يأتى:

(١٢) أوجد $\vec{أ} \cdot \vec{ب}$ فى كل من الحالات الآتية:

(أ) $\vec{أ} = (٥، ١، -٢)$ ، $\vec{ب} = (٤، -٤، ٣)$

(ب) $\vec{أ} = -٣\vec{س} - ٢\vec{ص} - \vec{ع}$ ، $\vec{ب} = ٦\vec{س} + ٤\vec{ص} + ٢\vec{ع}$

(جـ) $\vec{أ} = \vec{س}$ ، $\vec{ب} = ٢\vec{ص} - \vec{ع}$

(١٣) أوجد قياس الزاوية بين المتجهين فى كل من الحالات الآتية:

(أ) (٥، ١، -٢) ، (١، ١، -١)

(ب) (٧، ٢، -١٠) ، (٢، ٦، ٤)

(جـ) (٢، ١، ٤) ، (١، -٢، ٠)

(١٤) أوجد $\vec{أ} \times \vec{ب}$ فى كل من الحالات الآتية:

(أ) $\vec{أ} = (-٢، ٣، ١)$ ، $\vec{ب} = (١، ٣، -٤)$

(ب) $\vec{أ} = -\vec{س} - ٢\vec{ص}$ ، $\vec{ب} = ٣\vec{ص} - ٥\vec{ع}$

(جـ) $||\vec{أ}|| = ٦$ ، $||\vec{ب}|| = ٨$ وقياس الزاوية بينهما ٦٠°

(١٥) أ ب جـ ء مربع طول ضلعه ١٢سم. $\vec{ى}$ متجه وحدة عمودى على مستواه. أوجد:

(أ) $\vec{أب} \cdot \vec{أجـ}$

(ب) $\vec{أب} \times \vec{جـأ}$

(جـ) $\vec{بجـ} \cdot \vec{أء}$

(د) $\vec{بء} \times \vec{أجـ}$

(هـ) $\vec{أب} \cdot \vec{بجـ}$

(و) $\vec{أب} \times \vec{بجـ}$

(١٦) أوجد متجه وحدة عموديًا على المستوى الذى يحوى المتجهين.
$\vec{أ} = ٢\vec{س} - ٣\vec{ص} + \vec{ع}$ ، $\vec{ب} = -\vec{س} + ٢\vec{ص} - ٣\vec{ع}$

(١٧) احسب مساحة المثلث ء هـ و فى كل مما يأتى:

(أ) ء(٥، ١، -٢) ، هـ (٤، -٤، ٣) ، و (٢، ٤، ٠)

(ب) ء (٤، ٠، ٢) ، هـ (٢، ١، ٥) ، و (-١، ٠، -١)

nezakr.natega4dk.net

(١٨) احسب مساحة متوازى الأضلاع ل م ن هـ فى كل مما يأتى:

(أ) ل (١ ، ١) ، م (٢ ، ٣) ، ن(٥ ، ٤)

(ب) ل (٢ ، ١ ، ٣) ، م (١ ، ٤ ، ٥) ، ن(٢ ، ٥ ، ٣)

(١٩) أوجد حجم متوازى السطوح الذى فيه $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ ، $\overrightarrow{جـ}$ تمثل ثلاثة أحرف متجاورة فيما يلى:

$\overrightarrow{أ}$ = (١ ، ١ ، ٣) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٢ ، ١ ، ٤) ، $\overrightarrow{جـ}$ = (٥ ، ١ ، -٢)

(٢٠) فى كل مما يأتى بين ما إذا كان المتجهان متوازيين أم متعامدين أم غير ذلك:

(أ) $\overrightarrow{أ}$ = (٠ ، ٢ ، ٢) ، $\overrightarrow{ب}$ = (٣ ، ٠ ، -٤)

(ب) $\overrightarrow{هـ}$ = ١٠ $\overrightarrow{س}$ + ٤٠ $\overrightarrow{ص}$ ، $\overrightarrow{و}$ = -٣ $\overrightarrow{ص}$ + ٨ $\overrightarrow{ع}$

(جـ) $\overrightarrow{أ}$ = -٢ $\overrightarrow{س}$ + $\overrightarrow{ص}$ - ٢ $\overrightarrow{ع}$ ، $\overrightarrow{ب}$ = ٨ $\overrightarrow{س}$ - ٤ $\overrightarrow{ص}$ + ٨ $\overrightarrow{ع}$

nezakr.natega4dk.net

الوحدة الرابعة



الخطوط المستقيمة والمستويات فى الفراغ

Straight Lines and planes in space

مقدمة الوحدة

درست فى الوحدة السابقة تحديد نقطة فى الفراغ، كذلك متجهات الموضع وكيفية إيجاد معيارها وهذه تعتبر من أساسيات هذه الوحدة حيث إنها تعتبر استكمالًا لما درس فى الوحدة السابقة ومكملًا لما درس فى العام السابق.

وفى هذه الوحدة سوف يدرس الطالب معادلة المستقيم فى الفراغ كذلك معادلة المستوى بصورها المختلفة، وقد تنوعت الأمثلة وطرق الحل تحقيقًا للأهداف المعرفية والمهارية التى تساعد الطالب على دراسة المعارف والمفاهيم الأخرى المرتبطة بهندسة الفراغ فى المراحل التعليمية التالية.

أهداف الوحدة

فى نهاية الوحدة وتنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن:

- يوجد متجه اتجاه الخط المستقيم فى الفراغ.
- يوجد المعادلة البارامترية للمستقيم فى الفراغ والمعادلة الاتجاهية للمستقيم فى الفراغ.
- يوجد المعادلة الاحداثية للمستقيم فى الفراغ.
- يوجد المعادلة العامة للمستوى فى الفراغ.
- يوجد المعادلة القياسية للمستوى فى الفراغ.
- يتعرف الزاوية بين مستويين فى الفراغ.
- يستنتج شرط تعامد مستويين فى الفراغ.
- يستنتج شرط توازى مستويين فى الفراغ.
- يوجد معادلة خط تقاطع مستويين فى الفراغ.
- يعين المسافة بين نقطة ومستقيم فى الفراغ.
- يوجد المسافة بين نقطة ومستوى باستخدام حاصل الضرب القياسى وباستخدام الصورة الكارتيزية.
- يعين المسافة بين مستويين متوازيين.

nezakr.natega4dk.net

مصطلحات أساسية

متجه اتجاه	Direction vector	يتناسب	Proportional	مستوى	plane
زوايا اتجاه	Direction angles	مستقيمان متوازيان	Parallel straight Lines	صورة قياسية	Standard form
جيوب تمام الاتجاه	Direction cosines	مستقيمان متعامدان	Perpendicular straight Lines	مستويان متوازيان	Parallel planes
نسب الاتجاه	Direction ratios	مستقيمان متقاطعان	Intersecting straight Lines	مستويان متعامدان	Perpendicular planes
معادلة متجهة	Vector equation	مستقيمان متخالفان	Skew straight Lines	مستويان متقاطعان	Interecting planes
معادلات بارامترية	Parametric equations	بعد عمودى	Perpendicular distance	زاوية	Angle
معادلة احداثية	Cartesian equation				
معادلة عامة	General equation				


الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة بيانية.
- برامج رسومية ثلاثية الأبعاد.

دروس الوحدة

- الدرس (٢ - ١): معادلة المستقيم فى الفراغ.
- الدرس (٢ - ٢): معادلة المستوى فى الفراغ.

مخطط تنظيمى للوحدة



نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

٤ - ١ معادلة المستقيم فى الفراغ

Equation of a straight Line in space

تعلمت فى السنوات السابقة الخط المستقيم فى المستوى وكيفية إيجاد الصور المختلفة لمعادلة الخط المستقيم فى المستوى (الصورة المتجهة- الصورة البارامترية- الصورة العامة) وفى هذا الدرس نتعلم المستقيم فى الفراغ وكيفية إيجاد معادلة المستقيم فى الفراغ فى صورها المختلفة لما فى ذلك من أهمية كبيرة فى مجالات الهندسة والتصميم المعمارى وتطبيقات علوم الفضاء.

سوف تتعلم

- متجه اتجاه الخط المستقيم.
- الصورة المختلفة لمعادلة المستقيم.
- الزاوية بين مستقيمين.
- المسافة بين نقطة ومستقيم.
- المستقيمات المتوازية.
- المستقيمات المتعامدة.

مصطلحات أساسية


- متجه اتجاه *Direction vector*
- المعادلة البارامترية *Parametric equations*
- المعادلة الاحداثية *Cartesian equation*
- زوايا الاتجاه *Direction angles*
- نسب الاتجاه *Direction ratios*

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسوم حاسوب ثلاثية الأبعاد.

تعلم

متجه اتجاه المستقيم فى الفراغ *Direction vector of a straight Line in space*



إذا كانت $\theta_س$ ، $\theta_ص$ ، $\theta_ع$ هى زوايا اتجاه مستقيم فى الفراغ فإن جتا $\theta_س$ ، جتا $\theta_ص$ ، جتا $\theta_ع$ هى جيوب تمام الاتجاه لهذا المستقيم وعادة يرمز لها بالرمز ل ، م ، ن.

ل = جتا $\theta_س$ ، م = جتا $\theta_ص$ ، ن = جتا $\theta_ع$

ويكون ل^٢ + م^٢ + ن^٢ = ١

ويكون المتجه $\vec{ى}$ = ل $\vec{س}$ + م $\vec{ص}$ + ن $\vec{ع}$ هو متجه الوحدة فى اتجاه المستقيم.

ويكون أى متجه موازيًا لمتجه الوحدة $\vec{ى}$ يسمى متجه اتجاه المستقيم ويرمز له بالرمز $\vec{هـ}$

أى أن $\vec{هـ}$ = ك (ل $\vec{س}$ + م $\vec{ص}$ + ن $\vec{ع}$) = (أ ، ب ، جـ)

حيث أ ، ب ، جـ تتناسب مع ل ، م ، ن ، ك ∈ ع*

أ ، ب ، جـ تسمى نسب اتجاه المستقيم

فمثلًا: إذا كان $(\frac{٢}{٣} ، \frac{١}{٣} ، \frac{٢}{٣})$ هى جيوب تمام الاتجاه المستقيم.

فإن المتجه $\vec{هـ}$ = ك $(\frac{٢}{٣} ، \frac{١}{٣} ، \frac{٢}{٣})$ يمثل متجه اتجاه المستقيم حيث ك ≠ صفر

بوضع ك = ٣ ⟵ $\vec{هـ}$ = (٢ ، ١ ، ٢)

وبوضع ك = -٦ ⟵ $\vec{هـ}$ = (-٤ ، -٢ ، -٤)

أى أن الخط المستقيم له عدد لا نهائى من متجهات الاتجاه المتوازية، وكل منها يوازى هذا المستقيم.

nezakr.natega4dk.net

مثال

(١) أوجد متجه الاتجاه للمستقيم المار بالنقطتين أ (-٢ ، ٣ ، ١) ، ب (٠ ، ٤ ، -٢)

الحل

متجه اتجاه المستقيم = $\overrightarrow{أب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ}$ = (٠ ، ٤ ، -٢) - (-٢ ، ٣ ، ١)

∴ $\overrightarrow{هـ}$ = (٢ ، ١ ، -٣)

حاول أن تحل

(١) أوجد متجه اتجاه كل من المستقيمات الآتية:

(أ) المستقيم المار بنقطة الأصل والنقطة (-١ ، ٢ ، -٢)

(ب) المستقيم المار بالنقطتين جـ (٠ ، -٢ ، ٣) ، ء (١ ، ١ ، -١)

تفكير ناقد:


١- ماذا يمكن أن تقول عن المستقيم الذى متجه اتجاهه $\overrightarrow{هـ}$ = (أ ، ب ، صفر)

٢- أوجد متجه اتجاه لكل من محاور الإحداثيات.

تعلم

الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم فى الفراغ *Vector form of the equation of a straight Line in space*

إذا كان ل مستقيم فى الفراغ متجه اتجاهه $\overrightarrow{هـ}$ = (أ ، ب ، جـ) ويمر بالنقطة أ متجه موضعها $\overrightarrow{أ}$ = (س١ ، ص١ ، ع١) فإذا كانت النقطة ب أى نقطة على المستقيم متجه موضعها $\overrightarrow{ر}$ = (س ، ص ، ع) فإن



من الشكل يكون: $\overrightarrow{ر} = \overrightarrow{أ} + \overrightarrow{أب}$

ولكن $\overrightarrow{أب}$ // $\overrightarrow{هـ}$ ($\overrightarrow{أب}$ = ك $\overrightarrow{هـ}$)

∴ $\overrightarrow{ر} = \overrightarrow{أ} + ك\overrightarrow{هـ}$ ⟵ الصورة المتجهة لمعادلة الخط المستقيم.

مثال

(٢) أوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٣، -١، ٠) والمتجه (-٢، ٤ ، ٣) متجه اتجاه له.

الحل

(٣ ، -١ ، ٠) تمثل نقطة على المستقيم ∴ $\overrightarrow{أ}$ = (٣ ، -١ ، ٠)

(-٢ ، ٤ ، ٣) يمثل متجه اتجاه المستقيم ∴ $\overrightarrow{هـ}$ = (-٢ ، ٤ ، ٣)

معادلة المستقيم هى $\overrightarrow{ر} = \overrightarrow{أ} + ك\overrightarrow{هـ}$

∴ $\overrightarrow{ر}$ = (٣ ، -١ ، ٠) + ك (-٢ ، ٤ ، ٣) ⟵ الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم.

nezakr.natega4dk.net

ملحوظة: ك عدد حقيقى لا يعبر عن عدد ثابت وحيد بل يأخذ قيمًا حقيقية مختلفة، ويسمى فى هذه الحالة بارامتر. وعند كل قيمة للبارامتر ك يمكن إيجاد نقطة على المستقيم.

فمثلًا عند ك = ١ فإن $\overrightarrow{ر}$ = (١ ، ٣ ، ٢) تمثل متجه موضع نقطة على المستقيم .

وعند ك = ٢ فإن $\overrightarrow{ر}$ = (-١ ، ٧ ، ٦) تمثل متجه موضع نقطة أخرى على المستقيم.

حاول أن تحل

(٢) أوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم المار بالنقطة (٤ ، -٢ ، ٥) والمتجه (١ ، -٢ ، ٢) متجه اتجاه له. ثم أوجد نقطة أخرى على هذا المستقيم.

تعلم

المعادلات البارامترية للمستقيم فى الفراغ

Parametric equations of a straight Line in space

من المعادلة المتجهة للمستقيم $\overrightarrow{ر}$ = $\overrightarrow{أ}$ + ك $\overrightarrow{هـ}$

وبالتعويض عن $\overrightarrow{ر}$ = (س ، ص ، ع) ، $\overrightarrow{أ}$ = (س$_١$ ، ص$_١$ ، ع$_١$) ، $\overrightarrow{هـ}$ = (أ ، ب ، جـ)

فإن (س ، ص ، ع) = (س$_١$ ، ص$_١$ ، ع$_١$) + ك (أ ، ب، جـ)

∴ (س = س$_١$ + كأ ، ص = ص$_١$ + ك ب ، ع = ع$_١$ + ك جـ) ⟵ المعادلات البارامترية للخط المستقيم

مثال

(٣) أوجد المعادلات البارامترية للخط المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -١ ، ٣) والمتجه (٤ ، -٢ ، ٥) متجه اتجاه له.

الحل

$\overrightarrow{ر}$ = (٢ ، -١ ، ٣) + ك (٤ ، -٢ ، ٥) ⟵ الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم

∴ (س ، ص ، ع) = (٢ ، -١ ، ٣) + ك (٤ ، -٢ ، ٥)

∴ س = ٢ + ٤ك ، ص = -١ -٢ك ، ع = ٣ + ٥ ك

حاول أن تحل

(٣) أوجد المعادلات البارامترية للمستقيم المار بنقطة الأصل، والمتجه (-٢ ، ٣ ، ١) متجه اتجاه له.

تعلم

المعادلة الاحداثية للخط المستقيم

cartesian equation of a straight Line in space

من المعادلات البارامترية للخط المستقيم

س = س$_١$ + ك أ، ص = ص$_١$ + ك ب، ع = ع$_١$ + ك جـ ∴ $\frac{س - س_١}{أ}$ = ك ، $\frac{ص - ص_١}{ب}$ = ك ، $\frac{ع - ع_١}{جـ}$ = ك

∴ $\frac{س - س_١}{أ} = \frac{ص - ص_١}{ب} = \frac{ع - ع_١}{جـ}$ ⟵ الصورة الاحداثية لمعادلة المستقيم

حيث كل من أ ، ب ، جـ لا يساوى الصفر

nezakr.nateg4dk.net

ملحوظة:

١- فى حالة أ = صفر مثلًا فإن الصورة الاحداثية للمستقيم تأخذ الصورة س = س١، $\frac{ص - ص_1}{ب} = \frac{ع - ع_1}{جـ}$

٢- تعلمت فى السنوات السابقة أن معادلة المستقيم فى المستوى هي أ س + ب ص + جـ = ٠ ويظن البعض أن معادلة المستقيم فى الفراغ ستكون أ س + ب ص + جـ ع + ء = ٠ وهذا خطأ شائع حيث إن المعادلة الأخيرة تمثل معادلة مستوى فى الفراغ كما سيتضح ذلك فى الدروس الآتية.

٣- حيث إن نسب الاتجاه أ ، ب ، جـ تتناسب مع جيوب تمام الاتجاه ل، م، ن فإنه يمكن كتابة الصورة الاحداثية لمعادلة المستقيم على الصورة

$$\frac{س - س_1}{ل} = \frac{ص - ص_1}{م} = \frac{ع - ع_1}{ن}$$

مثال

٤ أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم المار بالنقطتين (٢ ، -١ ، ٥) ، (-٣ ، ١ ، ٤).

الحل

متجه اتجاه المستقيم $\overleftarrow{هـ}$ = (-٣ ، ١ ، ٤) - (٢ ، -١ ، ٥) = (-٥ ، ٢ ، -١)

∴ الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم $\overleftarrow{ر}$ = (٢ ، -١ ، ٥) + ك (-٥ ، ٢ ، -١)

المعادلات البارامترية س = ٢ - ٥ك ، ص = -١ + ٢ك ، ع = ٥ - ك

الصورة الاحداثية $\frac{س - ٢}{-٥} = \frac{ص + ١}{٢} = \frac{ع - ٥}{-١}$

حاول أن تحل

٤ أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٢ ، ٠) ، (-١ ، ٣ ، ٤)

مثال

٥ أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم $\frac{٣س + ١}{٢} = \frac{ص - ١}{٢} = \frac{٥ - ع}{٣}$

الحل

نفرض $\frac{٣س + ١}{٢} = \frac{ص - ١}{٢} = \frac{٥ - ع}{٣} = ك$

∴ $\frac{٣س + ١}{٢} = ك$ ومنها س = $\frac{-١}{٣} + \frac{٢}{٣}ك$

$\frac{ص - ١}{٢} = ك$ ومنها ص = ١ + ٢ك

$\frac{٥ - ع}{٣} = ك$ ومنها ع = ٥ - ٣ك

المعادلات البارامترية للخط المستقيم

ومن المعادلات البارامترية يمكن كتابة المعادلة

(س ، ص ، ع) = $(-\frac{١}{٣} ، ١ ، ٥) + ك (\frac{٢}{٣} ، ٢ ، -٣)$

أى $\overleftarrow{ر}$ = $(-\frac{١}{٣} ، ١ ، ٥) + ك (\frac{٢}{٣} ، ٢ ، -٣)$ الصورة المتجهة

لاحظ أن: نسب اتجاه المستقيم هى $(\frac{٢}{٣} ، ٢ ، -٣)$ أو (٢ ، ٦ ، -٩)

nezakr.nateg4dk.net


حاول أن تحل

(٥) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستقيم $\frac{س+٤}{٣} = \frac{ص٢+٥}{٢} = \frac{ع-٤}{٤}$ ثم أوجد نقطة تقع على هذا المستقيم.

تعلم

الزاوية بين مستقيمين فى الفراغ

The angle netween two straight Lines in space



إذا كان ل١ ، ل٢ مستقيمين فى الفراغ متجهى اتجاهيهما $\overleftarrow{هـ_١} = (أ_١ ، ب_١ ، جـ_١)$ ، $\overleftarrow{هـ_٢} = (أ_٢ ، ب_٢ ، جـ_٢)$ فإن قياس الزاوية الصغرى بين المستقيمين ل١، ل٢ تعطى بالعلاقة

$$\text{جتا}\theta = \frac{|\overleftarrow{هـ_١} \cdot \overleftarrow{هـ_٢}|}{||\overleftarrow{هـ_١}|| \, ||\overleftarrow{هـ_٢}||}$$

و إذا كان (ل١ ، م١ ، ن١)، (ل٢ ، م٢ ، ن٢) هى جيوب تمام الاتجاه للمستقيمين فإن:

$$\text{جتا}\theta = |ل_١ ل_٢ + م_١ م_٢ + ن_١ ن_٢|$$

مثال

(٦) أوجد قياس الزاوية بين المستقيمين $\overleftarrow{ل_١} = (٢ ، -١ ، ٣) + ك_١ (-٢ ، ٠ ، ٢)$، $س = ١ ، \frac{ص-٤}{٣} = \frac{ع+٥}{-٣}$

الحل

من معادلة المستقيم الأول $\overleftarrow{هـ_١} = (-٢ ، ٠ ، ٢)$

من المعادلات البارامترية للمستقيم الثانى $\overleftarrow{هـ_٢} = (٠ ، ٣ ، -٣)$

$$\therefore \text{جتا}\theta = \frac{|\overleftarrow{هـ_١} \cdot \overleftarrow{هـ_٢}|}{||\overleftarrow{هـ_١}|| \, ||\overleftarrow{هـ_٢}||} = \frac{|(-٢ ، ٠ ، ٢) \cdot (٠ ، ٣ ، -٣)|}{\sqrt{(-٢)^٢ + ٠^٢ + ٢^٢} \sqrt{٠^٢ + ٣^٢ + (-٣)^٢}}$$

$$= \frac{٦}{\sqrt{٨} \sqrt{١٨}} = \frac{١}{٢}$$

$$\therefore \theta = ٦٠°$$

حاول أن تحل

(٦) أوجد قياس الزاوية بين المستقيمين

ل١ : س = ٢ - ٥ك، ص = ١ - ك ، ع = ٣ + ٤ك ، ل٢ : $\frac{س+١}{٣} = \frac{٢-ص}{٤} = \frac{ع}{٢}$

مثال

(٧) أوجد قياس الزاوية بين مستقيمين الذين جيوب تمام اتجاههما هى

$$\left(\frac{٥}{٢\sqrt{١٣}} ، \frac{-١٢}{٢\sqrt{١٣}} ، \frac{١}{٢\sqrt{}}\right) ، \left(\frac{-٣}{٢\sqrt{٥}} ، \frac{٤}{٢\sqrt{٥}} ، \frac{١}{٢\sqrt{}}\right)$$

nezakr.nategа4dk.net

الحل

$(ل_١، م_١، ن_١) = (\frac{٥}{٢\sqrt{١٣}}، \frac{-١٢}{٢\sqrt{١٣}}، \frac{١}{٢\sqrt{}})$ $\quad$ $(ل_٢، م_٢، ن_٢) = (\frac{-٣}{٢\sqrt{٥}}، \frac{٤}{٢\sqrt{٥}}، \frac{١}{٢\sqrt{}})$

$\therefore$ جتاθ $= |ل_١ل_٢ + م_١م_٢ + ن_١ن_٢|$

$= |\frac{٥}{٢\sqrt{١٣}} \times \frac{-٣}{٢\sqrt{٥}} + \frac{-١٢}{٢\sqrt{١٣}} \times \frac{٤}{٢\sqrt{٥}} + \frac{١}{٢\sqrt{}} \times \frac{١}{٢\sqrt{}}|$

$= |\frac{-١٥}{١٣٠} + \frac{-٤٨}{١٣٠} + \frac{١}{٢}| = \frac{١}{٦٥}$

$\therefore \theta$ $= $ جتا$^{-١}(\frac{١}{٦٥}) = ٨٩° ٥٧' ٦''$

حاول أن تحل

(٧) أوجد قياس الزاوية بين المستقيمين اللذين جيوب تمام اتجاههما هى $(\frac{٢}{٣}، \frac{-٢}{٣}، \frac{١}{٣})$، $(\frac{١}{٢\sqrt{}}، \frac{١}{٢\sqrt{}}، ٠)$

تعلم

المستقيمان المتوازيان فى الفراغ

Parallel Lines in space

إذا كان $\overleftarrow{هـ_١} = (أ_١، ب_١، جـ_١)$، $\overleftarrow{هـ_٢} = (أ_٢، ب_٢، جـ_٢)$ هما متجها اتجاه المستقيمين ل$_١$، ل$_٢$ فإن ل$_١$ // ل$_٢$ إذا وفقط إذا كان $\overleftarrow{هـ_١}$ // $\overleftarrow{هـ_٢}$ وهذا الشرط يمكن تحققه بعدة صور مختلفة

١- $\overleftarrow{هـ_١} = ك \overleftarrow{هـ_٢}$ $\quad$ ٢- $\frac{أ_١}{أ_٢} = \frac{ب_١}{ب_٢} = \frac{جـ_١}{جـ_٢}$ $\quad$ ٣- $\overleftarrow{هـ_١} \times \overleftarrow{هـ_٢} = \overleftarrow{و}$

ملحوظة

١- إذا كان المستقيمان متوازيين وكانت نقطة على أحدهما تحقق الآخر فإن المستقيمين منطبقان.

٢- إذا كان $\overleftarrow{هـ_١}$ لا يوازى $\overleftarrow{هـ_٢}$ فإن ل$_١$، ل$_٢$ إما متقاطعان أو متخالفان.

مثال

(٨) أثبت أن المستقيمين $\overleftarrow{ر_١} = \overleftarrow{ص} + ك_١(\overleftarrow{س} + ٢\overleftarrow{ص} - \overleftarrow{ع})$

$\overleftarrow{ر_٢} = (\overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص} + \overleftarrow{ع}) + ك_٢(-٢\overleftarrow{س} - ٢\overleftarrow{ص})$

متقاطعان فى نقطة، وأوجد نقطة تقاطعهما.

الحل

$\overleftarrow{هـ_١} = (١، ٢، -١)$، $\overleftarrow{هـ_٢} = (-٢، -٢، ٠)$

$\because \frac{أ_١}{أ_٢} = \frac{١}{-٢} = \frac{١}{-٢}$ ، $\frac{ب_١}{ب_٢} = \frac{٢}{-٢} = -١$ $\quad \therefore \frac{أ_١}{أ_٢} \neq \frac{ب_١}{ب_٢}$

$\therefore$ المستقيمان غير متوازيين لإثبات أن المستقيمين متقاطعان فى نقطة نبحث عن قيمة لـ ك$_١$، وقيمة لـ ك$_٢$ تجعلان $\overleftarrow{ر_١} = \overleftarrow{ر_٢}$

$\therefore \overleftarrow{ص} + ك_١(\overleftarrow{س} + ٢\overleftarrow{ص} - \overleftarrow{ع}) = \overleftarrow{س} + \overleftarrow{ص} + \overleftarrow{ع} + ك_٢(-٢\overleftarrow{س} - ٢\overleftarrow{ص})$ بمساواة المعاملات

nezakr.nategа4dk.net

∴ $ك_1 = 1 - 2ك_2$ ومنها $ك_1 + 2ك_2 = 1$ (١)

$2ك_1 = -2ك_2$ ومنها $ك_1 + ك_2 = 0$ (٢)

$-ك_1 = 1$ ومنها $ك_1 = -1$ (٣)

بالتعويض من (٣) فى (١) $ك_2 = 1$

وهذه القيم تحقق المعادلة (٢)

∴ المستقيمان متقاطعان فى نقطة، ويكون متجه موضع نقطة تقاطعهما هو

$\overleftarrow{ر} = \overleftarrow{ص} - 1(\overleftarrow{س} + 2\overleftarrow{ص} - \overleftarrow{ع}) = -\overleftarrow{س} - \overleftarrow{ص} + \overleftarrow{ع}$ أى (-١، -١، ١)

حاول أن تحل

(٨) أثبت أن المستقيمين $\overleftarrow{ر_1} = (٣، -٣، ٥) + ك_1(٠، -٥، ٥)$

$\overleftarrow{ر_2} = (-٢، ٣، ١) + ك_2(٥، -١، -١)$

متعامدان ومتقاطعان فى نقطة، وأوجد إحداثيات نقطة تقاطعهما.

تعلم

المستقيمان المتعامدان فى الفراغ

Perpendicular Lines in space

إذا كان $\overleftarrow{هـ_1} = (أ_1، ب_1، جـ_1)$ ، $\overleftarrow{هـ_2} = (أ_2، ب_2، جـ_2)$ هما متجها اتجاه المستقيمين ل١، ل٢ فإن

ل١ ⊥ ل٢ إذا وفقط إذا كان $\overleftarrow{هـ_1} \cdot \overleftarrow{هـ_2} = 0$

مثال

(٩) أثبت أن المستقيمين $\overleftarrow{ر_1} = (١، ٢، ٤) + ك_1(٢، -١، ١)$ ، $\overleftarrow{ر_2} = (١، ١، ١) + ك_2(-٢، ٧، ١١)$ متعامدان ثم بين أن المستقيمين متخالفان.

الحل

$\overleftarrow{هـ_1} = (٢، -١، ١)$ ⟵ متجه اتجاه المستقيم الأول

$\overleftarrow{هـ_2} = (-٢، ٧، ١١)$ ⟵ متجه اتجاه المستقيم الثانى

∴ $\overleftarrow{هـ_1} \cdot \overleftarrow{هـ_2} = (٢، -١، ١) \cdot (-٢، ٧، ١١)$

$= ٢ \times (-٢) + (-١) \times ٧ + ١ \times ١١$

$= -٤ - ٧ + ١١$

= صفر ∴ المستقيمان متعامدان

لإثبات أن المستقيمين متخالفان نثبت أنه لا توجد أى قيم لـ ك١، ك٢ تجعل $\overleftarrow{ر_1} = \overleftarrow{ر_2}$

أى $(١، ٢، ٤) + ك_1(٢، -١، ١) = (١، ١، ١) + ك_2(-٢، ٧، ١١)$ بمساواة المعاملات

∴ $١ + ٢ك_1 = ١ - ٢ك_2$ ومنها $ك_1 + ك_2 = 0$ (١)

$٢ - ك_1 = ١ + ٧ك_2$ ومنها $-ك_1 - ٧ك_2 = -١$ (٢)

$٤ + ك_1 = ١ + ١١ك_2$ ومنها $ك_1 - ١١ك_2 = -٣$ (٣)

nezakr.nategа4dk.net

بحل المعادلتين ١ ، ٢ نحصل على ك١ = $\frac{-١}{٦}$ ، ك٢ = $\frac{١}{٦}$ وهذه القيم لا تحقق المعادلة الثالثة

∴ المستقيمان متخالفان


حاول أن تحل

(٩) أثبت أن المستقيمين $\overleftarrow{ر_١}$ = (٣ ، -١ ، ٢) + ك١ (٤ ، ١ ، ٣)، $\overleftarrow{ر_٢}$ = (٠ ، ٤ ، -١) + ك٢ (١ ، -١ ، ٢) متخالفان.

مثال

(١٠) أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة (٢ ، -١ ، ٣) ويقطع المستقيم $\overleftarrow{ر_١}$ = (١ ، -١ ، ٢) + ك (٢ ، ٢ ، -١) على التعامد.

الحل



نفرض أن المستقيمين متقاطعان فى نقطة جـ

∵ جـ ∈ المستقيم ل١ (المستقيم المعلوم)

∴ جـ يمكن كتابتها على الصورة

جـ (١ + ٢ك ، -١ + ٢ك ، ٢ - ك)

متجه اتجاه ل٢ (المستقيم المطلوب) هو $\overleftarrow{هـ_٢}$ = $\overrightarrow{أجـ}$ = $\overleftarrow{جـ}$ - $\overleftarrow{أ}$

∴ $\overleftarrow{هـ_٢}$ = (٢ك - ١ ، ٢ك ، -ك - ١)

∵ $\overleftarrow{هـ_١}$ = (٢ ، ٢ ، -١)

∵ المستقيمان متعامدان ∴ $\overleftarrow{هـ_١}$ • $\overleftarrow{هـ_٢}$ = ٠

∴ (٢ ، ٢ ، -١) • (٢ك - ١ ، ٢ك ، -ك - ١) = ٠

∴ ٤ك - ٢ + ٤ك + ك + ١ = ٠

∴ ٩ك = ١ ومنها ك = $\frac{١}{٩}$

∴ $\overleftarrow{هـ_٢}$ = ($\frac{-٧}{٩}$ ، $\frac{٢}{٩}$ ، $\frac{-١٠}{٩}$) = (-٧ ، ٢ ، -١٠)

∴ معادلة ل٢ هى $\overleftarrow{ر}$ = (٢ ، -١ ، ٣) + ك٢ (-٧ ، ٢ ، -١٠)


حاول أن تحل

(١٠) أوجد معادلة المستقيم المار بنقطة الأصل ويقطع المستقيم $\overleftarrow{ر}$ = (٣ ، ١ ، ٤) + ك (٢ ، ١ ، ٣) على التعامد

مثال (المسافة بين نقطة ومستقيم فى الفراغ)

(١١) أوجد البعد العمودى من النقطة (٣ ، -١ ، ٧) للمستقيم المار بالنقطتين (٢ ، ٢ ، -١)، (٠ ، ٣ ، ٥)

الحل



بفرض أ (٢ ، ٢ ، -١)، ب (٠ ، ٣ ، ٥)، جـ (٣ ، -١ ، ٧)

$\overleftarrow{بجـ}$ = $\overleftarrow{جـ}$ - $\overleftarrow{ب}$ = (٣ ، -١ ، ٧) - (٠ ، ٣ ، ٥) = (٣ ، -٤ ، ٢)

متجه اتجاه المستقيم $\overleftarrow{هـ}$ = $\overrightarrow{بأ}$ = $\overleftarrow{أ}$ - $\overleftarrow{ب}$

∴ $\overleftarrow{هـ}$ = (٢ ، -١ ، -٦)

nezakr.nategа4dk.net

ب ء هى مقياس مسقط $\overrightarrow{ب جـ}$ على المستقيم $\overleftrightarrow{أ ب}$ = $\frac{|\overrightarrow{ب جـ} \cdot \overrightarrow{ب أ}|}{||\overrightarrow{ب أ}||}$

∴ ب ء = $\frac{|(٣، -٤، ٢) \cdot (٢، -١، -٦)|}{\sqrt{٢^٢ + (-١)^٢ + (-٦)^٢}}$ = $\frac{٢}{\sqrt{٤١}}$

لكن $||\overrightarrow{ب جـ}||$ = $\sqrt{٣^٢ + (-٤)^٢ + ٢^٢}$ = $\sqrt{٢٩}$

∴ البعد العمودى جـ ء = $\sqrt{(ب جـ)^٢ - (ب ء)^٢}$ = $\sqrt{٢٩ - \frac{٤}{٤١}}$ = $\sqrt{\frac{١١٨٥}{٤١}}$ ≃ ٥,٣ وحدة طول

حاول أن تحل

(١١) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٢ ، ١ ، -٤) على المستقيم $\overleftrightarrow{ر}$ = (١، -١، ٢) + ك (٢ ، ٣ ، -٢)

تفكير ناقد: هل يمكنك اثبات الصيغة التالية التى تعين بعد النقطة ب عن المستقيم $\overleftrightarrow{ر}$ = $\overrightarrow{أ}$ + ك $\overrightarrow{هـ}$

البعد العمودى = $\frac{||\overrightarrow{أ ب} \times \overrightarrow{هـ}||}{||\overrightarrow{هـ}||}$

تمـارين (٤ - ١)

أكمل:

(١) المعادلة المتجهة للمستقيم المار بالنقطة (٢ ، -١ ، ٣) والمتجه (-١ ، ٤ ، ٢) متجه اتجاه له هى .....

(٢) قياس الزاوية بين المستقيمين ٢س = ٣ص = -ع ، ٦س = -ص = -٤ع يساوى .....

(٣) قياس الزاوية بين المستقيمين اللذين نسب اتجاههما هى (١، ١، ٢)، ($\sqrt{٣}$ ، -١، -$\sqrt{٣}$) ، (١، -١، ٤) يساوى .....

(٤) إذا كانت θ ع هى الزاوية التى يصنعها المستقيم المار بالنقطة (٣، -١ ، ١) ونقطة الأصل والاتجاه الموجب لمحور ع فإن جتاθ ع = ...

(٥) متجه اتجاه المستقيم المار بالنقطتين (٧ ، -٥ ، ٤)، (٥ ، -٣ ، ٣) هو .....

اجب عن الاسئلة الآتية:

(٦) أوجد جيوب تمام الاتجاه للمستقيم الذى نسب اتجاهه

(أ) -١ ، ٢ ، ٣ (ب) ١ ، ١ ، ١

(٧) أوجد الصورة المختلفة لمعادلة المستقيم.

(أ) المار بالنقطة (٤ ، -٢ ، ٥) والمتجه $\overrightarrow{هـ}$ = (٢ ، ١ ، -١) متجه اتجاه له.

(ب) المار بالنقطة (٣ ، -١ ، ٥) ويوازى المتجه $\overrightarrow{أ ب}$ حيث $\overrightarrow{أ ب}$ = (٤ ، -٢ ، ٢)

(جـ) المار بالنقطتين (٣ ، -٢ ، ٠)، (٠ ، ٤ ، ١)

(د) المار بالنقطة (٣ ، ٢ ، ٥) ويصنع مع الاتجاهات الموجبة لمحاور الإحداثيات زوايا متساوية.

nezakr.nategа4dk.net

(٨) أوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستقيم $س - ٣ = \frac{ص + ٢}{٤} = \frac{ع - ٢}{٣}$

(٩) إذا كان $\overrightarrow{وأ} = س - ٢ص + ع$ ، $\overrightarrow{وب} = -س - ٣ع$ ،
$\overrightarrow{وجـ} = ٣س + ص - ٢ع$ ، $\overrightarrow{وء} = ٨س + ص + ٤ع$.
أوجد المعادلة المتجهة لكل من المستقيمات

أ المار بالنقطتين أ، ب

ب المار بالنقطة ء موازيًا $\overleftrightarrow{ب جـ}$

جـ المار بالنقطة جـ قاطعًا $\overleftrightarrow{أ ب}$ على التعامد

(١٠) أوجد قياس الزاوية بين المستقيمين

أ $ل_١$: يمر بالنقطتين (-٣ ، ٢ ، ٤) ، (٢ ، ٥ ، -٢)
$ل_٢$: يمر بالنقطتين (١ ، -٢ ، ٢) ، (٤ ، ٢ ، ٣)

ب $ل_١ : \overrightarrow{ر} = (٢ ، -١ ، ٣) + ك_١ (-١ ، ٤ ، ٢)$
$ل_٢ : \overrightarrow{ر} = (٠ ، ٢ ، -١) + ك_٢ (١ ، ١ ، ٣)$

جـ $ل_١ : ٢س = ٣ص = ٤ع$
$ل_٢ : \frac{س - ١}{٣} = \frac{ص + ٢}{-٢} = \frac{ع}{-٥}$

(١١) اذكر الشرط (أو الشروط) اللازم لكى يكون المستقيمان
$ل_١ : س = س_١ + أ_١ ك_١$ ، $ص = ص_١ + ب_١ ك_١$ ، $ع = ع_١ + جـ_١ ك_١$
$ل_٢ : س = س_٢ + أ_٢ ك_٢$ ، $ص = ص_٢ + ب_٢ ك_٢$ ، $ع = ع_٢ + جـ_٢ ك_٢$

أ متوازيان ب متعامدان جـ متقاطعان فى نقطة

(١٢) أوجد المعادلة المتجهة للمستقيم المار بالنقطة أ (١ ، -١ ، ٠) ويوازى المستقيم المار بالنقطتين ب (-٣ ، ٢ ، ١)، جـ (٢ ، ١ ، ٠) ثم بين أن النقطة ء (-١٤ ، ٢ ، ٣) تقع على المستقيم.

(١٣) أوجد قيمة ن التى تجعل المستقيمين $ل_١ : \overrightarrow{ر} = (٣ ، -١ ، ن) + ك_١ (٤ ، ١ ، ٣)$
$ل_٢ : س = \frac{ص - ٤}{-١} = \frac{ع + ١}{٢}$ متقاطعان فى نقطة، وأوجد نقطة تقاطعهما

(١٤) **اكتشف الخطأ:**

أ مجموع مربعات نسب الاتجاه لأى مستقيم يساوى ١

ب جيوب تمام الاتجاه للمستقيم المار بالنقطتين (س١ ، ص١ ، ع١) ، (س٢ ، ص٢ ، ع٢) هى
(س٢ - س١ ، ص٢ - ص١ ، ع٢ - ع١)

جـ إذا كان (أ١ ، ب١ ، جـ١) ، (أ٢ ، ب٢ ، جـ٢) هى نسب الاتجاه للمستقيمين $ل_١$، $ل_٢$ فإن قياس الزاوية بينهما تعطى بالعلاقة $جتا\theta = |أ_١ أ_٢ + ب_١ ب_٢ + جـ_١ جـ_٢|$

nezakr.natega4dk.net

٤ - ٢ معادلة المستوى فى الفراغ

The equation of a plane in space

فكر و ناقش

١- إذا كان $\overrightarrow{أ}$ ، $\overrightarrow{ب}$ متجهين متعامدين فإن $\overrightarrow{أ} \cdot \overrightarrow{ب}$ = ...


٢- متجه اتجاه المستقيم المار بالنقطتين (س١، ص١، ع١)، (س٢، ص٢، ع٢) هو .....

٣- الإحداثى ع لجميع النقط التى تقع فى المستوى الإحداثى س ص يساوى .....

تعلم

الصورة المتجهة لمعادلة المستوى فى الفراغ

Vector form of the equation of a plane in space



إذا كانت النقطة ا (س١، ص١، ع١) تقع على المستوى متجه موضعها $\overrightarrow{أ}$ ، وكان المتجه $\overrightarrow{ن}$ = (أ، ب، جـ) متجه اتجاه عمودى على المستوى وكانت ب (س، ص، ع) أى نقطة على المستوى متجه موضعها $\overrightarrow{ر}$ فإن:

$\overrightarrow{ن} \cdot \overrightarrow{اب}$ = صفر

$\therefore \overrightarrow{ن} \cdot (\overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ}) = 0$ $(\overrightarrow{ب} = \overrightarrow{ر})$

$\therefore \overrightarrow{ن} \cdot \overrightarrow{ر} = \overrightarrow{ن} \cdot \overrightarrow{أ}$ ⟵ الصورة المتجهة لمعادلة المستوى.

أى أن: لإيجاد المعادلة المتجهة للمستوى يجب معرفة نقطة على المستوى ومتجه الاتجاه العمودى على المستوى.

مثال

(١) أوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (٠ ، ١ ، ١) والمتجه $\overrightarrow{ن} = \overrightarrow{س} + \overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع}$ عمودى على المستوى.

سوف تتعلم

- المعادلة المتجهه للمستوى فى الفراغ.
- المعادلة القياسية للمستوى فى الفراغ.
- المعادلة العامة للمستوى فى الفراغ.
- الزاوية بين مستويين.
- شرط توازى مستويين.
- شرط تعامد مستويين.
- معادلة خط تقاطع مستويين فى الفراغ.
- المسافة بين نقطة ومستوى.
- المسافة بين مستويين متوازيين.

مصطلحات أساسية

- مستوى *plane*
- صورة قياسية *Standard form*
- مستويان متوازيان *Parallel planes*
- مستويان متعامدان *Perpendicular planes*
- مستويان متقاطعان *Interecting planes*
- زاوية *Angle*

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسوم حاسوب ثلاثية الأبعاد.

nezakr.nategа4dk.net

الحل

المعادلة المتجه $\vec{ن} \cdot \vec{ر} = \vec{ن} \cdot \vec{أ}$ حيث $\vec{أ} = (٠ ، ١ ، ١)$

$\therefore (١ ، ١ ، ١) \cdot \vec{ر} = (١ ، ١ ، ١) \cdot (٠ ، ١ ، ١)$

$(١ ، ١ ، ١) \cdot \vec{ر} = ٢$

حاول أن تحل

(١) أوجد الصورة المتجهة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (٢ ، -٣ ، ١) والمتجه $\vec{ن} = (١ ، -٢ ، ٣)$ عمودى على المستوى.

تعلم

الصورة القياسية والصورة العامة لمعادلة المستوى فى الفراغ

Standard form and general form of the equation of a plane in space

من الصورة المتجهة لمعادلة المستوى

$\vec{ن} \cdot (\vec{ر} - \vec{أ}) =$ صفر

حيث $\vec{ن} = (أ ، ب ، جـ)$، $\vec{ر} = (س ، ص ، ع)$، $\vec{أ} = (س_١ ، ص_١ ، ع_١)$

$\therefore (أ ، ب ، جـ) \cdot (س - س_١ ، ص - ص_١ ، ع - ع_١) =$ صفر

$\therefore أ(س - س_١) + ب(ص - ص_١) + جـ(ع - ع_١) = ٠$ ⟵ الصورة القياسية لمعادلة المستوى

وبفك الأقواس

$\therefore أس + ب ص + جـ ع + (-أس_١ - ب ص_١ - جـ ع_١) = ٠$

وبفرض $-أس_١ - ب ص_١ - جـ ع_١ = ء$ **فإن**

$أ س + ب ص + جـ ع + ء = ٠$ ⟵ الصورة العامة لمعادلة المستوى

مثال

(٢) أوجد الصورة القياسية والصورة العامة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (٣ ، -٥ ، ٢) والمتجه $\vec{ن} = (٢ ، ١ ، ١)$ عمودى على المستوى.

الحل

الصورة القياسية $أ(س - س_١) + ب(ص - ص_١) + جـ(ع - ع_١) = ٠$

$\therefore ٢(س - ٣) + (ص + ٥) + (ع - ٢) = ٠$ ⟵ الصورة القياسية

وبفك الأقواس وتجميع الحدود المتشابهة

$\therefore ٢س + ص + ع - ٣ = ٠$ ⟵ الصورة العامة

حاول أن تحل

(٢) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (-٣ ، ٤ ، ٢) والمتجه $\vec{ن} = (١ ، -١ ، ٣)$ عمودى على المستوى.

nezakr.natega4dk.net

مثال (معادلة المستوى المار بثلاث نقط ليست على استقامة واحدة)

(٣) أوجد الصورة المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقط (٣ ، -١، ٠) ، (٢ ، ١ ، ٤) ، (٠ ، ٣ ، ٣).

الحل

أولًا يجب التأكد من أن النقط ليست على استقامة واحدة


بفرض أ (٣ ، -١ ، ٠)، ب (٢ ، ١ ، ٤)، جـ (٠ ، ٣ ، ٣)

$\overrightarrow{أب} = \overrightarrow{ب} - \overrightarrow{أ} = (-١، ٢، ٤)$ ، $\overrightarrow{أجـ} = \overrightarrow{جـ} - \overrightarrow{أ} = (-٣ ، ٤ ، ٣)$

$\because \frac{-١}{-٣} \neq \frac{١}{٢}$ $\therefore$ $\overrightarrow{أب}$ لا يوازي $\overrightarrow{أجـ}$ $\therefore$ النقط ليست على استقامة واحدة

لإيجاد معادلة المستوى نحتاج متجه اتجاه العمودى على المستوى. وذلك بإيجاد الضرب الاتجاهى للمتجهين $\overrightarrow{أب}$ ، $\overrightarrow{أجـ}$.

$$\overrightarrow{ن} = \overrightarrow{أب} \times \overrightarrow{أجـ} = \begin{vmatrix} \overrightarrow{س} & \overrightarrow{ص} & \overrightarrow{ع} \\ -١ & ٢ & ٤ \\ -٣ & ٤ & ٣ \end{vmatrix} = -١٠\overrightarrow{س} - ٩\overrightarrow{ص} + ٢\overrightarrow{ع}$$



$\therefore$ الصورة المتجهة لمعادلة المستوى

$\overrightarrow{ن} \cdot \overrightarrow{ر} = \overrightarrow{ن} \cdot \overrightarrow{أ}$

$\therefore$ $(-١٠ ، -٩ ، ٢) \cdot \overrightarrow{ر} = (-١٠ ، -٩ ، ٢) \cdot (٣ ، -١ ، ٠)$

$\therefore$ $(-١٠ ، -٩ ، ٢) \cdot \overrightarrow{ر} = -٢١$

الصورة القياسية لمعادلة المستوى

أ (س - س١) + ب (ص - ص١) + جـ (ع - ع١) = ٠

$\therefore$ -١٠ (س - ٣) - ٩ (ص + ١) + ٢ع = ٠

الصورة العامة لمعادلة المستوى

$(-١٠ ، -٩ ، ٢) \cdot (س ، ص ، ع) = -٢١$ $\therefore$ -١٠س - ٩ص + ٢ ع + ٢١ = ٠

أضف إلى معلوماتك

معادلة المستوى المار بالثلاث نقط (س١، ص١، ع١)، (س٢، ص٢، ع٢)، (س٣، ص٣، ع٣) هى:

$$\begin{vmatrix} س - س_١ & ص - ص_١ & ع - ع_١ \\ س_٢ - س_١ & ص_٢ - ص_١ & ع_٢ - ع_١ \\ س_٣ - س_١ & ص_٣ - ص_١ & ع_٣ - ع_١ \end{vmatrix} = ٠$$

حاول أن تحل

(٣) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقط (١ ، ٠ ، ٠)، (٠ ، ٢، ٠) ، (٠ ، ٠ ، ٣).

مثال (مستوى يحوى مستقيمين)

(٤) أثبت أن المستقيمين $\overrightarrow{ر_١} = (٣\overrightarrow{س} + \overrightarrow{ص} - \overrightarrow{ع}) + ك_١ (\overrightarrow{س} + ٢\overrightarrow{ص} + ٣\overrightarrow{ع})$

$\overrightarrow{ر_٢} = (٢\overrightarrow{س} + ٥\overrightarrow{ص}) + ك_٢ (\overrightarrow{س} - \overrightarrow{ص} + \overrightarrow{ع})$

متقاطعان، وأوجد معادلة المستوى الذى يحتويهما.

nezakr.nategа4dk.net

الحل

إذا تقاطع المستقيمان فإن $ر_١ = ر_٢$

$\therefore$ $(٣س + ص - ع) + ك_١ (س + ٢ص + ٣ع) = (٢س + ٥ص) + ك_٢ (س - ص + ع)$

بمساواة المعاملات نجد أن

$٣ + ك_١ = ٢ + ك_٢$ ومنها $ك_١ - ك_٢ = -١$ (١)

$١ + ٢ك_١ = ٥ - ك_٢$ ومنها $٢ك_١ + ك_٢ = ٤$ (٢)

$-١ + ٣ك_١ = ك_٢$ ومنها $٣ك_١ - ك_٢ = ١$ (٣)

بحل المعادلتين ١ ، ٢ $ك_١ = ١$ ، $ك_٢ = ٢$

وبالتعويض بهذه القيم فى المعادلة (٣) نجد أنها تحققها

$\therefore$ المستقيمان متقاطعان.

متجه الاتجاه العمودى على المستوى هو $\vec{ن}$ حيث

$$\vec{ن} = \vec{هـ_١} \times \vec{هـ_٢} = \begin{vmatrix} \vec{س} & \vec{ص} & \vec{ع} \\ ١ & ٢ & ٣ \\ ١ & -١ & ١ \end{vmatrix} = ٥\vec{س} + ٢\vec{ص} - ٣\vec{ع}$$

المعادلة المتجهة للمستوى $\vec{ن} \cdot \vec{ر} = \vec{ن} \cdot \vec{أ}$

$\therefore$ $(٥ ، ٢ ، -٣) \cdot \vec{ر} = (٥ ، ٢ ، -٣) \cdot (٣ ، ١ ، -١)$

$\therefore$ $(٥ ، ٢ ، -٣) \cdot \vec{ر} = ٢٠$

الصورة العامة

$(٥ ، ٢ ، -٣) \cdot (س ، ص ، ع) = ٢٠$

$\therefore$ $٥س + ٢ص - ٣ع = ٢٠$

حاول أن تحل

(٤) أثبت أن المستقيمين $ل_١ : ٢س = ٣ص = ٤ع$ ، $ل_٢ : ٣س = ٢ص = ٥ع$ متقاطعان ثم أوجد معادلة المستوى الذى يحويهما .

مثال

(٥) أوجد نقطة تقاطع المستقيم $٢س = ٣ص - ١ = ع - ٤$ مع المستوى $٣س + ص - ٢ع = ٥$

الحل

من معادلة المستوى $ص = ٥ + ٢ع - ٣س$

بالتعويض فى معادلة المستقيم

$٢س = ١٤ + ٦ع - ٩س = ع - ٤$

$١١س - ٦ع = ١٤$ (١) $-٥ع + ٩س = ١٨$ (٢)

nezakr.natega4dk.net

بحل المعادلتين (١) ، (٢) نحصل على

س = -٣٨ ، ع = -٧٢

بالتعويض فى معادلة المستوى ∴ ص = -٢٥

∴ نقطة التقاطع هى (-٣٨ ، -٢٥ ، -٧٢)


حاول أن تحل

(٥) أوجد نقطة تقاطع المستقيم $\overleftarrow{ر}$ = (١ ، ٤ ، ٢) + ك (٣ ، ٢ ، ٢) مع المستوى (٣ ، ٢ ، ٢) . $\overleftarrow{ر}$ = -٢

تعلم

الزاوية بين مستويين

the angle between two planes



قياس الزاوية بين مستويين هو قياس الزاوية بين متجهى الاتجاه العمودين عليهما.

فإذا كان $\overleftarrow{ن_1}$ ، $\overleftarrow{ن_2}$ هما المتجهين العمودين على المستويين فإن قياس الزاوية بين المستويين تعطى بالعلاقة

$$\text{جتا}\theta = \frac{|\overleftarrow{ن_1} \cdot \overleftarrow{ن_2}|}{||\overleftarrow{ن_1}|| \, ||\overleftarrow{ن_2}||} \quad \text{حيث } 0 \leq \theta \leq 90°$$

مثال

(٦) أوجد قياس الزاوية بين المستويين (٢ ، -١ ، ٤) . $\overleftarrow{ر}$ = ٥ ، ٣س - ص + ٢ع = ٤

الحل

متجه الاتجاه العمودى على المستوى الأول $\overleftarrow{ن_1}$ = (٢ ، -١ ، ٤)

متجه الاتجاه العمودى على المستوى الثانى $\overleftarrow{ن_2}$ = (٣ ، -١ ، ٢)

∴ قياس الزاوية بين المستويين هى θ حيث

$$\text{جتا}\theta = \frac{|\overleftarrow{ن_1} \cdot \overleftarrow{ن_2}|}{||\overleftarrow{ن_1}|| \, ||\overleftarrow{ن_2}||} = \frac{|(٢ ، -١ ، ٤) \cdot (٣ ، -١ ، ٢)|}{\sqrt{٢^٢ + (-١)^٢ + ٤^٢} \sqrt{٣^٢ + (-١)^٢ + ٢^٢}} = \frac{١٥}{٦\sqrt{٧}}$$

$$\therefore \theta = \text{جتا}^{-١}\left(\frac{١٥}{٦\sqrt{٧}}\right) = ٢٨° ٥٨′$$

حاول أن تحل

(٦) أوجد قياس الزاوية بين المستويين س - ٣ص + ٢ع = ٠ ، ٢س + ص - ع = ٣

المستويان المتوازيان والمستويان المتعامدان

Parallel planes and perpendicular planes

إذا كان $\overleftarrow{ن_1}$ ، $\overleftarrow{ن_2}$ هما متجهى الاتجاه العموديين على المستويين فإن

١- المستويين متوازيان إذا كان $\overleftarrow{ن_1}$ // $\overleftarrow{ن_2}$ أى إذا كان $\left(\frac{أ_1}{أ_2} = \frac{ب_1}{ب_2} = \frac{جـ_1}{جـ_2}\right)$

٢- المستويين متعامدان إذا كان $\overleftarrow{ن_1} \cdot \overleftarrow{ن_2} = ٠$ أى إذا كان $(أ_1 أ_2 + ب_1 ب_2 + جـ_1 جـ_2 = ٠)$

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٧) إذا كان المستوى ٢س - ص + ك ع = ٥ يوازى المستوى س + ل ص + ٤ ع = ١ فما قيمة كل من ك ، ل.

الحل

∵ المستويان متوازيان ∴ $\frac{أ_١}{أ_٢} = \frac{ب_١}{ب_٢} = \frac{جـ_١}{جـ_٢}$

∴ $\frac{٢}{١} = \frac{-١}{ل} = \frac{ك}{٤}$ ∴ ل = $\frac{-١}{٢}$ ، ك = ٨

حاول أن تحل

(٧) إذا كان المستوى س - ٣ص + ع = ٤ عمودى على المستوى أ س + ٢ص + ٣ ع = ٢ فما قيمة أ

مثال (معادلة خط تقاطع مستويين)

(٨) أوجد معادلة خط تقاطع المستويين س + ٢ص - ٢ع = ١ ، ٢ س + ص - ٣ع = ٥

الحل

بحذف س من المعادلتين، وذلك بضرب المعادلة الأولى فى -٢ والجمع مع الثانية

∴ -٣ص + ع = ٣ ومنها ع = ٣ص + ٣ (١)

بحذف ص من المعادلتين، وذلك بضرب المعادلة الثانية فى -٢ والجمع

∴ -٣س + ٤ ع = -٩ ومنها ع = $\frac{-٩ - ٣س}{٤}$

∴ $\frac{٣س - ٩}{٤} = \frac{٣ص + ٣}{١} = \frac{ع}{١}$ معادلة خط التقاطع

حل آخر:

س + ٢ص - ٢ع = ١ (١)

٢س + ص - ٣ع = ٥ (٢)

بحذف س

-٣ص + ع = ٣ (٣)

بفرض ع = ك

(٣) ص = $\frac{-٣ - ك}{٣}$ ، (٢) س = $\frac{٩ + ٤ك}{٣}$

∴ المعادلات البارامترية لخط التقاطع هى

س = ٣ + $\frac{٤}{٣}$ ك ، ص = -١ + $\frac{١}{٣}$ ك ، ع = ك

حل ثالث:

خط التقاطع عمودى على المتجهين $\vec{ن}_١$ ، $\vec{ن}_٢$ العمودين على المستويين.

∴ متجه اتجاه خط التقاطع $\vec{هـ}$ يمكن حسابه من الضرب الاتجاهى للمتجهين $\vec{ن}_١$ ، $\vec{ن}_٢$

$$\vec{هـ} = \vec{ن}_١ \times \vec{ن}_٢ = \begin{vmatrix} \vec{س} & \vec{ص} & \vec{ع} \\ ١ & ٢ & -٢ \\ ٢ & ١ & -٣ \end{vmatrix} = -٤\vec{س} - \vec{ص} - ٣\vec{ع}$$

nezakr.nateg4dk.net

لإيجاد نقطة على خط التقاطع نضع س = ١ (مثلًا)

بالتعويض معادلة المستوى الأول ٢ص - ٢ع = صفر (١)

بالتعويض معادلة المستوى الثانى ص - ٣ع = ٣ (٢)

بحل المعادلتين (١)، (٢) نحصل على ع = $-\frac{٣}{٢}$ ، ص = $-\frac{٣}{٢}$

∴ النقطة (١ ، $-\frac{٣}{٢}$ ، $-\frac{٣}{٢}$) تقع على خط التقاطع.

معادلة خط التقاطع $\overleftarrow{ر}$ = (١ ، $-\frac{٣}{٢}$ ، $-\frac{٣}{٢}$) + ك (-٤ ، -١ ، -٣)

حاول أن تحل


(٨) أوجد معادلة خط تقاطع المستويين ٣س -ص + ٢ع = ٣ ، س - ٢ص + ٥ع = ٢

تعلم

طول العمود المرسوم من نقطة إلى مستوى

the length of the perpendicular from a point to a plane

إذا كانت أ (س١ ، ص١ ، ع١) نقطة خارج المستوى سـ وكانت ب نقطة على المستوى ، $\overleftarrow{ن}$ متجه الاتجاه العمودى على المستوى فإن بعد النقطة أ عن المستوى يساوى طول مسقط $\overrightarrow{ب أ}$ على $\overleftarrow{ن}$



$$ل = \frac{|\overrightarrow{ب أ} \cdot \overleftarrow{ن}|}{||\overleftarrow{ن}||}$$

مثال

(٩) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (١ ، -١ ، ٣) على المستوى الذى معادلته $\overleftarrow{ر}$. (٢ ، ٢ ، -١) = ٥

الحل

يجب إيجاد نقطة على المستوى ومتجه اتجاه العمودى على المستوى من معادلة المستوى $\overleftarrow{ر}$. (٢ ، ٢ ، -١) = ٥ نجد أن $\overleftarrow{ن}$ = (٢ ، ٢ ، -١)

ولإيجاد نقطة على المستوى نفرض أن المستوى يقطع محور ع فى النقطة (٠ ، ٠ ، ع)

∴ (٠ ، ٠ ، ع) • (٢ ، ٢ ، -١) = ٥ ومنها ع = -٥

∴ النقطة ب (٠ ، ٠ ، -٥) تقع على المستوى

$\overrightarrow{ب أ}$ = $\overleftarrow{أ}$ - $\overleftarrow{ب}$ = (١ ، -١ ، ٨) حيث أ (١ ، -١ ، ٣)

طول العمود (ل) = $\frac{|\overrightarrow{ب أ} \cdot \overleftarrow{ن}|}{||\overleftarrow{ن}||} = \frac{|(١ ، -١ ، ٨) \cdot (٢ ، ٢ ، -١)|}{\sqrt{(-١)^٢ + ٢^٢ + ٢^٢}} = \frac{٨}{٣}$ وحدة

nezakr.nategа4dk.net

حاول أن تحل

(٩) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (-٢ ، ١ ، ٤) على المستوى الذى معادلته $\overleftarrow{ر}$. (١ ، -٣ ، ٢) = ٤

الصورة الإحداثية لطول العمود المرسوم من نقطة على مستوى

علمت أن طول العمود المرسوم من نقطة أ (س١ ، ص١ ، ع١) على المستوى المار بالنقطة ب (س٢ ، ص٢ ، ع٢) والمتجه $\overleftarrow{ن}$ = (أ ، ب ، جـ) عمودى على المستوى يعطى بالعلاقة

$$ل = \frac{|\overleftarrow{ب أ} \cdot \overleftarrow{ن}|}{||\overleftarrow{ن}||}$$

$$\therefore ل = \frac{|(س_١ - س_٢ ، ص_١ - ص_٢ ، ع_١ - ع_٢) . (أ ، ب ، جـ)|}{\sqrt{أ^٢ + ب^٢ + جـ^٢}}$$

$$= \frac{|أس_١ + ب ص_١ + جـ ع_١ + (-أ س_٢ - ب ص_٢ - جـ ع_٢)|}{\sqrt{أ^٢ + ب^٢ + جـ^٢}}$$

∵ النقطة ب (س٢ ، ص٢ ، ع٢) تقع على المستوى أ س + ب ص + حـ ع + ء = ٠

∴ -أ س٢ - ب ص٢ - جـ ع٢ = ء

$$\therefore ل = \frac{|أس_١ + ب ص_١ + جـ ع_١ + ء|}{\sqrt{أ^٢ + ب^٢ + جـ^٢}}$$ ← الصورة الإحداثية لطول العمود

مثال

(١٠) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (١ ، ٥ ، -٤) على المستوى الذى معادلته٣س - ص + ٢ ع = ٦

الحل

$$ل = \frac{|أس_١ + ب ص_١ + جـ ع_١ + ء|}{\sqrt{أ^٢ + ب^٢ + جـ^٢}}$$

$$= \frac{|٣ (١) - (٥) + ٢ (-٤) - ٦|}{\sqrt{٣^٢ + (-١)^٢ + ٢^٢}} = \frac{١٦}{\sqrt{١٤}}$$ وحدة طول

حاول أن تحل

(١٠) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (-١ ، ٤ ، ٠) على المستوى الذى معادلته س - ٢ص - ع = ٤

مثال (المسافة بين مستويين متوازيين)

(١١) أثبت أن المستويين س + ٣ص - ٤ ع = ٣ ، ٢س + ٦ص - ٨ع = ٤ متوازيان، وأوجد البعد بينهما.

الحل

لإثبات أن المستويين متوازيان نثبت أن متجهى الاتجاه العموديين عليهما متوازيان.

$\overleftarrow{ن_١}$ = (١ ، ٣ ، -٤) ، $\overleftarrow{ن_٢}$ = (٢ ، ٦ ، -٨)

$$\therefore \frac{أ_١}{أ_٢} = \frac{١}{٢} \quad ، \quad \frac{ب_١}{ب_٢} = \frac{٣}{٦} = \frac{١}{٢} \quad ، \quad \frac{جـ_١}{جـ_٢} = \frac{-٤}{-٨} = \frac{١}{٢}$$

$$\therefore \frac{أ_١}{أ_٢} = \frac{ب_١}{ب_٢} = \frac{جـ_١}{جـ_٢}$$ ∴ المستويان متوازيان

nezakr.nateg4dk.net

لإيجاد المسافة بينهما نوجد نقطة على إحداهما، ثم نوجد طول العمود المرسوم من هذه النقطة إلى المستوى الآخر.

لإيجاد نقطة على المستوى الأول نفرض س = ٠ ، ص = ٠

بالتعويض فى معادلة المستوى الأول ∴ ع = $\frac{-٣}{٤}$

∴ النقطة (٠ ، ٠ ، $\frac{-٣}{٤}$) تقع على المستوى الأول

ويكون طول العمود المرسوم منها للمستوى الثانى هو ل حيث

ل = $\frac{|٢(٠)+٦(٠)-٨(\frac{-٣}{٤})-٤|}{\sqrt{٢^٢+٦^٢+(-٨)^٢}}$ = $\frac{١}{\sqrt{٢٦}}$ وحدة طول

حاول أن تحل

(١١) أثبت أن المستويين ٣س + ٦ص + ٦ع = ٤ ، س + ٢ص + ٢ع = ١ متوازيان، وأوجد البعد بينهما.

تعلم

معادلة المستوى باستخدام الأجزاء المقطوعة من محاور الإحداثيات

إذا قطع المستوى محاور الإحداثيات فى النقط (س١ ، ٠ ، ٠) ، (٠ ، ص١ ، ٠) (٠ ، ٠ ، ع١) فإن معادلة المستوى تكون على الصورة

$\frac{س}{س_١}+\frac{ص}{ص_١}+\frac{ع}{ع_١}=١$ ⟵ معادلة المستوى بدلالة الأجزاء المقطوعة من محاور الإحداثيات

استعن بمدرسك لإثبات الصورة السابقة لمعادلة المستوى.

مثال

(١٢) أوجد معادلة المستوى الذى يقطع من محاور الإحداثيات س ، ص ، ع الأجزاء ٢ ، -٣ ، ٥ على الترتيب.

الحل

معادلة المستوى هى $\frac{س}{س_١}+\frac{ص}{ص_١}+\frac{ع}{ع_١}=١$

أى $\frac{س}{٢}+\frac{ص}{-٣}+\frac{ع}{٥}=١$

حاول أن تحل

(١٢) أوجد الأجزاء التى يقطعها المستوى ٢س + ٣ص - ع = ٦ من محاور الإحداثيات.

تفكير ناقد:

إذا قطع المستوى ٣س + ٢ص + ٤ع = ١٢ محاور الإحداثيات س ، ص ، ع فى النقط أ ، ب ، جـ على الترتيب .

احسب مساحة المثلث أ ب جـ

nezakr.nateg4dk.net

تمـارين (٤ - ٢)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

(١) أى من النقط تقع فى المستوى ٢ س + ٣ ص - ع = ٥

أ (١، ١، ١)　　ب (١، ٢، ٠)

جـ (٠، ٢، ١)　　د (٣، ٢، -١)

(٢) المستوى ٣س - ٢ص + ٤ ع = ١٢ يقطع من محور س جزء طوله

أ ٣　　ب -٤

جـ ٤　　د ٦

(٣) إذا كانت الأجزاء المقطوعة من محاور الإحداثيات بواسطة المستوى س + ٥ ص - ٦ ع = ٣٠ هى أ ، ب ، حـ فإن أ + ب + جـ =

أ صفر　　ب ٣٠

جـ ٣١　　د ٤١

(٤) معادلة المستوى المار بالنقط (١ ، ٢ ، ٣) ويوازى محورى الإحداثيات س ، ص هى

أ س + ص = ٣　　ب ع = ٣

جـ س = ١　　د ص = ٢

(٥) معادلة المستوى المار بالنقط (٢ ، ٣ ، ٥) ، (-١ ، ٣ ، ١) ، (٤ ، ٣ ، -٢) هى

أ س + ص - ع = ٠　　ب س = -١

جـ ص = ٣　　د ع = -٢

(٦) معادلة المستوى المار بالنقطة (١ ، -٢ ، ٥) والمتجه (٢ ، ١ ، ٣) عمودى عليه هى

أ ٢س + ص + ٣ ع = ١　　ب ٢س + ص + ٣ ع = ١٥

جـ س - ٢ص + ٥ ع = ١٥　　د س + ص + ع = ٤

أجب عن الأسئلة الآتية:

(٧) أوجد الصورة المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (١ ، -١ ، ٤) والمتجه $\overrightarrow{ن}$ = (٢ ، -٣ ، ٤) عمودى عليه ثم بين:

أ هل النقطة (٢ ، ٢ ، ١) تقع فى المستوى؟

ب هل المتجه $\overrightarrow{ى}$ = (٣ ، -٥ ، -٢) يوازى المستوى؟

(٨) أوجد ثلاث نقط فى الفراغ تقع على كل من المستويات الآتية:

أ س = ٣　　ب ص = -٢

جـ س + ٣ص = ٥　　د ٢س - ص + ٣ ع = ٤

nezakr.natega4dk.net

(٩) أوجد الصورة العامة لمعادلة المستوى المار بنقطة الأصل والمتجه $\vec{ن} = \vec{س} + ٢\vec{ص} - ٣\vec{ع}$ عمودى عليه.

(١٠) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى المار بالنقطة (٢ ، -١ ، ٠) والمتجه $\vec{ن} = ٤\vec{س} + ١٠\vec{ص} - ٧\vec{ع}$ عمودى عليه.

(١١) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى المار بالثلاث نقط أ (٢ ، -١ ، ٠) ب (-١ ، ٣ ، ٤) ، جـ (٣ ، ٠ ، ٢)

(١٢) أثبت أن المستقيم $\vec{ر} = \vec{ع} + ك(٢\vec{س} + ٣\vec{ص} + ٤\vec{ع})$ عمودى على المستوى $س + \frac{٣}{٢}ص + ٢ع = ٥$

(١٣) أثبت أن النقطة أ (٢ ، ٣ ، ١) والمستقيم ل: $\vec{ر} = (٣\vec{س} + \vec{ص} + ٣\vec{ع}) + ك(\vec{س} - ٢\vec{ص} + ٢\vec{ع})$ يقعان فى المستوى الذى معادلته $\vec{ر} . (٢\vec{س} - \vec{ع}) = ٣$

(١٤) أوجد معادلة المستوى الذى يمر بالنقطة (٢ ، ١ ، ٤) ويحقق كلًّا من الشروط الآتية:

أ يوازى المستوى ٢س + ٣ص + ٥ع = ١


ب عمودى على المستقيم المار بالنقطتين (٣ ، ٢ ، ٥) ، (١ ، ٦ ، ٤)

جـ عمودى على كل من المستويين ٧ س + ص + ٢ع = ٦ ، ٣س + ٥ص - ٦ع = ٨

(١٥) أوجد إحداثيات نقطة تقاطع المستقيم $\vec{ر} = \vec{ع} + ك(٢\vec{س} + \vec{ص} + \vec{ع})$ مع المستوى $\vec{ر} . \vec{س} = ٤$

(١٦) أوجد الصور المختلفة لمعادلة المستوى الذى يقطع من محاور الإحداثيات س ، ص ، ع الأجزاء ٢ ، ٤ ، ٥ على الترتيب.

(١٧) **الربط بالبيئة:** فى الشكل المقابل. أوجد معادلة كل من



أ مستوى أرضية الحجرة.

ب مستوى سقف الحجرة.

جـ مستويات الحوائط الجانبية.

(١٨) أوجد معادلة المستوى الذى يحتوى المستقيم ل١: $\vec{ر} = (٠ ، ٣ ، -٥) + ك_١(٦ ، -٢ ، -١)$ ويوازى المستقيم ل٢ : $\vec{ر} = (١ ، ٧ ، -٤) + ك_٢(١ ، -٣ ، ٣)$

(١٩) أوجد قياس الزاوية بين كل زوج من المستويات الآتية:

أ ل١ : ٢س - ص + ع = ٥ ، ل٢: ٣س + ٢ص - ٢ع = ١

ب ل١: $\vec{ر} . (٢ ، ١ ، -١) = ٤$ ، ل٢: $\vec{ر} . (٣ ، -٢ ، ٠) = ٧$

جـ ل١ : ص = ٤ ، ل٢: س - ٣ص + ٥ع = ١

nezakr.nategа4dk.net

أسئلة متعددة المطالب

(٢٠) إذا كانت النقط أ ، ب ، جـ ، ء فى الفراغ متجهات موضعها بالنسبة لنقطة الأصل هى
$-ص + ع$ ، $٢س - ص + ٣ع$ ، $-س - ٢ص + ٢ع$ ، $٧س - ٤ص + ٢ع$ على الترتيب

(أ) أوجد متجه الاتجاه العمودى على المستوى أ ب جـ

(ب) بين طول العمود المرسوم من ء على مستوى أ ب جـ يساوى $٢\sqrt{٦}$

(جـ) بين أن المستويين أ ب جـ ، ء ب جـ متعامدان.

(د) أوجد معادلة خط تقاطع المستويين أ ب حـ ، و ء ب

(٢١) إذا كان المستوى س يحوى النقط أ (١ ، ٤ ، ٢) ب (١ ، ٠ ، ٥)، جـ (٠ ، ٨ ، -١) وكان المستوى ص يحوى النقطة ء (٢ ، ٢ ، ٣) والمتجه $ن = س + ٢ص + ٢ع$ عمودى عليه أوجد:

(أ) المعادلة الإحداثية للمستوى س (ب) المعادلة الإحداثية للمستوى ص

(جـ) إذا كانت النقطة (ط ، ٠ ، ف) تقع فى كل من المستويين س ، ص فما قيمة كل من ط ، ف

(د) أوجد الصورة المتجهة لخط تقاطع المستويين س ، ص

(هـ) إذا كانت النقطة (١ ، ١، ق) على أبعاد متساوية من المستويين س ، ص أوجد قيم ق الممكنة.

nezakr.natega4dk.net

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

ثانيًا: التفاضل والتكامل

nezakr.natega4dk.net



متطلبات قبلية في التفاضل والتكامل

اشتقاق مقلوبات الدوال المثلثية

١ - مشتقة دالة ظل التمام


إذا كانت ص = ظتا س حيث س ∈ ع ، س ≠ ن π ، ن ∈ صـ

فإن : $\frac{د}{د س}$ (ظتا س) = - قتا^{٢} س

لاحظ أن :

$$\frac{د ص}{د س} = \frac{د}{د س}\left(\frac{١}{ظا س}\right) = \frac{د}{د س}\left[\frac{جتا س}{جا س}\right]$$

$$= \frac{جا س \times - جا س - جتا س \times جتا س}{(جا س)^{٢}} = - \frac{١}{(جاس)^{٢}} = - قتا^{٢} س$$



ص = ظتا س


٢ - مشتقة دالة القاطع

إذا كانت ص = قا س حيث :

س ∈ ع ، س ≠ $\frac{π(٢ن + ١)}{٢}$ ، ن ∈ صـ

فإن:

$\frac{د}{د س}$ (قاس) = قا س ظا س (تحقق من ذلك)




ص = قا س

٣ - مشتقة دالة قاطع التمام :

إذا كانت ص = قتا س حيث

س ∈ ع ، س ≠ ن π ، ن ∈ صـ

فإن : $\frac{د}{د س}$ (قتا س) = - قتا س ظتا س تحقق من ذلك



ص = قتا س

nezakr.natega4dk.net

مثال

(١) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = ٣ س^{٥} + ٤ ظتا س

(ب) ص = ٣ قا س - ٥ ظا س

(جـ) ص = س^{٣} قتا س

الحل

(أ) $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ × ٥س^{٤} + ٤ (- قتا^{٢} س) = ١٥ س^{٤} - ٤ قتا^{٢}س

(ب) $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ (قا س ظا س) - ٥ قا^{٢}س = قاس [٣ ظا س - ٥ قا س]

(جـ) $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ س^{٢} قتا س + س^{٣} (- قتا س ظتا س) = س^{٢} قتاس [٣ - س ظتا س]

تكامل الدوال المثلثية

جدول التكاملات المثلثية الأساسية
∫ جا س د س = - جتا س + ث
∫ جتا س د س = جا س + ث
∫ قا^{٢} س د س = طا س + ث س ≠ $\frac{٢ن + ١}{٢}\pi$ ، ن ∈ صـ
∫ قتا^{٢} س د س = - ظتا س + ث س ≠ ن π ، ن ∈ صـ
∫ قا س طا س د س = قا س + ث س ≠ $\frac{٢ن + ١}{٢}\pi$ ، ن ∈ صـ
∫ قتا س ظتا س د س = - قتا س + ث س ≠ ن π ، ن ∈ صـ

nezakr.nafega4dk.net



الوحدة الأولى

الاشتقاق وتطبيقاته

Differentiation and it's Applications

مقدمة الوحدة

فى دراستك السابقة للدوال، تعرَّفتَ على دوال صريحة فى متغير واحد على الصورة ص = د(س) والعمليات على هذه الدوال وتركيبها، كما بحثتَ قابلية اشتقاق الدالة المتصلة على مجال ما، وأمكنك إيجاد المشتقة الأولى للدوال الجبرية و الدوال المثلثية.

فى هذه الوحدة سنتعرف دوال أخرى لا يمكن فصل متغيراتها، حيث ترتبط المتغيرات بعلاقة ضمنية أو بتعريفها من خلال متغير وسيط يعرف بالمتغير البارامترى؛ مما يتطلب دراسة أنماط أخرى للاشتقاق، مثل الاشتقاق الضمنى، والاشتقاق البارمترى الذى يعتمد على مشتقة دالة الدالة (قاعدة السلسلة) فى اشتقاق الدوال، كما نبحث وجود مشتقة مشتقة الدالة (المشتقة الثانية للدالة) فى إطار دراسة المشتقات العليا للدالة والتى تفسح المجال لدراسة تطبيقات حياتية متعددة.

كما تهتم هذه الوحدة ببعض التطبيقات المهمة للاشتقاق فى مجالات متعددة للرياضيات والفيزياء والاقتصاد والعلوم البيولوجية من خلال دراسة المعدلات الزمنية المرتبطة لتساعدك على نمذجة وحل بعض المشكلات الحياتية التى قد تصادفك.

مخرجات التعلم

فى نهاية الوحدة وبعد تنفيذ الأنشطة من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يوجد الاشتقاق لدوال ضمنية (صريحة ، ضمنية ، بارامترية...).
- يوجد المشتقات العليا (الثانية والثالثة) لدوال مختلفة ويتعرف طريقة التعبير عنها .
- يوجد مشتقة الدالة الأسية ص = هـ س، ص = أ س
- يوجد مشتقة الدالة اللوغاريتميه ص = لو هـ س، ص = لو أ س.
- يوجد المعدلات الزمنية المرتبطة متضمنة التطبيقات الفيزيائية.
- ينمذج ويحل مشكلات حياتية واقتصادية.

المصطلحات الأساسية

الاشتقاق(التفاضل)	*Differentiation*	مشتقات عليا	*Higher Derivatives*
المشتقة الأولى	*First Derivative*	معدل	*Rate*
دالة صريحة	*Explicit Function*	معدلات مرتبطة	*Related Rates*
دالة ضمنية	*Implicit function*		
وسيط (بارامتر)	*Parameter*		
اشتقاق ضمنى	*Implicit Defferentiation*		
اشتقاق بارامترى	*Parametric Defferentiation*		

دروس الوحدة

الدرس (١ - ١): الاشتقاق الضمنى والبارامترى

الدرس (١ - ٢): المشتقات العليا للدالة


الدرس (١ - ٣): مشتقات الدوال الأسية واللوغاريتمية

الدرس (١ - ٤): المعدلات الزمنية المرتبطة

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة رسومية
- حاسب آلى مزود ببرامج رسومية (*Geogebra, Graph*)

مخطط تنظيمى للوحدة



nezakr.natega4dk.net



١-١ الاشتقاق الضمنى والبارامترى

Implicit and Parametric Defferentiation

سوف تتعلم

- الاشتقاق الضمنى
- الاشتقاق البارامترى

المصطلحات الأساسية

- علاقة Relation
- دالة صريحة Explicit function
- دالة ضمنية Implicit function
- وسيط Parameter

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.

Scientific calculator

الاشتقاق الضمنى Implicit Defferentiation

سبق لك إيجاد مشتقة دالة معرفة بالصورة ص = د(س) وهى دالة صريحة explicit function للمتغير المستقل س حيث تحدد قيمة ص مباشرة متى علم قيمة س مثل :

ص = ٤س^{٣} - ٥س + ٢ ، ص = جا (٢ س + ٣) ، ص = $\frac{س + ١}{س - ١}$ ، ...

ويكون ص$'$ = ١٢ س^{٢} - ٥ ، ص$'$ = ٢ جتا (٢ س + ٣) ، ص$'$ = ...

أما إذا كانت ص مرتبطة بالمتغير س بمعادلة تحوى س ، ص معًا مثل:

س ص + ص - ٤ = ٠ (١) ، س^{٢} + ص^{٢} - ٩ = ٠ (٢)

فكل معادلة تعرف علاقة ضمنية implicit relation بين س ، ص؛ تعبر عن العلاقة بين إحداثيي نقطة (س ، ص) واقعة على منحناها البياني.


لاحظ أن :

١- يمكن كتابة المعادلة س ص + ص - ٤ = ٠ بالصورة:

ص (س + ١) = ٤ ∴ ص = $\frac{٤}{س + ١}$ حيث س ≠ -١


وفى هذه الحالة تعرف العلاقة الضمنية دالة واحدة صريحة.

٢- مجموعة النقط (س ، ص) التى تحقق المعادلة س^{٢} + ص^{٢} = ٩ ترسم دائرة مركزها نقطة الأصل وطول نصف قطرها ٣ وحدات، ومن اختبار الخط الرأسى نلاحظ أن العلاقة س^{٢} + ص^{٢} = ٩ لا تمثل دالة غير أن ص^{٢} = ٩ - س^{٢}




∴ ص = ± $\sqrt{٩ - س^{٢}}$

فيمكن أن تعرِفُ العلاقة الضمنية س^{٢} + ص^{٢} = ٩ دالتين صريحتين الأولى ص = $\sqrt{٩ - س^{٢}}$ مجالها [-٣ ، ٣] ومداها [٠ ، ٣] وقابلة للاشتقاق لكل س ∈]-٣ ، ٣[



nezakr.nategа4dk.net



والثانية : ص = $-\sqrt{٩-س^{٢}}$

مجالها [-٣، ٣] ومداها [-٣، ٠]

وقابلة للاشتقاق لكل س ∈]-٣ ، ٣[

فى كثير من المعادلات على الصورة د(س، ص) = ٠ يصعب التعبير عن ص بدلالة س مباشرة؛ لأن المتغير ص لا يمثل دالة صريحة بالنسبة إلى س ، تسمى هذه الدالة غير الصريحة بالدالة الضمنية implicit function

عملية اشتقاق الدالة الضمنية (الاشتقاق الضمنى) يتطلب اشتقاق كل من طرفى المعادلة بالنسبة إلى أحد المتغيرين س أو ص وفقًا لقاعدة السلسلة لتحصل على $\frac{ء ص}{ء س}$ أو $\frac{ء س}{ء ص}$ على الترتيب.

مثال

(١) أوجد $\frac{ء ص}{ء س}$ إذا كان:

(أ) $س^{٣} + ص^{٢} - ٧ س + ٥ ص = ٨$

(ب) $٣ س ص + ص^{٢} = س^{٢} - ٧$

الحل

(أ)

لاحظ أن المعادلة لا تعطى ص صراحة بدلالة س، لإيجاد $\frac{ء ص}{ء س}$ نشتق طرفى المعادلة بالنسبة إلى س مع مراعاة أن ص دالة للمتغير س وقابلة للاشتقاق فيكون:

$٣س^{٢} + ٢ص \frac{ء ص}{ء س} - ٧ \frac{ء ص}{ء س} + ٥ \frac{ء ص}{ء س} = ٠$

$\frac{ء ص}{ء س}(٢ص + ٥) = ٧ - ٣ س^{٢}$

$\therefore \frac{ء ص}{ء س} = \frac{٧ - ٣س^{٢}}{٢ص + ٥}$

تذكر أن

إذا كانت ص دالة فى س وقابلة للاشتقاق فإن:

$\frac{ء}{ء س}(ص)^{ن}$

$= ن ص^{ن-١} \frac{ء ص}{ء س}$

(ب) $\because ٣ س ص + ص^{٢} = س^{٢} - ٧$ باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة إلى س.

$\therefore \frac{ء}{ء س}(٣س ص) + ٢ ص \frac{ء ص}{ء س} = ٢ س$

$٣س \frac{ء ص}{ء س} + ص \times ٣ + ٢ ص \frac{ء ص}{ء س} = ٢ س$

$\frac{ء ص}{ء س}[٣س + ٢ ص] = ٢ س - ٣ ص$

$\therefore \frac{ء ص}{ء س} = \frac{٢ س - ٣ ص}{٣س + ٢ص}$

حاول أن تحل

(١) أوجد $\frac{ء ص}{ء س}$ إذا كان:

(أ) $س^{٣} - ٥ س ص + ص^{٣} = ٤س$

(ب) $س^{٢} ص + ص^{٢} س = ٢٥$

مثال

(٢) أوجد $\frac{ء ص}{ء س}$ إذا كان:

(أ) جا ٢ ص = ص جتا ٣ س

(ب) ظا٢ س + ظتا ص = س ص

nezakr.natega4dk.net

الحل

(أ) باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة إلى س

$\therefore \frac{د}{د س}(\text{جا } ٢ ص) = \frac{د}{د س}(\text{ص جتا } ٣ س)$

$\text{جتا } ٢ ص \times ٢ \frac{د ص}{د س} = ص [- \text{جا } ٣ س \times ٣] + \text{جتا } ٣ س [\frac{د ص}{د س}]$

$\frac{د ص}{د س} [٢ \text{جتا } ٢ ص - \text{جتا } ٣ س] = - ٣ ص \text{ جا } ٣ س$ $\quad \therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{٣ ص \text{ جا } ٣ س}{\text{جتا } ٣ س - ٢ \text{ جتا } ٢ ص}$

(ب) باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة إلى س

$\frac{د}{د س}(\text{طا } ٢ س) + \frac{د}{د س}(\text{ظتا ص}) = \frac{د}{د س}(\text{س ص})$

$٢ \text{ قا}^٢ ٢ س - \text{قتا}^٢ ص \frac{د ص}{د س} = س \frac{د ص}{د س} + ص$

$\frac{د ص}{د س} [س + \text{قتا}^٢ ص] = ٢ \text{قا}^٢ ٢ س - ص$ $\quad \therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{٢ \text{قا}^٢ ٢ س - ص}{س + \text{قتا}^٢ ص}$

حاول أن تحل

(٢) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ إذا كان:

(أ) س جتا ص + ص جتا س = ١ (ب) ٣ ص = جا س جتا ٢ ص

لاحظ أن: الصيغة النهائية للمشتقة $\frac{د ص}{د س}$ فى الاشتقاق الضمنى تحوى كلًّا من س ، ص مما يجعل حسابها شاقًّا عند إحدى قيم س لحاجتنا أولاً لمعرفة قيمة ص المناظرة لها والتى يصعب تحديدها من العلاقة الضمنية.

الاشتقاق البارامترى

Parametric Defferentiation

إذا أمكن التعبير عن كل من الإحداثى السينى ، والاحداثى الصادى للنقطة (س ، ص) كدالة فى متغير ثالث ن (يسمى الوسيط أو البارامتر) بالمعادلتين:

س = د(ن) ، ص = ر(ن) حيث د ، ر لهما مجال مشترك

فإن المعادلتين معًا تمثلان معادلة لمنحنى واحد معبرًا عنه بالصورة البارامترية

تعلم

للمنحنى المعطى على الصورة البارامترية س = د(ن) ، ص = ر(ن)

يكون $\frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د ن} \times \frac{د ن}{د س} = \frac{د ص}{د ن} \div \frac{د س}{د ن}$ حيث د ، ر دالتان قابلتان للاشتقاق بالنسبة إلى ن.

مثال

(٣) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ للمنحنيات الآتية عند القيم المعطاة:

(أ) س = ٥ ن + ٣ ، ص = ١٦ ن^٢ + ٩ ، ن = ٥ (ب) س = ٣ جتا ٢θ ، ص = ٤ جا ٣θ ، $\theta = \frac{\pi}{٤}$

nezakr.nategа4dk.net

الحل

أ $س = ٥ن + ٣$ ، $\frac{د س}{د ن} = ٥$ ، $ص = ١٦ن^{٢} + ٩$ $\frac{د ص}{د ن} = ٣٢ن$

$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د ن} \times \frac{د ن}{د س} = \frac{٣٢ن}{٥}$ ويكون $\left[\frac{د ص}{د س}\right]_{ن=٥} = ٣٢$

ب $س = ٣ جتا ٢\theta$ $\frac{د س}{د \theta} = ٣ \times -جا ٢\theta \times ٢ = -٦ جا ٢\theta$

$ص = ٤ جا ٣\theta$ $\frac{د ص}{د \theta} = ٤ \times جتا ٣\theta \times ٣ = ١٢ جتا ٣\theta$

$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د \theta} \times \frac{د \theta}{د س} = \frac{١٢ جتا ٣\theta}{-٦ جا ٢\theta} = \frac{-٢ جتا ٣\theta}{جا ٢\theta}$

عند $\theta = \frac{\pi}{٤}$ فإن $\frac{د ص}{د س} = \frac{-٢ جتا \frac{٣\pi}{٤}}{جا \frac{\pi}{٢}} = -٢ \times \frac{-١}{\sqrt{٢}} = \sqrt{٢}$

حاول أن تحل

(٣) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ للمنحنيات الآتية عند القيم المعطاة

أ $س = (ن + ٧)(ن - ٢)$ ، $ص = (ن^{٢} + ١)(ن - ٢)$ ، $ن = ١$.

ب $س = قا^{٢}\theta - ١$ ، $ص = ظا\theta$ ، $\theta = \frac{-٣\pi}{٤}$ جـ $س = \sqrt{٣ن - ٢}$ ، $ص = \sqrt{٤ن + ١}$ ، $ن = ٢$

تفكير ناقد: أوجد قيمة البارامتر ع التى يكون عندها للمنحنى

$س = ٢ع^{٣} - ٥ع^{٢} - ٤ع + ١٢$ ، $ص = ٢ع^{٢} + ع - ٤$ مماس أفقى وآخر رأسى.

مثال

(٤) أوجد مشتقة $(٤س^{٣} - ٩س^{٢} + ٥)$ بالنسبة إلى $(٣س^{٢} + ٧)$

الحل

بوضع $ص = ٤س^{٣} - ٩س^{٢} + ٥$ ، $ع = ٣س^{٢} + ٧$ فتكون $ص = د(س)$، $ع = ر(س)$

الدالتان د، ر قابلتان للاشتقاق بالنسبة إلى س باعتبار س بارامتر لكل من المتغيرين ص ، ع

∴ من الاشتقاق البارامترى نجد أن:

$\frac{د ص}{د ع} = \frac{ص'}{ع'} = \frac{١٢س^{٢} - ١٨س}{٦س} = ٢س - ٣$ أى أن $\frac{د}{د(٣س^{٢} + ٧)}[٤س^{٣} - ٩س^{٢} + ٥] = ٢س - ٣$

حاول أن تحل

(٤) باستخدام الاشتقاق البارامترى أوجد:

أ مشتقة $س^{٢} + ١$ بالنسبة إلى $\sqrt{س^{٢} - ١}$

ب مشتقة $\sqrt{٨ + س^{٣}}$ بالنسبة إلى $\frac{س}{س + ١}$ عند $س = ١$

جـ مشتقة $س - جا س$ بالنسبة إلى $١ - جتا س$ عند $س = \frac{\pi}{٣}$

nezakr.natega4dk.net

تمـارين الدرس (١ - ١)

أولًا: أختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) إذا كانت $س^{٢} + ص^{٢} = ١$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ يساوى:

(أ) $س$ (ب) $\frac{١}{ص}$ (جـ) $-\frac{س}{ص}$ (د) $-\frac{ص}{س}$

(٢) إذا كانت $س^{٢} + ص^{٢} = ٢ س ص$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ يساوى:

(أ) -١ (ب) صفر (جـ) ١ (د) ٢

(٣) إذا كانت $ص^{٢} - ٢\sqrt{س} = ٠$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ يساوى:

(أ) $\frac{٢ص}{\sqrt{س}}$ (ب) $\sqrt{س}$ (جـ) $\frac{س}{ص^{٣}}$ (د) $\frac{١}{ص^{٣}}$

(٤) إذا كان $س = ٢ن^{٢} + ٣$ ، $ص = \sqrt[٣]{ن}$ ، $ن = ١$ فإن $\frac{د ص}{د س}$ يساوى:

(أ) $\frac{٣}{٨}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$ (جـ) ٢ (د) ٦

(٥) ميل المماس للمنحنى $س ص^{٢} = ٣$ عند النقطة $(٣ ، ١)$ يساوى:

(أ) -٣ (ب) $-\frac{١}{٦}$ (جـ) $\frac{١}{٣}$ (د) $\frac{٣}{٢}$

ثانيًا: أوجد $\frac{د ص}{د س}$ في كل مما يأتى:

(٦) $س^{٢} - ٤ص^{٢} + ٧ = ٠$ (٧) $س^{٤} + ٣ص^{٤} - ٢ = ٠$ (٨) $س^{٢} - ٢ س ص = ٥ - ص^{٢}$

(٩) $س^{٣} + ٦ س ص = ٤ ص + ٣$ (١٠) $\frac{س}{ص} + \frac{ص}{س} = أ$ (١١) $س ص + جا ص = ٥$

(١٢) $س جا ص + ص جتا س = ٠$ (١٣) $س ظتا ص = ص ظتا س$ (١٤) $س^{٢} جا ص - ص^{٢} جا س = ٩$

(١٥) $جا ٢ س جتا ٢ ص = \frac{٣}{٤}$

ثالثًا: أوجد $\frac{د ص}{د س}$ للمنحنيات الآتية عند القيم المعطاة:

(١٦) $س = ١٣ - ٢ ن$ ، $ص = ٤ \sqrt{ن^{٢} - ن}$ ، $ن = ٤$

(١٧) $س = جا ٢\pi\theta$ ، $ص = جتا ٢\pi\theta$ ، $\theta = \frac{١}{٦}$

(١٨) $س = ٥ + قا^{٢} ٣\theta$ ، $ص = ١ - ظا ٣\theta$ ، $\theta = \frac{\pi}{٤}$

(١٩) أوجد ميل المماس للمنحنى $جتا \sqrt{\pi ص} = ٣ س + ١$ عند النقطة $(-\frac{١}{٣} ، \frac{\pi}{٤})$

(٢٠) أوجد مشتقة $\frac{س + ١}{س - ١}$ بالنسبة إلى $\sqrt{٢ س + ١}$ عند $س = ٤$

(٢١) أوجد قيمة البارامتر ن التى عندها يكون للمنحنى $س = ٢ن^{٣} - ٥ن^{٢} + ٤ ن - ٩$ ، $ص = ٢ن^{٢} + ن - ٥$

(أ) مماس رأسى. (ب) مماس أفقى.

nezakr.natega4dk.net



١ - ٢ المشتقات العليا للدالة

Higher Derivatives of a Function

سوف تتعلم

- إيجاد مشتقات ذات رتب أعلى لدالة.

المصطلحات الأساسية

- رتبة Order
- مشتقة Derivative

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية. Scientific calculator

فكر و ناقش

إذا كانت ص = د(س) حيث ص = س^{٤} + ٥س^{٣} - ٢س + ٣ أوجد مشتقة الدالة د،

هل يمكنك تكرار عملية الاشتقاق بالنسبة إلى س ؟ لماذا؟

هل تتوقف عملية الاشتقاق؟ فسر إجابتك.

تعلم

المشتقات ذات الرتب العليا (Higher - Order Derivative)

- **إذا كانت** ص = د(س) حيث د دالة قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى س فإن مشتقتها الأولى (First derivative) هى ص$'$ = $\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}$ = د$'$(س) وتمثل دالة جديدة.
- **وإذا كانت** المشتقة الأولى قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى س فإن مشتقتها $\frac{\text{د}}{\text{د س}}\left(\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}\right)$ تسمى المشتقة الثانية (Second Derivative) للدالة د وتمثل دالة أخرى ويُرمز لها بالرمز ص$''$ = $\frac{\text{د}^{٢}\text{ص}}{\text{د س}^{٢}}$ = د$''$ (س)
- بتكرار عملية الاشتقاق نحصل على المشتقة الثالثة (Third Derivative) للدالة د ونرمز لها بالرمز $\frac{\text{د}^{٣}\text{ص}}{\text{د س}^{٣}}$ ، ... وهكذا

تسمى المشتقات لدالة بدءًا من المشتقة الثانية بالمشتقات العليا، وتكتب المشتقة من الرتبة ن كما يلى :

ص$^{(ن)}$ = $\frac{\text{د}^{ن}\text{ص}}{\text{د س}^{ن}}$ = د$^{(ن)}$ (س) حيث ن عدد صحيح موجب

لاحظ أن :

١- $\frac{\text{د}^{٢}\text{ص}}{\text{د س}^{٢}}$ تقرأ دال اثنين ص دال س اثنين

٢- يوجد اختلاف بين $\frac{\text{د}^{٢}\text{ص}}{\text{د س}^{٢}}$ ، $\left(\frac{\text{د ص}}{\text{د س}}\right)^{٢}$ فالأولى تدل على المشتقة الثانية للدالة بينما الثانية تدل على مربع المشتقة الأولى.

مثال

(١) أوجد المشتقة الثانية لكل من:

(أ) ص = ٢س^{٤} + ٣ س - ٥

(ب) ص = $\frac{\text{س} + ١}{\text{س} - ١}$

(جـ) ص = جا (٣ س - ٢)

(د) ص = $\sqrt{٣\text{س} - ٢}$

nezakr.natega4dk.net



الحل

أ ∵ ص = ٢س^{٤} + ٣س - ٥ ، س ∈ ع ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٨س^{٣} + ٣ ، $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = ٢٤ س^{٢}

ب ∵ ص = $\frac{س + ١}{س - ١}$ ، س ≠ ١ ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{س - ١ - (س + ١)}{(س - ١)^{٢}}$ = $\frac{- ٢}{(س - ١)^{٢}}$ ، س ≠ ١

$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = $\frac{د}{د س}$ [- ٢ (س - ١)$^{- ٢}$] = $\frac{٤}{(س - ١)^{٣}}$ ، س ≠ ١

ج ∵ ص = جا (٣س - ٢) ، س ∈ ع ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ جتا (٣ س - ٢) ، $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = - ٩ جا (٣س - ٢)

د ∵ ص = $\sqrt{٣س - ٢}$ ، س ≤ $\frac{٢}{٣}$ ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{٣}{٢\sqrt{٣س - ٢}}$ ، س < $\frac{٢}{٣}$

$\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = $\frac{د}{د س}$ [$\frac{٣}{٢}$ (٣س - ٢)$^{- \frac{١}{٢}}$] = - $\frac{٩}{٤\sqrt{(٣س - ٢)^{٣}}}$ ، س < $\frac{٢}{٣}$

حاول أن تحل

(١) أوجد المشتقة الثالثة لكل من:

أ ص = س^{٤} - ٢ س^{٢} + ٥ ب ع = (٢ ن - ١)^{٤}

ج د(س) = جتا (٢ س + π) د د(س) = $\frac{س}{س - ١}$

تفكير ناقد: إذا كانت ص = جا أ س استكشف نمط الاشتقاق المتتالى، أوجد ص$^{(٢٥)}$

مثال

(٢) إذا كانت ص^{٢} + ٢ س ص = ٨ أثبت أن: (س + ص) $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + ٢ $\frac{د ص}{د س}$ + $(\frac{د ص}{د س})^{٢}$ = صفر

الحل

أ ∵ ص^{٢} + ٢ س ص = ٨ ، باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى س

∴ ٢ ص $\frac{د ص}{د س}$ + ٢س $\frac{د ص}{د س}$ + ٢ص = ٠ بالقسمة على ٢

(س + ص) $\frac{د ص}{د س}$ + ص = ٠ باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى س

∴ (س + ص) $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + $\frac{د ص}{د س}$ (١ + $\frac{د ص}{د س}$) + $\frac{د ص}{د س}$ = ٠

ويكون (س + ص) $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + ٢ $\frac{د ص}{د س}$ + $(\frac{د ص}{د س})^{٢}$ = صفر

حاول أن تحل

(٢) أ إذا كانت س^{٢} + ص^{٢} = ٩ أثبت أن: ص $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ + $(\frac{د ص}{د س})^{٢}$ + ١ = ٠

ب إذا كانت ص = طا س أثبت أن: $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ = ٢ ص (١ + ص^{٢})

nezakr.nategа4dk.net

معادلات بارامترية

مثال

(٣) إذا كانت س = ٢ن^{٣} - ٥ ، ص = ٦ن^{٢} + ١ أوجد $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ عند ن = ١

الحل

باشتقاق كل من س ، ص بالنسبة للبارامتر ن

$\therefore \frac{د س}{د ن} = ٦ن^{٢}$ ، $\frac{د ص}{د ن} = ١٢ ن$

$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{د ص}{د ن} \times \frac{د ن}{د س}$

$\therefore \frac{د ص}{د س} = \frac{١٢ن}{٦ن^{٣}} = ٢ن^{-١}$ ، ن ≠ ٠

ويكون $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}} = \frac{د}{د س}[٢ن^{-١}] = -٢ن^{-٢} \times \frac{د ن}{د س}$

$= \frac{-٢}{ن^{٢}} \times \frac{١}{٦ن^{٢}} = -\frac{١}{٣ن^{٤}}$ ، ن ≠ ٠


عند ن = ١ $\therefore \frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}} = -\frac{١}{٣}$

حاول أن تحل

(٣) إذا كانت س = ع^{٢} - ٢ع ، ص = ع^{٢}

أوجد $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ ، $\frac{د^{٣}ص}{د س^{٣}}$ عند ع = ٢

تفكير ناقد: يبين الشكل المقابل تمثيلاً بيانيًّا لمنحنيات الدوال د(س)، د′(س) ، د″(س) حيث د(س) كثيرة حدود، حدد منحنى كل دالة.



نشاط

باستخدام البرنامج الرسومى geogebra أو أى برنامج آخر ارسم الدوال التالية ومشتقاتها الأولى والثانية وسجل ملاحظاتك.

(أ) د(س) = س^{٣} - ٤ س^{٢} + ١٢ (ب) ر(س) = $\frac{١}{٤}$ س^{٢} + ٤

هل تتوافق ملاحظاتك مع قرارك في بند تفكير ناقد؟

nezakr.natega4dk.net

تمـارين ١ - ٢

أوجد المشتقة الثالثة لكلًا مما يأتى:

(١) ص = س^{٥} - ٤س^{٣} + ٣

(٢) ص = $\frac{٢س}{س + ١}$

(٣) ص = جا (٢ س - ٧)

(٤) ص = جتا (π - ٣ س)

(٥) ص = جا س جتا س

(٦) ص = $\sqrt{٢ س - ٥}$

أجب عمَّا يأتي:

(٧) إذا كان ٣س^{٢} + ٥ = ٢ س ص

أثبت أن: س $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ + ٢ $\frac{د ص}{د س}$ = ٣

(٨) إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٤

أثبت أن: ص^{٣} $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ + ٤ = صفر

(٩) إذا كان ص = ٣ جتا (٢ س + ١)

أثبت أن: $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ + ٤ ص = ٠

(١٠) إذا كان س ص = جا س جتا س

أثبت أن: س $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ + ٢ $\frac{د ص}{د س}$ + ٤ س ص = ٠

(١١) إذا كان ص = س جا س

أثبت أن: س $\frac{د^{٣}ص}{د س^{٣}}$ + س $\frac{د ص}{د س}$ + ٢ ص = ٠

(١٢) إذا كان ص = قا س

أثبت أن: ص $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ + ($\frac{د ص}{د س}$)^{٢} = ص^{٢} (٣ص^{٢} - ٢)

(١٣) إذا كان $\frac{د ص}{د س}$ = ٢ س - ٣ ، $\frac{د ع}{د س}$ = س^{٢} - ١

أوجد: $\frac{د^{٢}ص}{د ع^{٢}}$ عند س = ٢

(١٤) إذا كان س = ٣ن^{٢} - ١ ، ص = ن^{٣} + ٢

أوجد: $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ عند ن = ٤

(١٥) إذا كان س = $\frac{ع + ١}{ع - ١}$ ، ص = $\frac{ع - ١}{ع + ١}$

أوجد: $\frac{د ص}{د س}$ عند ع = ٢

(١٦) إذا كان س = قا ع ، $\sqrt{ص}$ = ظا ع

أثبت أن: $\frac{د^{٢}ص}{د س^{٢}}$ = ٢

nezakr.natega4dk.net



١ - ٣ مشتقات الدوال الأسية واللوغارتمية

Derivatives of Exponential and Logarithmic Functions

سوف تتعلم

- مشتقات الدوال الأسية.
- مشتقات الدوال اللوغارتمية.
- التفاضل اللوغاريتمى.
- المشتقات العليا للدوال الأسية واللوغارتمية.
- نمذجة المشكلات.

المصطلحات الأساسية

- مشتقة Derivative
- قاعدة السلسلة Chain Rule
- المشتقة الأولى First Derivative
- الاشتقاق اللوغاريتمى Logarithmic Differentiation

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية

تعريف

يعرف العدد هـ من العلاقة :

$$هـ = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{١}{\lfloor ن}$$


$$هـ = ١ + \frac{١}{\lfloor ١} + \frac{١}{\lfloor ٢} + \frac{١}{\lfloor ٣} + ... \infty$$

تعلم

الدالة الأسية ذات الأساس الطبيعى

Natural Exponential Function

هى دالة أسية أساسها هـ ، د(س) = هـ^{س} ، س ∈ ع



$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow \infty} هـ^{س} = \infty ،$$

$$\text{نهـــا}_{س \leftarrow -\infty} هـ^{س} = \text{صفر}$$

لاحظ أن

١) مجال الدالة د حيث د(س) = هـ^{س} هو ع ومداها] ٠، ∞ [

٢) منحنى الدالة يمر بالنقطة (٠ ، ١) ، (١ ، هـ)

٣) د(س) = هـ^{س} دالة احادية *(One - to - One)*

تقبل وجود دالة عكسية تعرف بدالة اللوغاريتم الطبيعى

٤) نستخدم الرمز *exp (x)* عند رسم الدالة باستخدام أى برنامج رسومى

٥) $هـ^{س} = \sum_{ن=٠}^{\infty} \frac{س^{ن}}{\lfloor ن}$


$$= ١ + \frac{س}{\lfloor ١} + \frac{س^{٢}}{\lfloor ٢} + \frac{س^{٣}}{\lfloor ٣} + ... \infty$$

نتيجة نت
nezakr.nateega4dk.net

دالة اللوغاريتم الطبيعى

Natural Logarithm Function

هى لوغاريتمية أساسها هـ ، د(س) = لو$_{هـ}$ س ، س ∈ ع$^{+}$



نهـــا لو$_{هـ}$ س = ∞ ،
س←∞

نهـــا لو$_{هـ}$ س = -∞
س←٠

لاحظ أن:

١) مجال الدالة د حيث د(س) = لو$_{هـ}$ س هو ع$^{+}$ ومداها ع

٢) منحنى الدالة يمر بالنقط (١ ، ٠) ، (هـ ، ١)

٣) هى دالة عكسية للدالة ص = هـ^{س}

٤) يستخدم الرمز *ln(x)* لرسم الدالة باستخدام أى برنامج رسومى للحاسب الآلى.

٥) لإيجاد قيمة لو$_{هـ}$ ١٠ مثلًا اضغط على المفاتيح التالية:


ابدأ ← [ln] [1] [0] [=]

نجد أن لو$_{هـ}$ ١٠ = ٢,٣٠٢٥٨٥٠٩٣ لأقرب ٩ أرقام عشرية.

بعض خواص اللوغاريتم الطبيعى

اللوغاريتم الطبيعى له نفس خواص اللوغاريتمات السابق دراستها.

إذا كان س ∈ ع$^{+}$ ، ص ∈ ع ، أ ∈ ع$^{+}$ - {١} فإن:



١) الصورة لو$_{هـ}$ س = ص تكافىء الصورة هـ^{ص} = س

٢) هـ$^{لو_{هـ} س}$ = س

٣) لو$_{هـ}$ هـ = ١

٤) لو$_{هـ}$ ١ = صفر

٥) لو$_{أ}$ س = $\frac{\text{لو}_{هـ}\ س}{\text{لو}_{هـ}\ أ}$ (خاصية تغيير الأساس)

لكل س ، ص ∈ ع$^{+}$ ، ن ∈ ع

٦) لو$_{هـ}$ س ص = لو$_{هـ}$ س + لو$_{هـ}$ ص

٧) لو$_{هـ}$ $\frac{س}{ص}$ = لو$_{هـ}$ س - لو$_{هـ}$ ص

٨) لو$_{هـ}$ س^{ن} = ن لو$_{هـ}$ س

٩) لو$_{هـ}$ س × لو$_{س}$ هـ = ١

نتيجة نت
nezakr.nateg4dk.net

مشتقة الدالة الأسية ذات الأساس الطبيعى

Derivative of Natural Exponential Function

إذا كانت د(س) = هـ^س فإن د'(س) = هـ^س

∵ هـ^س = س^٠/|٠ + س/|١ + س^٢/|٢ + ... ∞

بالاشتقاق بالنسبة لـ س

ء/ء س (هـ^س) = ١/|١ + ٢س/|٢ + ٣س^٢/|٣ + ... ∞

= س^٠/|٠ + س/|١ + س^٢/|٢ + ... ∞

= هـ^س

مثال

مشتقة الدالة الأسية ذات الأساس الطبيعى

(١) أوجد المشتقة الأولى لكل من:

(أ) ص = س^٢ + ٣هـ^س (ب) ص = س^٣ هـ^س (جـ) ص = ٢هـ^س / (س + ١)

الحل

(أ) ∵ ص = س^٢ + ٣هـ^س ∴ ء ص/ء س = ٢س + ٣ ء/ء س (هـ^س) = ٢س + ٣هـ^س

(ب) ∵ ص = س^٣ هـ^س ∴ ء ص/ء س = س^٣ ء/ء س (هـ^س) + هـ^س ء/ء س (س^٣)

= س^٣ هـ^س + ٣س^٢ هـ^س = س^٢ هـ^س (س + ٣)

(جـ) ∵ ص = ٢هـ^س / (س + ١) ∴ ء ص/ء س = [(س + ١) ء/ء س (٢هـ^س) - ٢هـ^س ء/ء س (س + ١)] / (س + ١)^٢ = ٢ س هـ^س / (س + ١)^٢

حاول أن تحل

(١) أوجد ء ص/ء س لكل مما يأتى:

(أ) ص = ٢هـ^س + جتا ٢س (ب) ص = هـ^س جا س (جـ) ص = هـ^س / ظا س

تفكير ناقد: ما العلاقة بين ميل المماس للمنحنى ص = هـ^س عند أى نقطة عليه والإحداثى الصادى لهذه النقطة؟ فسر إجابتك

nezakr.nafega4dk.net

قاعدة السلسلة

إذا كانت ع دالة قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى س ، د(ع) = هـ^ع

فإن: $\frac{د}{د س}$ (هـ^ع) = هـ^ع · $\frac{د ع}{د س}$

مثال

(٢) أوجد المشتقة الأولى لكل من:

(أ) ص = هـ^(٣س^٢ + ٥) (ب) ص = ٣هـ^(قاس) (ج) ص = (هـ^(٣س) - هـ^(-٢س))^٥

الحل

(أ) ∵ ص = هـ^(٣س^٢ + ٥) ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = هـ^(٣س^٢ + ٥) × $\frac{د}{د س}$ (٣س^٢ + ٥) = ٦س هـ^(٣س^٢ + ٥)

(ب) ∵ ص = ٣هـ^(قاس) ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ هـ^(قاس) × $\frac{د}{د س}$ (قاس) = ٣ هـ^(قاس) • قاس طا س

(ج) ∵ ص = (هـ^(٣س) - هـ^(-٢س))^٥ ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٥ (هـ^(٣س) - هـ^(-٢س))^٤ [٣هـ^(٣س) + ٢هـ^(-٢س)]

حاول أن تحل

(٢) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:


(أ) ص = ٢س + هـ^(٦س) (ب) ص = $\frac{١}{٢}$ هـ^(٧ - س^٢) (ج) ص = (هـ^(٣س) + هـ^(-٢س))^٣

تعلم

مشتقة الدالة الأسية للأساس ا

Derivative of Exponential Function to the Base a

إذا كانت د(س) = ا^س فإن د′(س) = ا^س لو ا (هـ)



لاحظ أن ا = هـ^(س لو ا (هـ)) (من خواص اللوغاريتمات) ∴ ا^س = [هـ^(لو ا (هـ))]^س = هـ^(س لو ا (هـ))

ويكون $\frac{د}{د س}$ (ا^س) = $\frac{د}{د س}$ (هـ^(س لو ا (هـ))) = هـ^(س لو ا (هـ)) × لو ا (هـ) = ا^س × لو ا (هـ)

وبوجه عام فإن: $\frac{د}{د س}$ (ا^ع) = ا^ع لو ا (هـ) · $\frac{د ع}{د س}$

مثال

مشتقه الدالة الأسية

(٣) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = ٥ × ٦^س (ب) ص = ٣ (٣س^٢ - ٥س + ٢) (ج) ص = هـ^(جاس) × ٢^(-٥س)

الحل

(أ) ∵ ص = ٥ × ٦^س ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٥ $\frac{د}{د س}$ (٦^س) = ٥ × ٦^س لو ٦ (هـ)

nezakr.nategа4dk.net

ب ∵ ص = ٣٣س٢ - ٥س + ٢ ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = (٦س - ٥) × ٣(٣س٢ - ٥س + ٢) × لو ٣ هـ

ج ∵ ص = هـ^جاس × ٢^-٥س ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = هـ^جاس $\frac{د}{د س}$ (٢^-٥س) + ٢^-٥س $\frac{د}{د س}$ هـ^جاس

= هـ^جاس [-٥ × ٢^-٥س لو ٥ هـ] + ٢^-٥س [هـ^جاس جتا س]

= ٢^-٥س هـ^جاس [لو ٢ هـ^-٥ + جتا س]

حاول أن تحل

٣ أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

أ ص = ٥س^٢ + ٢^س

ب ص = ٢ قا^٢س

ج ص = هـ^٣س إس^٢ - ٥

تعلم

مشتقة دالة اللوغاريتم الطبيعى

Derivative of Natural Logarithm Function

إذا كانت د(س) = لو س ، س > ٠ **فإن** د′(س) = $\frac{١}{س}$

لاحظ أن الدالة اللوغاريتمية هى دالة عكسية للدالة الأسية

إذا كان ص = لو س **فإن** س = هـ^ص (١)

بإشتقاق طرفى العلاقة (١) بالنسبة إلى س ∴ ١ = هـ^ص $\frac{د ص}{د س}$ (٢)

من (١) ، (٢) ينتج أن: $\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{١}{س}$ **أى أن:** $\frac{د}{د س}$ (لو س) = $\frac{١}{س}$

مثال

مشتقة دالة اللوغاريتم الطبيعى

٤ أوجد المشتقة الأولى لكل مما يأتى:

أ ص = ٣س + لو س

ب ص = (٢س^٥ - ٣) لو س

ج ص = $\frac{لو س - ١}{لو س + ١}$

الحل

أ ∵ ص = ٣س + لو س ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = ٣ + $\frac{د}{د س}$ (لو س) = ٣ + $\frac{١}{س}$

ب ∵ ص = (٢س^٥ - ٣) لو س ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = (٢س^٥ - ٣) $\frac{د}{د س}$ (لو س) + (لو س) $\frac{د}{د س}$ (٢س^٥ - ٣)

= (٢س^٥ - ٣) × $\frac{١}{س}$ + ١٠س^٤ لو س

= $\frac{١}{س}$ [(٢س^٥ - ٣) + ١٠س^٥ لو س]

ج ∵ ص = $\frac{لو س - ١}{لو س + ١}$ ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = $\frac{(لو س + ١) \times \frac{١}{س} - (لو س - ١) \times \frac{١}{س}}{(لو س + ١)^٢}$ = $\frac{٢}{س (لو س + ١)^٢}$

nezakr.natega4dk.net



حاول أن تحل

(٤) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = ٥ - ٣ لو$_{هـ}$ س (ب) ص = س^{٢} لو$_{هـ}$ س (ج) ص = $\frac{١ - ٢ لو_{هـ} س}{لو_{هـ} س}$

تفكير ناقد: ما العلاقة بين ميل المماس للمنحنى ص = لو$_{هـ}$ س عند أى نقطة عليه والإحداثى السينى لنقطة المماس؟ فسر إجابتك.

قاعدة السلسلة

- **إذا كانت** ع دالة قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى س ، د(ع) = لو$_{هـ}$ ع

فإن: $\frac{د}{د س}$ [لو$_{هـ}$ ع] = $\frac{١}{ع} \cdot \frac{د ع}{د س}$

- **إذا كانت** س < ٠ **فإن:** $\frac{د}{د س}$ [لو$_{هـ}$ (-س)] = $\frac{١}{-س} \times -١ = \frac{١}{س}$

- **وبوجة عام**

$\frac{د}{د س}$ [لو$_{هـ}$ |س|] = $\frac{١}{س}$ لكل س ≠ ٠

، $\frac{د}{د س}$ [لو$_{هـ}$ |ع|] = $\frac{ع'}{ع}$ حيث ع دالة قابلة للاشتقاق فى س.

مثال

(٥) أوجد $\frac{د}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = لو$_{هـ}$ (٢س^{٣} + ٩) (ب) ص = س^{٤} لو$_{هـ}$ س^{٣} (ج) لو$_{هـ}$ $\frac{س^{٢}}{س + ٧}$

الحل

(أ) ∵ ص = لو$_{هـ}$ (٢س^{٣} + ٩) ∴ $\frac{د ص}{د س} = \frac{١}{٢س^{٣} + ٩} \times \frac{د}{د س}$ (٢س^{٣} + ٩) = $\frac{٦س^{٢}}{٢س^{٣} + ٩}$

(ب) ∵ ص = س^{٤} لو$_{هـ}$ س^{٣} ∴ $\frac{د ص}{د س}$ = س^{٤} $\frac{د}{د س}$ (لو$_{هـ}$ س^{٣}) + لو$_{هـ}$ س^{٣} $\frac{د}{د س}$ (س^{٤})

= س^{٤} × $\frac{١}{س^{٣}}$ × ٣س^{٢} + لو$_{هـ}$ س^{٣} × ٤ س^{٣}

= ٣س^{٣} + ٤س^{٣} لو$_{هـ}$ س^{٣} = س^{٣} [٣ + ٤ لو$_{هـ}$ س^{٣}]

(ج) $\frac{د}{د س}$ $\left(لو_{هـ} \frac{س^{٢}}{س + ٧}\right)$ = $\frac{س + ٧}{س^{٢}} \times \frac{(س + ٧)(٢س) - س^{٢} \times ١}{(س + ٧)^{٢}}$ = $\frac{س + ١٤}{س(س + ٧)}$

حاول أن تحل

(٥) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = لو$_{هـ}$ (٧س - ٣)^{٢} (ب) ص = ٢س^{٢} لو$_{هـ}$ س^{٣} (ج) ص = $\frac{س}{لو_{هـ} س}$

nezakr.natega4dk.net

تعلم

مشتقه الدالة اللوغاريتمية للأساس ا

Derivative of Logarithmic Function to the Base a

إذا كانت د(س) = لو س فإن د′(س) = $\frac{١}{\text{س لو ا}_{هـ}}$

لاحظ $\frac{\text{ء}}{\text{ء س}}$ (لو س) = $\frac{\text{ء}}{\text{ء س}}\left[\frac{\text{لو س}_{هـ}}{\text{لو ا}_{هـ}}\right]$ = $\frac{١}{\text{لو ا}_{هـ}}$ $\frac{\text{ء}}{\text{ء س}}$ [لو س] = $\frac{١}{\text{س}}$ • $\frac{١}{\text{لو ا}_{هـ}}$

ويكون $\frac{\text{ء}}{\text{ء س}}$ (لو س) = $\frac{١}{\text{س}}$ لو هـ

وبوجه عام $\frac{\text{ء}}{\text{ء س}}$ (لو ع) = $\frac{١}{\text{ع لو ا}_{هـ}}$ • $\frac{\text{ء ع}}{\text{ء س}}$

تذكر أن

من خواص اللوغارتيمات

لو س = $\frac{\text{لو س}_{هـ}}{\text{لو ا}_{هـ}}$

لو ا × لو هـ = ١

مشتقه الدالة اللوغارتيمية

مثال

٦ أوجد $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$ لكل مما يأتى:

أ ص = لو س ب ص = لو (٣س - ٢) ج ص = لو (٢س - ٣)^{٢}

الحل

أ ∵ ص = لو س ∴ $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$ = $\frac{١}{\text{س}}$ × $\frac{١}{\text{لو ٣}_{هـ}}$ = $\frac{١}{\text{س لو ٣}_{هـ}}$

ب ∵ ص = لو (٣س - ٢) ∴ $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$ = $\frac{٣}{(\text{٣س - ٢}) \text{ لو ٥}_{هـ}}$

ج ∵ ص = ٢لو |٢س - ٣| ∴ $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$ = $\frac{٢ \times ٢}{(\text{٢س - ٣}) \text{ لو ١٠}_{هـ}}$ = $\frac{٤}{(\text{٢س - ٣}) \text{ لو ١٠}_{هـ}}$

حاول أن تحل

٦ أوجد ميل المماس لكل من المنحنيات التالية عند قيم س المعطاة:

أ ص = لو ٥س ، س = ٢ ب ص = ٤ لو (٣س + ١) ، س = ١

ج ص = لو (٢س^{٢} - ٣)^{٤} ، س = ١ د ص = ٣ (لو س)^{٢} ، س = ٣

مثال


٧ تطبيقات هندسية: إذا كان $\overleftrightarrow{\text{أب}}$ مماس للمنحنى ص = لو $\frac{\text{س}}{٢}$ فى النقطة جـ (١ ، ص) ويقطع محور السينات فى النقطة أ، ومحور الصادات فى النقطة ب أوجد طول $\overline{\text{أب}}$

nezakr.natega4dk.net

الحل

لإيجاد طول $\overline{أب}$ نتبع المخطط المقابل

معادلة المماس $\overleftrightarrow{أب}$ ← نقط التقاطع أ، ب ← طول $\overline{أب}$



ميل المماس عند أى نقطة: $\frac{د ص}{د س} = \frac{١ \times ٢}{س} \times \frac{١}{٢} = \frac{١}{س}$

∵ $\overleftrightarrow{أب}$ يمس المنحنى فى النقطة جـ (١ ، ص)

فإن ص = لو$_{هـ}$ $\frac{١}{٢}$ = - لو$_{هـ}$ ٢ أى أن جـ (١ ، - لو$_{هـ}$ ٢)، وعندها $\frac{د ص}{د س}$ = ١، وتكون معادلة المماس $\overleftrightarrow{أب}$ عند جـ هى:

ص + لو$_{هـ}$ ٢ = س - ١

∵ $\overleftrightarrow{أب}$ يقطع محور السينات فى النقطة أ ∴ أ (١ + لو$_{هـ}$ ٢ ، ٠)

ويقطع محور الصادات فى النقطة ب ∴ ب (٠ ، - ١ - لو$_{هـ}$ ٢)

ويكون (أب)^{٢} = (١ + لو$_{هـ}$ ٢)^{٢} + (١ + لو$_{هـ}$ ٢)^{٢} ∴ أب = $\sqrt{٢}$ (١ + لو$_{هـ}$ ٢)

حاول أن تحل

(٧) إذا كان العمودى للمنحنى ص = لو$_{هـ}$ ٢س عند النقطة أ (١ ، لو$_{هـ}$ ٢) يقطع محور السينات فى النقطة ب أوجد طول $\overline{أب}$ لأقرب ثلاثة أرقام عشرية.

تطبيقات رياضية

الاشتقاق اللوغاريتمى *Logarithmic Differentiation*

يمكن التعبير عن العلاقة بين المتغيرات بصورة لوغارتيمية بأخذ اللوغاريتم الطبيعى لطرفيها واستخدام خواص اللوغاريتمات فى تبسيط العلاقة قبل إجراء عملية الاشتقاق.

مثال

(٨) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(أ) ص = (س^{٣} + ٥)^{س} (ب) ص = [جا س]^{ظاس}

الحل

(أ) ∵ ص = (س^{٣} + ٥)^{س} بأخذ اللوغاريتم الطبيعى لطرفى العلاقة

∴ لو$_{هـ}$ ص = س لو$_{هـ}$ (س^{٣} + ٥) باشتقاق طرفى العلاقة بالنسبة إلى س

$\frac{١}{ص} \frac{د ص}{د س}$ = لو$_{هـ}$ (س^{٣} + ٥) + $\frac{س}{س^{٣}+٥}$ × ٣س^{٢} بضرب الطرفين × ص = (س^{٣} + ٥)^{س}

∴ $\frac{د ص}{د س}$ = (س^{٣} + ٥)^{س} [$\frac{٣س^{٣}}{س^{٣}+٥}$ + لو$_{هـ}$ (س^{٣} + ٥)]

(ب) ∵ ص = [جا س]^{ظاس} يأخذ اللوغاريتم الطبيعى لطرفى العلاقة

لو$_{هـ}$ ص = ظا س لو$_{هـ}$ جا س باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى س

nezakr.nategа4dk.net

$$\frac{١}{ص}\times\frac{د ص}{د س} = \text{طا س} \times \frac{د}{د س}(\text{لو}_{هـ} \text{جا س}) + \text{لو}_{هـ} \text{جا س} \times \frac{د}{د س}(\text{طا س})$$

$$= \frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}} \times \frac{١}{\text{جا س}} \times \text{جتا س} + \text{لو}_{هـ} \text{جا س} \times \text{قا}^{٢}\text{س}$$

$$= ١ + \text{قا}^{٢}\text{س لو}_{هـ} \text{جا س}$$

بضرب الطرفين × ص = [جا س]$^{\text{طا س}}$

$$\therefore \frac{د ص}{د س} = [\text{جا س}]^{\text{طا س}}(١ + \text{قا}^{٢}\text{س لو}_{هـ} \text{جا س})$$

حاول أن تحل

(٨) أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى

(أ) ص = س$^{٢\text{س}}$ (ب) ص = (جا س)$^{\text{س}}$ (ج) ص^{٢} = ٣$^{\text{س}}$ × ٢$^{\text{ص}}$

مثال

(٩) **تحقيق علاقة:** إذا كانت ص = هـ$^{-\text{س}}\sqrt{\frac{١+\text{س}}{١-\text{س}}}$ حيث -١ < س < ١ أثبت أن: (١ - س^{٢}) ص$'$ = س^{٢} ص

الحل

$\because$ ص = هـ$^{-\text{س}}\sqrt{\frac{١+\text{س}}{١-\text{س}}}$ بأخذ لوغاريتم الطرفين للأساس هـ

$$\therefore \text{لو}_{هـ} \text{ص} = \text{لو}_{هـ} \text{هـ}^{-\text{س}} + \frac{١}{٢}\text{لو}_{هـ}\frac{١+\text{س}}{١-\text{س}}$$

$$\text{لو}_{هـ} \text{ص} = -\text{س} + \frac{١}{٢}[\text{لو}_{هـ}(١ + \text{س}) - \text{لو}_{هـ}(١ - \text{س})]$$

بتفاضل طرفى العلاقة بالنسبة إلى س

$$\frac{١}{ص} \times \text{ص}' = -١ + \frac{١}{٢}\left[\frac{١}{١+\text{س}} - \frac{-١}{١-\text{س}}\right]$$

$$\frac{\text{ص}'}{ص} = -١ + \frac{١}{٢}\left[\frac{١-\text{س}+١+\text{س}}{١-\text{س}^{٢}}\right]$$

$$\frac{\text{ص}'}{ص} = -١ + \frac{١}{١-\text{س}^{٢}} = \frac{-١+\text{س}^{٢}+١}{١-\text{س}^{٢}}$$

$$\frac{\text{ص}'}{ص} = \frac{\text{س}^{٢}}{١-\text{س}^{٢}} \quad \therefore (١ - \text{س}^{٢})\text{ ص}' = \text{س}^{٢}\text{ ص}$$

حاول أن تحل

(٩) إذا كانت ص = أهـ$^{\text{بس}}$ اثبت أن: س ص$''$ + ٢ ص ص$'$ - س ص$'^{٢}$ = ٠

nezakr.natega4dk.net



تمـارين ١ - ٣

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

(١) إذا كانت د(س) = هـ^{٣س} فإن د′(س) تساوى:

أ) هـ^{٣س} ب) ٣هـ^{٣س} ج) ٩هـ^{٣س} د) ٣هـ^{٢س}

(٢) إذا كان د(س) = أهـ^{س} فإن د′(-٢) تساوى:

أ) - د(٢) ب) - د′(٢) ج) - د(-٢) د) د(-٢)

(٣) منحنى الدالة د: د(س) = ١ + لو$_{هـ}$ (س - ٢) هو نفس منحنى الدالة ر: ر(س) = لو$_{هـ}$ س بالانتقال:

أ) (١ ، ٢) ب) (١ ، -٢) ج) (-٢ ، ١) د) (٢ ، ١)

(٤) النسبة بين ميل مماس المنحنى ص = لو$_{هـ}$ ٣$\sqrt{س+١}$ وميل مماس المنحنى ص = لو$_{هـ}$ ٥$\sqrt{س+١}$ عند س = ١ كنسبة

أ) ٣ : ٥ ب) ٣ : ٥ ج) ١ : ١ د) لو$_{هـ}$ ٣ : لو$_{هـ}$ ٥

أوجد المشتقة الأولى لكل من:

(٥) ص = هـ$^{٣س^{٥}}$ (٦) ص = هـ$^{س^{٢}-س}$ (٧) ص = (٣س - ١)$^{-٢}$

(٨) ص^{٢} = هـ$^{٥س^{٢}-٣}$ (٩) ص = لو$_{هـ}$ (٢س - ٧) (١٠) ص = لو$_{هـ}$ ($\frac{١}{٢}$س^{٢} + س)

(١١) ص = لو$_{هـ}$ $\frac{س^{٢}}{س+٧}$ (١٢) ص = س^{٢} لو$_{هـ}$ س (١٣) ص = لو$_{٣}$ (٤س + ٩)^{٢}

(١٤) ص = $\frac{هـ^{٣س}}{لوس}$ (١٥) ص = قاهـ^{س} (١٦) ص = ٢هـ^{٣س} - ٥ لو$_{٢}$ $\frac{س}{٥}$

أوجد ميل المماس لكل من المنحنيات التالية عند القيم المعطاة:

(١٧) ص = $\sqrt{س}$ - ٢هـ^{س} ، س = $\frac{١}{٤}$

(١٨) ص = س^{٢} - ٣لو$_{هـ}$ س ، س = ٢

(١٩) ص = $\frac{١}{٤}$ هـ^{٢س} - ٢لو$_{هـ}$ س ، س = $\frac{١}{٢}$

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ لكل مما يأتى:

(٢٠) ص هـ$^{-س}$ = هـ^{٣}

(٢١) س $=$ لو$_{هـ}$ ص = ٥٨

(٢٢) ص = س جاس

(٢٣) ص = هـ هـ$^{-س}$

(٢٤) ص = هـ$^{-س}$ هـ

(٢٥) ص = س$^{\frac{١}{س}}$

أوجد $\frac{د ص}{د س}$ ، $\frac{د^{٢} ص}{د س^{٢}}$ لكل مما يأتى:

(٢٦) س = هـ^{٢ن} ، ص = ن^{٣}

(٢٧) س = ٦ لو$_{هـ}$ ن ، ص = ن^{٢}

أجب عن كل ما يأتى:

(٢٨) إذا كانت ص = س^{٢} لو$_{هـ}$ $\frac{س}{١}$ فأوجد $\frac{د^{٣} ص}{د س^{٣}}$ عند س = ٤

(٢٩) إذا كانت ص = $\sqrt{\frac{س^{٢}+١}{س^{٢}-١}}$ أثبت أن (س^{٤} - ١) ص$'$ + ٢س ص = ٠

(٣٠) أوجد قيم س التى يكون عندها مماس المنحنى ص = ٩س^{٣} - ٨ لو$_{هـ}$ س موازيًا لمحور السينات.

(٣١) أوجد معادلة العمودى للمنحنى ص = ٣هـ$^{-س}$ عند نقطة واقعه عليه و إحداثيها السينى يساوى -١

nezakr.natega4dk.net



١ - ٤ المعدلات الزمنية المرتبطة

Related Time Rates

سوف تتعلم

- مفهوم المعدلات الزمنية المرتبطة
- طرق حل معادلات المعدلات الزمنية المرتبطة
- نمذجة وحل مشكلات رياضية وفيزيائية وحياتية


المصطلحات الأساسية

- معدل Rate
- معدلات مرتبطة Related Rates

الأدوات المستخدمة

- آله حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسب

فكر و ناقش



عند تعرض صفيحة دائرية لمصدر حرارى زمنًا قدره (ن) ثانية

- هل يتغير طول نصف قطرها (نق) بتغير الزمن (ن)؟
- هل تتغير مساحة سطح الصفيحة (م) بتغير الزمن(ن)؟
- هل تتغير مساحة سطح الصفيحة (م) بتغير طول نصف قطرها (نق) ؟ فسر إجابتك.

لاحظ أن :

١ – المتغيرين م ، نق كلاهما يتغير بتغير الزمن (دالة فى الزمن) وتربطهما العلاقة

$م = \pi نق^{٢}$ أى أن : $م = د(نق)$

٢ – اشتقاق طرفى العلاقة السابقة بالنسبة للزمن يؤدى إلى معادلة جديدة تربط بين المعدل الزمنى لتغير كل منهما وتعرف بمعادلة المعدلات المرتبطة

حيث : $\frac{ى م}{ى ن} = د'(نق) \times \frac{ى نق}{ى ن}$

٣ – المعدل الزمنى يكون موجبًا إذا كان المتغير يتزايد بتزايد الزمن، ويكون سالبًا إذا كان المتغير يتناقص بتزايد الزمن.

تعبير شفهى : أى المعدلات التالية يكون موجبًا؟

(تمدد - انكماش - اقتراب - تباعد - صب - تسرب - انصهار - تراكم - تناقص - تزايد)

مثال نفخ البالون

(١) بالون كُرى عند ملئه بالغاز كان معدل الزيادة فى حجمه ٨π سم^{٣}/ث عندما كان طول نصف القطر ٤سم . أوجد فى هذه اللحظة:

(أ) معدل زيادة طول نصف القطر.

(ب) معدل الزيادة فى المساحة السطحية.

الحل

بفرض أن حجم البالون (ح) وطول نصف القطر (نق) ، ومساحة سطح البالون (م) دوال قابلة للاشتقاق فى ن.

تحديد المتغيرات وتسميتها

رسم تخطيطى للمدخلات

إيجاد علاقة الارتباط

اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن

التعويض عن القيم لإيجاد المعدل المطلوب

nezakr.nategа4dk.net

(أ) $ح = \frac{٤}{٣}\pi ن^{٣}$ باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة للزمن

$$\frac{د ح}{د ن} = \frac{٤}{٣}\pi \times ٣ن^{٢} \frac{د ن}{د ن} = ٤\pi ن^{٢} \frac{د ن}{د ن} \quad (١)$$

$\therefore \frac{د ح}{د ن} = ٨\pi$ سم^{٣}/ث ، $ن = ٤$سم بالتعويض فى المعادلة

$\therefore ٨\pi = ٤\pi (٤)^{٢} \frac{د ن}{د ن}$ أى $\frac{د ن}{د ن} = \frac{١}{٨}$ سم/ث

(ب) $م = ٤\pi ن^{٢}$ باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة للزمن

$$\frac{د م}{د ن} = ٤\pi \times ٢ن \frac{د ن}{د ن} = ٨\pi ن \frac{د ن}{د ن} \quad (٢)$$

$\therefore \frac{د ن}{د ن} = \frac{١}{٨}$ سم/ث ، $ن = ٤$سم بالتعويض فى المعادلة

$\therefore \frac{د م}{د ن} = ٨\pi \times ٤ \times \frac{١}{٨} = ٤\pi$ سم^{٢}/ث

حاول أن تحل

(١) **الحجم:** مكعب يتمدد بالحرارة فيزداد طول حرفه بمعدل ٠,٠٢ سم/د، وتزداد مساحة سطحه فى لحظة ما بمعدل ٠,٧٢ سم^{٢}/د، أوجد طول حرف المكعب فى هذه اللحظة ومعدل الزيادة فى حجمه حينئذ.

مثال **حركة السلم**



(٢) يستند سلم طوله ٢٥٠سم على حائط رأسى، فإذا انزلق الطرف العلوى للسلم إلى أسفل الحائط بمعدل ١٠سم/ث عندما يكون الطرف السفلى للسلم على بعد ٧٠سم من الحائط . أوجد:

(أ) معدل انزلاق الطرف السفلى للسلم.

(ب) معدل تغير قياس الزاوية بين السلم والأرض.

الحل


(أ) نفرض أن : ص المسافة بين الطرف العلوى للسلم والأرض،

س المسافة بين الطرف السفلى للسلم والحائط الرأسى.

من نظرية فيثاغورث $س^{٢} + ص^{٢} = (٢٥٠)^{٢}$ (١)

باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة للزمن

$$٢س \frac{د س}{د ن} + ٢ص \frac{د ص}{د ن} = ٠ \quad \therefore \frac{د س}{د ن} = -\frac{ص}{س} \frac{د ص}{د ن} \quad (٢)$$



$\therefore$ الطرف العلوى ينزلق أسفل الحائط فإن ص تتناقص

$\therefore \frac{د ص}{د ن} = -١٠$ سم /ث

عند س = ٧٠ سم ومن المعادلة (١) نجد أن: ص = ٢٤٠ سم

بالتعويض فى المعادلة (٢) ينتج أن: $\frac{د س}{د ن} = -\frac{٢٤٠}{٧٠} \times -١٠ = \frac{٢٤٠}{٧}$ سم/ث

أى إن الطرف السفلى للسلم ينزلق مبتعدًا عن الحائط بمعدل $\frac{٢٤٠}{٧}$ سم /ث

nezakr.nateqa4dk.net



(ب) نفرض أن : θ قياس زاوية ميل السلم على الأرض

$\text{جا}\,\theta = \frac{\text{ص}}{٢٥٠}$ باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى ن

$\therefore \text{جتا}\,\theta \frac{\text{د}\theta}{\text{د ن}} = \frac{١}{٢٥٠} \frac{\text{د ص}}{\text{د ن}}$ لكن $\frac{\text{د ص}}{\text{د ن}} = -١٠$ /ث عندما س = ٧٠ سم

$\frac{٧٠}{٢٥٠} \times \frac{\text{د}\theta}{\text{د ن}} = -١٠ \times \frac{١}{٢٥٠}$ $\therefore \frac{\text{د}\theta}{\text{د ن}} = -\frac{١}{٧}$ د/ث

أى إن قياس الزاوية يتناقص بمعدل $\frac{١}{٧}$ زاوية نصف قطريه /ث

حاول أن تحل

(٢) **حركة سلم:** يرتكز سلم بطرفه الأسفل على أرض أفقية وطرفه الأعلى على حائط رأسى . إذا انزلق الطرف السفلى مبتعدًا عن الحائط بمعدل ٣٠سم/ث ، أوجد معدل انزلاق الطرف العلوى عندما يكون قياس الزاوية بين السلم والأرض تساوى $\frac{\pi}{٣}$

تفكير ناقد: انطلق صاروخ كتلته ١٥ طنًا وكان ينفث الوقود بمعدل ثابت ٢٠٠ كجم/ث، ما كتلة الصاروخ بعد ٣٠ ثانية من لحظة إطلاقه؟

ملاحظة مهمة: إذا كانت س$_{.}$ القيمة الابتدائية للمتغير س (عندما ن = ٠) ، $\frac{\text{د س}}{\text{د ن}}$ معدل تغير س بالنسبة للزمن ثابت ،

س قيمة المتغير بعد زمن ن **فإن :** $\text{س} = \text{س}_{.} + \frac{\text{د ك}}{\text{د ن}} \times \text{ن}$


فى بند تفكير ناقد السابق استخدم العلاقة $\text{ك} = \text{ك}_{.} + \frac{\text{د ك}}{\text{د ن}} \times \text{ن}$ لتتحقق من صحة إجابتك.

مثال المساحة

(٣) مثلث قائم الزاوية طولا ضلعى القائمة ١٢سم ، ١٦سم، فإذا كان طول الضلع الأول يتزايد بمعدل ٢ سم/ث وكان طول الضلع الثانى يتناقص بمعدل ١ سم/ث.

(أ) أوجد معدل تغير مساحة المثلث بعد ٢ ث

(ب) متى يصبح هذا المثلث مثلثًا متساوى الساقين؟



الحل

(أ) نفرض أن س ، ص طولا ضلعى القائمة بعد زمن قدره ن ثانية،

م مساحة المثلث حينئذ حيث س ، ص ، م دوال فى الزمن:

$\therefore \text{س} = ١٢ + ٢\text{ن}$ ، $\text{ص} = ١٦ - \text{ن}$

$\text{م} = \frac{١}{٢} \text{س} \times \text{ص} = \frac{١}{٢} (١٢ + ٢\text{ن})(١٦ - \text{ن})$

$\text{م} = (٦ + \text{ن})(١٦ - \text{ن})$ باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة للزمن

$\therefore \frac{\text{د م}}{\text{د ن}} = (٦ + \text{ن}) \times -١ + (١٦ - \text{ن}) = ١٠ - ٢\text{ن}$ سم^{٢}/ث

عندما ن = ٢ ث $\therefore$ معدل تغير مساحة المثلث = ١٠ - ٢ (٢) = ٦ سم^{٢}/ث

nezakr.natega4dk.net

ب عندما س = ص يكون ١٢ + ن = ١٦ - ن ∴ ن = $\frac{٤}{٣}$ ث

أى أن بعد $\frac{٤}{٣}$ ث يصبح المثلث القائم مثلثًا متساوى الساقين

حاول أن تحل

٣ **الحجم:** جسم معدنى على شكل متوازى مستطيلات، قاعدته مربعة الشكل، طول ضلعها يتزايد بمعدل ١سم/د وارتفاعه يتناقص بمعدل ٢سم/د . أوجد معدل تزايد حجمه عندما يكون طول ضلع قاعدته ٥سم وارتفاعه ٢٠سم، بعد كم دقيقة يتوقف تغير حجم متوازى المستطيلات عن الزيادة.


مثال طول الظل

٤ يسير رجل طوله ١,٨ متر فى خط مستقيم مقتربًا من قاعدة عمود إضاءة بمعدل ١,٢ متر/ث، فإذا كان ارتفاع مصباح عمود الإضاءة ٥,٤ مترًا عن سطح الأرض أوجد:

أ معدل تغير طول ظل الرجل.

ب معدل تغير بعد رأس الرجل عن المصباح عندما يكون الرجل على بعد ٤,٨ مترًا من عمود الإضاءة.

الحل



نمذجة المشكلة: فى الشكل المقابل تمثل $\overline{أب}$ عمود الإضاءة، النقطة أ المصباح وتمثل $\overline{ءهـ}$ الرجل، والنقطة جـ نهاية ظل الرجل فيكون:

س = هـ ب بعد الرجل عن قاعدة عمود الإضاءة.

ص = هـ جـ طول ظل الرجل.

ف = أ ء بُعد رأس الرجل عن المصباح.

أولًا: ∵ △ أ ب جـ ~ △ ء هـ جـ

∴ $\frac{أب}{ءهـ} = \frac{ب جـ}{هـ جـ} = \frac{٥,٤}{١,٨} = \frac{س + ص}{ص}$

ويكون ٢ ص = س باشتقاق طرفى المعادلة بالنسبة للزمن

∴ ٢ $\frac{ء ص}{ء ن} = \frac{ء س}{ء ن}$ أى $\frac{ء ص}{ء ن} = \frac{-١,٢}{٢}$ = - ٠,٦ متر/ث

ثانيًا: فى △ أ ء و القائم الزاوية فى (و)

ف^{٢} = س^{٢} + (٣,٦)^{٢} باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى ن

٢ ف $\frac{ء ف}{ء ن} = ٢ س \frac{ء س}{ء ن}$ عند س = ٤,٨ م ف = ٦ متر

٦ $\frac{ء ف}{ء ن} = ٤,٨ \times -١,٢$ أى $\frac{ء ف}{ء ن}$ = - ٠,٩٦ متر/ث

حاول أن تحل

٤ **انشاءات:** ماسورة مياه طرفاها أ ، ب ، وطولها ٥ أمتار، تستند بطرفها أ على أرض أفقية وبإحدى نقطها ء على سور رأسى ارتفاعه ٣ أمتار. فإذا انزلق الطرف أ مبتعدًا عن السور بمعدل $\frac{٥}{٤}$ متر/د أوجد معدل هبوط الطرف ب عندما تصل إلى حافة السور.


nezakr.natega4dk.net

مثال المساحة

(٥) ضلعان فى مثلث يتزايد طول كل منهما بمعدل ٠,١ سم/ث ، و يتزايد قياس الزاوية المحصورة بينهما بمعدل $\frac{١}{٥}$ ك/ث. بأى معدل تتغير مساحة المثلث عند اللحظة التى يكون فيها طول كل ضلع من أضلاع المثلث ١٠سم.

الحل

نمذجة المشكلة: نفرض أن عند لحظة زمنية ن يكون طول أحد ضلعى المثلث أ وطول الآخر ب وقياس الزاوية المحصورة بينهما جـ ك ، م مساحة المثلث أ ب جـ دوال قابلة للاشتقاق في ن



حيث م $= \frac{١}{٢}$ أ ب جا جـ باشتقاق الطرفين بالنسبة إلى ن

$\therefore \frac{د م}{د ن} = \frac{١}{٢}$ أ ب $\frac{د}{د ن}$ [جا جـ] $+ \frac{١}{٢}$ جا جـ $\frac{د}{د ن}$ [أ ب]

$\frac{د م}{د ن} = \frac{١}{٢}$ أ ب جتا جـ $\frac{د جـ}{د ن} + \frac{١}{٢}$ جا جـ [أ $\frac{د ب}{د ن}$ + ب $\frac{د أ}{د ن}$] (١)

لكن $\frac{د أ}{د ن} = \frac{د ب}{د ن} = ٠,١$ ، $\frac{د جـ}{د ن} = \frac{١}{٥}$

وعندما يكون طول كل ضلع من أضلاع المثلث ١٠سم يكون المثلث متساوى الأضلاع

فإن ق(∠ جـ) $= \frac{\pi}{٣}$ ، جتا جـ $= \frac{١}{٢}$ بالتعويض فى المعادلة (١)

$\therefore \frac{د م}{د ن} = \frac{١}{٢} \times ١٠ \times ١٠ \times \frac{١}{٢} + \frac{١}{٥} \times \frac{١}{٢} \times \frac{\sqrt{٣}}{٢}$ [٢ × ١٠ × $\frac{١}{١٠}$]

$= ٥ + \frac{\sqrt{٣}}{٢} \simeq ٥,٨٦٦$ سم^{٢}/ث

أى مساحة المثلث تتزايد عند هذه اللحظة بمعدل ٥,٨٦٦ سم^{٢}/ث

حاول أن تحل

(٥) **المساحة:** أ ب جـ مثلث قائم الزاوية فى جـ ، مساحته ثابتة وتساوى ٢٤سم^{٢}، إذا كان معدل تغير ب يساوى ١سم/ث فأوجد معدل تغير كل من أ ، ق (∠ أ) عند اللحظة التى يكون فيها ب يساوى ٨ سم.

تفكير ناقد: إذا كان س (قياس زاوية بالتقدير الدائرى) يتزايد بمعدل زمنى ثابت، فسر لماذا:

أ) يتزايد الجيب والظل بنفس المعدل عند س = ٠

ب) يتزايد الظل بمعدل ٨ مرات قدر تزايد الجيب عند س = $\frac{\pi}{٣}$


جـ) يتناقص جيب التمام بمعدل $\frac{٣}{٨}$ مرة قدر تزايد الظل عند س = $\frac{\pi}{٦}$

مثال الربط بالفيزياء

(٦) فى دائرة كهربية مغلقة، إذا كان جـ فرق الجهد (فولت) ، ت شدة التيار (أمبير)، م المقاومة (أوم) وتزايد فرق الجهد بمعدل ١ فولت/ ث ، وتناقص شدة التيار بمعدل $\frac{١}{٢}$ أمبير/ث أوجد معدل تغير المقاومة فى اللحظة التى يكون فيها جـ = ١٢ فولت ، ت = ٢ أمبير.

nezakr.natega4dk.net

الحل



تعلم أن جـ = ت × م باشتقاق الطرفين بالنسبة للزمن

$\therefore \frac{د جـ}{د ن} = ت \frac{د م}{د ن} + م \frac{د ت}{د ن}$

$\because \frac{د جـ}{د ن} = ١$ فولت / ث ، $\frac{د ت}{د ن} = -\frac{١}{٢}$ أمبير /ث

$\therefore$ عند جـ = ١٢ فولت ، ت = ٢ أمبير **فإن :** م = $\frac{جـ}{ت} = \frac{١٢}{٢} = ٦$ أوم

ويكون ١ = ٢ × $\frac{د م}{د ن}$ + ٦ × $-\frac{١}{٢}$ $\therefore \frac{د م}{د ن} = ٢$ أوم /ث

أى إن معدل تغير المقاومة فى هذه اللحظة ٢ أوم /ث

حاول أن تحل

(٦) فى المثال السابق احسب معدل تغير المقاومة إذا كان التيار يتزايد بمعدل $\frac{١}{٣}$ أمبير / ث.

nezakr.natega4dk.net

تمـارين الدرس (١ - ٤)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) إذا زاد طول نصف قطر دائرة بمعدل $\frac{٤}{\pi}$ سم/ث فإن محيط الدائرة يزيد عند هذه اللحظة بمعدل:

(أ) $\frac{٤}{\pi}$ سم/ث (ب) $\frac{\pi}{٤}$ سم/ث (ج) $\frac{١}{٨}$ سم/ث (د) ٨ سم/ث

(٢) ينصهر مكعب من الثلج محتفظًا بشكله بمعدل ١سم^{٣}/ث فإن معدل تغير طول حرف المكعب عندما يكون حجمه ٨ سم^{٣} هو: ..... سم / ث

(أ) $-\frac{١}{١٢}$ (ب) $\frac{١}{١٢}$ (ج) $-\frac{١}{٦}$ (د) $\frac{١}{٦}$

(٣) جسم يتحرك على المنحنى ص^{٢} = س^{٣} ، إذا كان $\frac{د س}{د ن} = \frac{١}{٢}$ وحدة / ث عند ص = - ١ فإن $\frac{د ص}{د ن}$ عند هذه اللحظة يساوى ..... وحدة / ث

(أ) $-\frac{٣}{٤}$ (ب) $-\frac{٣}{٨}$ (ج) $\frac{٣}{٤}$ (د) $\frac{٣}{٢}$

(٤) إذا كان ميل المماس للمنحنى ص = د(س) عند نقطة ما = $\frac{١}{٢}$ وكان الإحداثى السينى لهذه النقطة يتناقص بمعدل ٣ وحدات / ث فإن معدل تغير إحداثيها الصادى يساوى ..... وحدة / ث

(أ) $-\frac{١}{٦}$ (ب) $-\frac{٣}{٢}$ (ج) $\frac{١}{٦}$ (د) $\frac{٣}{٢}$

أجب عما يأتى:

(٥) تتحرك نقطة على منحنى معادلته س^{٢} + ص^{٢} - ٤ س + ٨ ص - ٦ = ٠ فإذا كان معدل تغير إحداثيها السينى بالنسبة للزمن عند النقطة (٣، ١) يساوى ٤ وحدات / ث، أوجد معدل تغير إحداثيها الصادى بالنسبة للزمن ن.

(٦) سقط حجر فى بحيرة ساكنة فتولدت موجة دائرية يتزايد طول نصف قطرها بمعدل ٤سم/ث. أوجد معدل تزايد مساحة سطح الموجة فى نهاية ٥ ثوانٍ.

(٧) صفيحة على شكل سداسى منتظم تنكمش بالبرودة ، وُجِدَ أن معدل تغير طول ضلعها ٠,١ سم/ث، أوجد معدل التغير فى مساحة الصفيحة عندما يكون طول ضلعها ١٠سم.

(٨) كتلة معلومة من غاز درجة حرارتها ثابتة، انقص حجمها بمعدل ثابت قدره ٢سم^{٣}/ث. فإذا كان الضغط يتناسب عكسيًّا مع الحجم وأن الضغط يعادل ١٠٠٠ ث جم /سم^{٢} عندما يكون الحجم ٢٥٠سم^{٣}. أوجد معدل تغير الضغط بالنسبة للزمن عندما يصبح حجم الغاز ١٠٠سم^{٣}.



(٩) يتسرب غاز من بالون كرى بمعدل ٢٠سم^{٣}/ث أوجد معدل تغير طول نصف قطر البالون فى اللحظة التى يكون فيها طول نصف قطره ١٠سم، ثم أوجد معدل تغير مساحة السطح الخارجى للبالون فى نفس اللحظة.

nezakr.nategа4dk.net

(١٠) سلم طوله ٥ أمتار يرتكز بطرفه العلوى على حائط رأسى وبطرفه السفلى على أرض أفقية، إذا تحرك الطرف السفلى مبتعدًا عن الحائط بمعدل ٤ سم/د عندما يكون الطرف العلوى على ارتفاع ٤ أمتار من الأرض، أوجد معدل انزلاق الطرف العلوى للسلم، ثم أوجد معدل تغير قياس الزاوية بين السلم والأرض عند هذه اللحظة.



(١١) يرتفع بالون رأسيًّا لأعلى من نقطة أ على سطح الأرض. وضع جهاز لتتبع حركة البالون عند نقطة ب فى نفس المستوى الأفقى للنقطة أ وعلى بعد ٢٠٠ متر منها عند لحظة ما رصد الجهاز زاوية ارتفاع البالون فوجدها $\frac{\pi}{٤}$ وتتزايد بمعدل ٠,١٢ ق/د، أوجد معدل ارتفاع البالون فى هذه اللحظة.

(١٢) يسير رجل طوله ١٨٠ سم مبتعدًا عن قاعدة مصباح ارتفاعه ٣ أمتار بمعدل ١,٢ م/ث، أوجد معدل تغير طول ظل الرجل. وإذا كان المستقيم المار بأعلى نقطة من رأس الرجل وقمة المصباح يميل على الأرض بزاوية قياسها θ ق عندما يبعد الرجل عن قاعدة المصباح بمسافة قدرها س مترًا فأثبت أن س = $\frac{٦}{٥}$ ظتا θ ، ثم أوجد معدل تغير θ عندما يبعد الرجل مسافة ٣,٦ متر عن قاعدة المصباح.




(١٣) مثلث متساوى الساقين طول قاعدته ٢٠√٣ . إذا كان طول كل من ساقيه يتناقص بمعدل ٣ سم/ساعة، فأوجد معدل تناقص مساحة سطح المثلث عند اللحظة التى يكون فيها طول كل من الساقين مساويًا لطول القاعدة.

(١٤) **الربط بالصناعة:** إذا كان الإنتاج اليومى لأحد المصانع خلال فترة زمنية ن (يومًا) يتعين بالعلاقة ص = ٤٠٠ (١ - هـ$^{-٠,٠٣ن}$) وحدة أوجد معدل التغير فى عدد الوحدات المنتجه بالنسبة للزمن فى اليوم العاشر.



(١٥) **تطبيقات حياتية:** إذا كان إنتاج خلية نحل من العسل يُعطَى بالعلاقة: ص = (ن + ١٠٠) لو (ن + ٥) جرام بدلالة عدد الأيام ن. أوجد معدل تغير انتاج الخلية عند ن = ٥ ، ن = ١٥ ، ن = ٢٠. هل يتزايد إنتاج الخلية من العسل أم يتناقص؟



(١٦) ا ب جـ ء شبه منحرف فيه $\overline{ء جـ}$ // $\overline{ا ب}$، إرتفاعه يساوي ٣ سم، ء جـ = ٥ سم، تتحرك النقطة م على الشعاع $\overleftarrow{ا ب}$ بسرعة ٤,٨سم/ث مبتدأ من النقطة ب. أوجد معدل تغير مساحة المثلث م ن ب في اللحظة التي يكون فيها م ب = ١سم

nezakr.nateqa4dk.net



الوحدة الثانية

سلوك الدالة ودراسة المنحنيات

Behavior of the Function and Investigating curves

مقدمة الوحدة

يمكنك من خلال قراءة الشكل البيانى لمنحنى دالة أن تحدد فترات اطراد (تزايد - تناقص- ثبات) كما يمكن معرفة القيم العظمى والقيم الصغرى للدالة والتعرف على بعض خواص الدالة، كما تستطيع باستخدام البرامج الرسومية للحاسب الآلى رسم الدالة ودراسة سلوكها... إلا أن هذا ليس متاحًا دائما، لذلك ستعرف فى هذه الوحدة تقنيات أكبر لرسم منحنى الدالة من خلال حساب التفاضل باستخدام مشتقات الدالة (المشتقة الأولى والمشتقة الثانية) لتحديد فترات تزايد أو تناقص الدالة، وتعيين القيم العظمى والقيم الصغرى المرتبطة بقيم س (القيم العظمى والصغرى المحلية)، والقيم العظمى والصغرى المطلقة لدالة متصلة على فترة محددة [أ ، ب] واتجاه تحدب منحنى الدالة (لأعلى أو لأسفل) كما تدرس بعض التطبيقات لايجاد القيم العظمى والصغرى لتساعدك فى نمذجة وحل مشكلات رياضية وفيزيائية وحياتية أخرى.

مخرجات التعلم

فى نهاية هذه الوحدة وبعد تنفيذ الأنشطة فيها، من المتوقع أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يستخدم المشتقة الأولى لدراسة تزايد وتناقص الدالة القابلة للاشتقاق.
- يحدد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة القابلة للاشتقاق.
- يتعرف ويوجد القيم العظمى والصغرى المطلقة لدالة فى فترة مغلقة.
- يوجد النقط الحرجة والتحدب لأعلى والتحدب لأسفل ونقط الانقلاب لدالةٍ.
- يوجد العلاقة بين منحنى الدالة والمشتقة الأولى.
- يدرس سلوك دالة من حيث اطراد والقيم العظمى والصغرى من خلال المشتقة الأولى.
- يدرس منحنيات الدالة ومشتقاتها.

nezakr.natega4dk.net

المصطلحات الأساسية

دالة متزايدة	Increasing Function	قيمة صغرى محلية	Local Minimum	التحدب	Convexity
دالة متناقصة	Dereasing Functicn	قيمة عظمى محلية	Local Maximum	تحدب لأعلى	Convex Upward
القيم العظمى والصغرى	Maxima and Minima	قيمة قصوى محلية	Local Extrema	تحدب لأسفل	Convex Downward
القيم القصوى	Extrema	قيمة قصوى مطلقة	Absalute Extrema	نقطة انقلاب	Inflection Point
نقطة حرجة	Critical Point				

دروس الوحدة

الدرس (٢ - ١): تزايد وتناقص الدوال.

الدرس (٢ - ٢): القيم العظمى والصغرى (القيم القصوى)

الدرس (٢ - ٣): دراسة المنحنيات

الدرس (٢ - ٤): تطبيقات على القيم العظمى والصغرى

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية للحاسب الآلى

مخطط تنظيمى للوحدة



nezakr.natega4dk.net



١-٢ تزايد وتناقص الدوال

Increasing and Decreasing Functions

سوف تتعلم

- استخدام المشتقة الأولى فى تحديد فترات تزايد أو تناقص دالة.
- تطبيقات حياتية على فترات تزايد وتناقص الدالة.

المصطلحات الأساسية

- دالة متزايدة Increasing Function
- دالة متناقصة Decreasing Function

الأدوات المستخدمة


- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسب

فكر و ناقش

توضح الأشكال المقابلة منحنى الدالتين د ، ر حيث


د (س) = س^{٢} - ٢س - ١ ،

ر (س) = س^{٣} - ٣س



- حدد فترات تزايد أو تناقص الدالة د
- أوجد مشتقة الدالة د وابحث إشارة د′ (س) لقيم س المختلفة التى تنتمى لفترة التزايد
- إبحث إشارة د′ (س) لقيم س المختلفة التى تنتمى لفترة التناقص

كرر ما سبق من خطوات لتحديد إشارة ر′ (س) فى فترات التزايد وفترات التناقص للدالة ر، ماذا تستنتج؟ وما نوع الزاوية التى يصنعها مماس المنحنى عند قيم س المختلفة فى فترات التزايد مع الاتجاه الموجب لمحور السينات؟



تعلم

اختبار المشتقة الأولى للدوال المطردة

First Derivative Test for Monotonic Functions

نظرية

لتكن د دالة قابلة للاشتقاق على الفترة] أ ، ب [:

١- اذا كان د′(س) > ٠ لجميع قيم س ∈] أ ، ب [

فإن د متزايدة على الفترة] أ ، ب [

٢- إذا كان د′(س) < ٠ لجميع قيم س ∈] أ ، ب [

فإن د متناقصة على الفترة] أ ، ب [

بحث اطراد دالة

أوجد د′(س)

حل المعادلة د′(س) = ٠

إبحث اشارة د′(س)

د′(س) > ٠ ← د متزايدة

د′(س) < ٠ ← د متناقصة

نتيجة نت

nezakr.nategа4dk.net

مثال
تحديد فترات التزايد والتناقص

(١) حدد فترات التزايد وفترات التناقص الدالة د حيث د (س) = س^{٣} - ٣س + ٢

الحل

∵ د(س) = س^{٣} - ٣س + ٢ دالة متصلة وقابلة للاشتقاق على ع

∴ د$'$(س) = ٣س^{٢} - ٣ = ٣ (س^{٢} - ١)

بوضع د$'$(س) = ٠ فيكون: ٣ (س^{٢} - ١) = ٣ (س - ١) (س + ١) = ٠

∴ د$'$(س) = ٠ عندما س = -١ ، س = ١

نبحث إشارة د$'$(س) فى كل من هذه الفترات كما فى جدول التغيرات المقابل فنجد:


س	∞-	-١	١	∞
إشارة د$'$(س)	+	٠	-	٠	+
سلوك د (س)	↗		↘		↗

د متزايدة علي الفترة] -∞ ، -١ [

د متناقصة على الفترة] -١ ، ١ [

د متزايدة على الفترة] ١ ، ∞ [

لاحظ أن:



(١) عند رسم منحنى الدالة د بأحد البرامج الرسومية (الشكل المقابل) نجد أن سلوك منحنى الدالة يطابق ما تم استنتاجه بجدول التغيرات.

(٢) المماس للمنحنى يصنع زاوية حادة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فى فترات التزايد وزاوية منفرجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات فى فترات التناقص.

(٣) قيم س التى تفصل بين فترات التزايد والتناقص للدالة هى القيم التى تكون عندها المشتقة الأولى للدالة تساوى صفرًا أو غير موجودة

حاول أن تحل

(١) حدد فترات التزايد وفترات التناقص لكل مما يأتى:

(أ) د (س) = س^{٣} - ٩س^{٢} + ١٥س

(ب) ر(س) = $\frac{\text{س}}{\text{س}^{٢}+١}$

مثال
دوال مثلثية

(٢) حدد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة د حيث د (س) = س + ٢جا س ، ٠ < س < ٢π

الحل

د متصلة وقابلة للاشتقاق على] ٠ ، ٢π [

∴ د$'$(س) = ١ + ٢ جتا س

بحث إشارة د$'$(س)

س	∞-	$\frac{\pi ٢}{٣}$	$\frac{\pi ٤}{٣}$	∞
إشارة د$'$(س)	+	٠	-	٠	+
سلوك د (س)	↗		↘		↗

عندما ١ + ٢ جتاس = ٠ ∴ جتاس = $-\frac{١}{٢}$

∵ س ∈] ٠ ، ٢π [∴ س = $\frac{\pi ٢}{٣}$ أو س = $\frac{\pi ٤}{٣}$

nezakr.natega4dk.net

لاحظ أن:

عند س = $\frac{\pi}{٢}$ ، د$'$(س) = ١ > ٠ ∴ د تزايدية على] ٠ ، $\frac{\pi ٢}{٣}$ [


عند س = π ، د$'$(س) = -١ < ٠ ∴ د متناقصة على] $\frac{\pi ٢}{٣}$ ، $\frac{\pi ٤}{٣}$ [

عند س = $\frac{\pi ٣}{٢}$ ، د$'$(س) = ١ > ٠ ∴ د تزايدية على] $\frac{\pi ٤}{٣}$ ، $\pi ٢$ [

حاول أن تحل

(٢) حدد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة د حيث د(س) = س - ٢ جتا س ، ٠ < س < $\pi ٢$

تفكير ناقد: يوضح الشكل المقابل منحنى د$'$(س) للدالة د حيث د (س) كثيرة الحدود.



(أ) عين فترات التزايد وفترات التناقص للدالة د

(ب) أوجد مجموعة حل المتباينة د$''$(س) > ٠

مثال

(٣) حدد فترات تزايد وفترات تناقص الدالة ر حيث ر (س) = ٢لو$_{هـ}$ س - س^{٢}

الحل

ر (س) قابلة للاشتقاق لكل س ∈ ع$^{+}$

ر$'$(س) = $\frac{٢}{س}$ - ٢س = $\frac{٢(١ - س^{٢})}{س}$

س	٠	١	∞
إشارة د$'$(س)	+	٠	−
سلوك د (س)	↗		↘

بحث إشارة ر$'$(س)

عندما ر$'$(س) = ٠ ∴ س = ١ أو س = -١ ∉ ع$^{+}$

عند س < ١ ∴ ر$'$(س) > ٠ وتكون ر تزايدية على] ٠ ، ١ [

عند س > ١ ∴ ر$'$(س) < ٠ وتكون ر تناقصية على] ١ ، ∞ [

حاول أن تحل

(٣) حدد فترات تزايد وفترات تناقص الدالة د حيث د (س) = س - هـ^{س} ، وباستخدام برنامج GeoGebra ارسم منحنى الدالة د وتحقق من إجابتك.

nezakr.natega4dk.net

تمـارين ٢ - ١

حدد فترات تزايد وفترات تناقص الدالة د فى كل مما يأتى:

(١) د (س) = س^{٢} - ٤س
(٢) د (س) = (س-٣)^{٢}
(٣) د (س) = س^{٣} - ٦س^{٢} + ٥
(٤) د (س) = ٩س - س^{٣}
(٥) د (س) = س^{٤} + ٤س
(٦) د (س) = ٢ - ٣ (س-٢)$^{\frac{٤}{٣}}$
(٧) د (س) = ١ - $\frac{١}{س}$
(٨) د (س) = $\frac{س - ٢}{س + ٢}$
(٩) د (س) = $\frac{\sqrt{٣}س - ١}{س}$
(١٠) د (س) = س + لو$_{هـ}$ س
(١١) د (س) = ٣ - لو$_{هـ}$ س^{٢}
(١٢) د (س) = ٥ - ٢ هـ^{٢س}

أجب عما يأتى:

(١٣) أثبت أن الدالة د حيث د (س) = ظا س - س متزايدة على الفترة] ٠ ، $\frac{\pi}{٤}$ [

(١٤) حدد فترات التزايد وفترات التناقص للدالة د حيث د(س) = ١ - جاس ، ٠ < س < ٢ π

(١٥) إذا كانت د ، ر دالتين قابلتين للاشتقاق ، د$'$(س) > ر$'$ (س) لكل س ∈ ع ، فأثبت أن الدالة ع حيث ع (س) = د (س) - ر(س) متناقصة لكل س ∈ ع.

nezakr.natega4dk.net



القيم العظمى والصغرى (القيم القصوى)

Maxima and Minima (Extrema)

٢ - ٢

فكر و ناقش

يوضح الشكل المقابل منحنى الدالة د المتصلة على [أ ، ب]


١- حدد فترات تزايد وتناقص الدالة د

٢- عند س = جـ١ ما قيمة د/ (جـ١)؟ صِفْ تغير د على الفترة] أ ، جـ٢ [هل د (جـ١) أكبر قيم د فى هذه الفترة؟

٣- عند س = جـ٢ ما قيمة د/ (جـ٢)؟ صف تغير د على الفترة] جـ١، جـ٣ [، هل د (جـ٢) أصغر قيم د فى هذه الفترة؟

٤- هل يمكن إيجاد قيمة د/ (جـ٣)؟ فسر إجابتك.

صف تغير د على الفترة]جـ٢، ب [هل د (جـ٣) أكبر قيم د فى هذه الفترة؟



تعريف

النقطة الحرجة Critical Point

للدالة د المتصلة على الفترة] أ ، ب [نقطة حرجة (جـ ، د (جـ))
إذا كانت جـ ∈] أ ، ب [، د/(جـ) = ٠ أو د/(جـ) غير معرفة أو الدالة د غير قابلة للاشتقاق عند س = جـ .

فى الشكل السابق نستنتج أن:

توجد نقط حرجة عند س = جـ١ ، س = جـ٢ لأن د/(جـ١) = د/(جـ٢) = ٠ ويطلق عليها أحيانا نقطة التوقف stationary point، كما توجد نقطة أخرى حرجة عند س = جـ٣ لأن د متصلة عند س = جـ٣ وغير قابلة للاشتقاق (المشتقة اليمنى ≠ المشتقة اليسرى).

تعريف

القيم العظمى والقيم الصغرى المحلية

Local Maximum and Local Minimum

إذا كانت د دالة متصلة، مجالها ف ، جـ ∈ ف فإنه يوجد للدالة د:

قيمة عظمى محلية عند س = جـ إذا وجدت فترة مفتوحة] أ ، ب [⊂ ف تحوى جـ بحيث يكون د(س) ≤ د (جـ) لكل س ∈] أ ، ب [

قيمة صغرى محلية عند س = جـ إذا وجدت فترة مفتوحة] أ ، ب [⊂ ف تحوى جـ بحيث يكون د (س) ≥ د (جـ) لكل س ∈] أ ، ب [



سوف تتعلم

- مفهوم النقطة الحرجة.
- مفهوم القيم العظمى والصغرى المحلية لدالة.
- اختبار المشتقة الأولى للقيم العظمى والصغرى المحلية.
- إيجاد القيم القصوى لدالة على فترة مغلقة.

المصطلحات الأساسية

- نقطة حرجة *Critical point*
- قيمة عظمى محلية *Relative Maximum*
- قيمة صغرى محلية *Relative Minimum*
- قيم قصوى مطلقة *Absalute Extrema*

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية

نتيجة نت
nezakr.nategа4dk.net

لاحظ أن :

فى بند فكر وناقش: توجد قيم عظمى محلية عند س = جـ١ ، س = جـ٣ ، بينما توجد قيمة صغرى محلية عند س = جـ٢

اختبار المشتقة الأولى للقيم العظمى والصغرى المحلية


First Derivative Test for relative maximum and relative minimum

تعلم


إذا كانت (جـ ، د (جـ)) نقطة حرجة للدالة د المتصلة عند جـ ، ووجدت فترة مفتوحة حول جـ بحيث:

١- د′(س) > ٠ عندما س < جـ ، د′(س) < ٠ عندما س > جـ ، فإن د (جـ) قيمة عظمى محلية

٢- د′(س) < ٠ عندما س < جـ ، د′(س) > ٠ عندما س > جـ ، فإن د (جـ) قيمة صغرى محلية



د (جـ) قيمة عظمى محلية عند جـ



د (جـ) قيمة صغرى محلية عند جـ

٣- إذا لم يحدث تغير فى إشارة د′(س) على جانبى جـ ، فإنه لا يوجد للدالة د فقط عظمى أو صغرى محلية عند جـ.

نظرية

إذا كانت د دالة متصلة على]أ ، ب[وكانت للدالة د قيمة عظمى أو صغرى محلية عند جـ ∈]أ ، ب[فإن د′(جـ) = ٠

اختبار المشتقة الأولى

مثال

(١) إذا كان د (س) = س^{٣} + ٣س^{٢} - ٩س - ٧ أوجد القيم العظمى أو الصغرى المحلية للدالة د

الحل

حدد النقط الحرجة ← إبحث إشارة د′(س) ← + ← - عظمى محلية ، - ← + صغرى محلية

١) تحديد النقط الحرجة : د متصلة وقابلة للاشتقاق

∴ د′(س) = ٣س^{٢} + ٦س - ٩

= ٣ (س^{٢} + ٢س - ٣) = ٣ (س + ٣) (س - ١)

عندما د′(س) = ٠ ∴ س = -٣ أو س = ١

لدينا نقطتان حرجتان (-٣ ، د (-٣)) ، (١ ، د (١))

أى النقطتان : (-٣ ، ٢٠) ، (١ ، -١٢)

nezakr.natega4dk.net

س	∞-	-٣	١	∞
إشارة د′(س)	+	٠	–	٠	+
سلوك د (س)	↗	٢٠	↘	-١٢	↗

٢) اختبار المشتقة الأولى عند كل نقطة حرجة و يوضحه جدول التغيرات المقابل

٣) فى جوار س = -٣ تتغير إشارة د′(س) من موجبة (قبل س = -٣) إلى سالبة (بعد س = -٣)

∴ د (-٣) = ٢٠ قيمة عظمى محلية.

وفى جوار س = ١ تتغير إشارة د′(س) من سالبة (قبل س = ١) إلى موجبة (بعد س = ١)

∴ د (١) = -١٢ قيمة صغرى محلية.

حاول أن تحل

(١) إذا كان د (س) = $\frac{١}{٣}$ س^{٣} - ٩س + ٣ ، أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د


مثال

المشتقة الأولى غير موجودة

(٢) أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د إذا كان د (س) = س$^{\frac{٢}{٣}}$ (٢س - ٥)

الحل

الدالة د مجالها ع ومتصلة لكل س ∈ ع



١) تحديد النقط الحرجة:

د′(س) = $\frac{٢}{٣}$ س$^{-\frac{١}{٣}}$ (٢س - ٥) + ٢س$^{\frac{٢}{٣}}$

= $\frac{٢[٢س - ٥ + ٣س]}{٣\sqrt[٣]{س}}$ = $\frac{١٠(س - ١)}{٣\sqrt[٣]{س}}$ ، حيث س ≠ ٠

∵ د متصلة عند س = ٠ ، د′(٠) غير موجودة

∴ توجد نقطة حرجة هى (٠ ، د (٠)) أى (٠ ، ٠)

عندما د′(س) = ٠ ∴ س = ١ ويوجد عندئذ نقطة حرجة هى (١ ، د(١)) أى (١ ، -٣) كما يوضحها الشكل المقابل .

س	∞-	صفر	١	∞
إشارة د′(س)	+	غير موجودة	–	٠	+
سلوك د (س)	↗	٠	↘	-٣	↗

٢) اختبار المشتقة الأولى عند كل نقطة حرجة يوضحه جدول تغيرات الدالة المقابل.

٣) عند س = ٠ توجد قيمة عظمى محلية = ٠

عند س = ١ توجد قيمة صغرى محلية = -٣

حاول أن تحل

(٢) أثبت أن للدالة د حيث د (س) = $\sqrt[٣]{س^{٢}}$ قيمة صغرى محلية.

تفكير ناقد: هل للدالة د حيث د (س) = س^{٣} + ٣س -٤ قيم عظمى وصغرى محلية؟ فسر إجابتك.

nezakr.nategа4dk.net

مثال
دوال كسرية

(٣) أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د حيث د(س) = س + $\frac{٤}{س}$ مبينًا نوعها

الحل

مجال د = ح - {٠}


١) تحديد النقط الحرجة: د′(س) = ١ - ٤س$^{-٢}$ = $\frac{س^{٢} - ٤}{س^{٢}}$ للدالة نقطتان حرجتان هما (٢، د(٢)) ، (-٢، د (-٢)) أى (٢ ، ٤) ، (-٢ ، -٤).

٢) اختبار المشتقة الأولى عند كل نقطة حرجة يوضحه جدول تغيرات الدالة المقابل (لاحظ استبعاد س = ٠ من مجال د).

س	∞-	-٢		٢	∞
إشارة د′(س)	+	−		−	+
سلوك د (س)		-٤		٤	

٣) عند س = -٢ توجد قيمة عظمى محلية = -٤

وعند س = ٢ توجد قيمة صغرى محلية = ٤



لاحظ أن: قد تكون القيمة العظمى المحلية أصغر من القيمة الصغرى المحلية للدالة

تكنولوجيا: يبين الشكل المقابل منحنى الدالة د باستخدام أحد البرامج الرسومية، قارن بين جدول تغيرات الدالة ومنحناها . ماذا تلاحظ؟

حاول أن تحل

(٣) أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د حيث د(س) = $\frac{س^{٢}}{١ - س}$ مبينًا نوعها

تعلم


القيم القصوى لدالة على فترة مغلقة
The Absolute Extrema of a Function on a Closed Interval

تعريف القيم القصوى : إذا كانت د دالة معرفة على الفترة المغلقة [أ ، ب] وكانت جـ ∈ [أ ، ب]

١) د (جـ) هى قيمة صغرى علي الفترة [أ ،ب] عندما يكون د(جـ) ≤ د(س) لكل س ∈ [أ ، ب]


٢) د (جـ) هى قيمة عظمى على الفترة [أ ، ب] عندما يكون د(جـ) ≥ د(س) لكل س ∈ [أ ، ب]

- القيمة الصغرى والقيمة العظمى لدالة على فترة تسمى القيم القصوى للدالة على هذه الفترة .
- القيمة القصوى يمكن أن تحدث عند أى نقطة داخل الفترة أو على حدود الفترة وعندما تحدث عند حدود الفترة تسمى نقطة حدية قصوى



نظرية إذا كانت الدالة د متصلة على الفترة [أ ، ب] فإن للدالة د قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة على الفترة [أ ، ب].

nezakr.natega4dk.net



لإيجاد القيم القصوى المطلقة للدالة د على الفترة المغلقة [أ ، ب] نتبع المخطط المقابل كما يلى:

- احسب د (أ) ، د (ب) ، وقيمة الدالة عند كل نقطة حرجة.
- قارن بين القيم السابقة؛ أكبر هذه القيم هو قيمة عظمى مطلقة وأصغرها هو قيمة صغرى مطلقة.

مثال

(٤) أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة د حيث د (س) = س^{٣} - ١٢ س + ١٢ ، س ∈ [-٣ ، ٣]

الحل

∵ د (س) = س^{٣} - ١٢ س + ١٢ ، س ∈ [-٣ ، ٣]

∴ د (-٣) = (-٣)^{٣} - ١٢(-٣) + ١٢ = ٢١ (١)

، د (٣) = (٣)^{٣} - ١٢(٣) + ١٢ = ٣ (٢)

د′(س) = ٣ س^{٢} - ١٢ = ٣ (س - ٢) (س - ٢)

لتحديد النقط الحرجة نضع د′(س) = ٠

∴ س = ٢ ∈ [-٣ ، ٣] أو س = -٢ ∈ [-٣ ، ٣]

عند س = ٢ توجد نقطة حرجة ويكون : د (٢) = -٤ (٣)

عند س = -٢ توجد نقطة حرجة ويكون : د (-٢) = ٢٨ (٤)

بمقارنة قيم ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ نجد أن:

للدالة د قيمة عظمى مطلقة = ٢٨ ، قيمة صغرى مطلقة = -٤

حاول أن تحل

(٤) أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة د


(أ) د (س) = ١٠س هـ$^{-س}$ س ∈ [٠ ، ٤]


(ب) د (س) = $\frac{٤س}{س^{٢}+١}$ س ∈ [-١ ، ٣]


nezakr.nategа4dk.net

تمـارين ٢ - ٢

حدد القيم العظمى والصغرى المحلية (إن وجدت) للدالة د فى الأشكال التالية وبين نوعها:

١


٢


٣


أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية (إن وجدت) للدالة د فى كل مما يأتى مبينًا نوعها:

٤ د (س) = س^{٣} + ٣س^{٢} + ٢

٥ د (س) = س^{٤} - ٢س^{٢}

٦ د (س) = ٤س - س^{٣}

٧ د (س) = ٣س^{٥} - ٥س^{٣}

٨ د (س) = ٣ - س$^{\frac{٢}{٣}}$

٩ د (س) = (س + ٢)$^{\frac{٢}{٣}}$

١٠ د (س) = س + $\frac{٤}{س^{٣}}$

١١ د (س) = س + $\frac{٤}{س - ١}$

١٢ د (س) = $\frac{٣}{س - ٢}$

١٣ د (س) = ٤ هـ$^{-س^{٢}}$

١٤ د (س) = هـ^{س} (٣ - س)

١٥ د (س) = هـ^{س} + هـ$^{-س}$

١٦ د (س) = س - لو$_{هـ}$ س

١٧ د (س) = ٨لو$_{هـ}$ س - س^{٢}

أوجد القيم القصوى المطلقة للدالة د على الفترة المعطاة:

١٨ د (س) = س^{٣} - ٣س + ١ ، س ∈ [-٢ ، ١]

١٩ د (س) = $\sqrt{س - ١}$ ، س ∈ [٢ ، ٥]

٢٠ د(س) = جا س + جتا س ، س ∈ [٠ ، ٢π]

٢١ د (س) = س هـ$^{-س}$ ، س ∈ [٠ ، ٢]

أجب عما يلى:

٢٢ تفكير ابداعى: أوجد قيم أ ، ب ، حـ ، و بحيث يحقق المنحنى د (س) = أس^{٣} + ب س^{٢} + جـ س + و الشروط التالية معًا:

أ يمر بنقطة الأصل.

ب له نقطة حرجة عند س = ١

ج معادلة المماس للمنحني عند النقطة (٢ ، د (٢)) عليه هى ٩س + ص = ٢٠

nezakr.natega4dk.net



٢-٣ دراسة المنحنيات

Investigating , Sketching Curves

سوف تتعلم

- تحديد فترات تحدب منحنى دالة لأعلى ولأسفل.
- إيجاد نقط الانقلاب لمنحنى دالة.
- استخدام اختبار المشتقة الثانية لإيجاد القيم العظمى أو الصغرى المحلية.
- دراسة المنحنيات.

المصطلحات الأساسية


- التحدب Convexity
- تحدب لأعلى Convex upward
- تحدب لأسفل Convex downward
- نقطة انقلاب Inflection point

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسب

استكشف

يبين الشكل المقابل منحنى الدالة د حيث:
د(س) = $\frac{١}{٣}$ س^{٣} ، س ∈ ع



لاحظ أن الدالة د متزايدة على ع لماذا؟

هل يختلف اتجاه تقوس (تحدب) المنحنى فى الفترة] -∞ ، ٠ [عن اتجاه تحدبه فى الفترة] ٠ ، ∞ [؟

فى الفترة] -∞ ، ٠ [ما موقع منحنى الدالة بالنسبة إلى جميع مماساته؟ هل يتزايد ميل المماس د′ (س) أم يتناقص بزيادة قيم س؟


فى الفترة] ٠ ، ∞ [ما موقع منحنى الدالة بالنسبة إلى جميع مماساته؟ هل يتزايد ميل المماس د′ (س) أم يتناقص بزيادة قيم س؟ ماذا تستنتج؟

تحدب المنحنيات


Convexity of a curves

تعريف

لتكن د دالة قابلة للاشتقاق على الفترة] أ ، ب [، يكون منحنى الدالة د محدبًا لأسفل إذا كانت د′ متزايدة على هذه الفترة ، ومحدبًا لأعلى إذا كانت د′ متناقصة على هذه الفترة.



المنحنى محدب لأسفل
د′ متزايدة وتكون مشتقتها موجبة
أى د″(س) > ٠



المنحنى محدب لأعلى
د′ متناقصة وتكون مشتقتها سالبة
أى د″(س) < ٠

إذا كان للدالة د مشتقة ثانية غير صفرية فيمكن من خلالها دراسة تزايد وتناقص المشتقة الأولى د′ وتحديد فترات التحدب لأعلى والتحدب لأسفل لمنحنى الدالة د.

nezakr.nategа4dk.net

اختبار المشتقة الثانية لتحدب المنحنيات
The Second Derivative Test for Convexity

نظرية

لتكن د دالة قابلة للاشتقاق مرتين على الفترة]أ ، ب[

١ - إذا كان د″(س) > ٠ لجميع قيم س ∈]أ ، ب[فإن منحنى د يكون محدبًا لأسفل على الفترة]أ ، ب[

٢ - إذا كان د″(س) < ٠ لجميع قيم س ∈]أ ، ب[فإن منحنى د يكون محدبًا لأعلى على الفترة]أ ، ب[

مثال

تحديد فترات تحدب كثيرات الحدود


(١) إذا كان د (س) = ٢ - ٣س^{٢} - س^{٣} عين الفترات التى يكون فيها منحنى الدالة د محدبًا لأعلى ، والفترات التى يكون فيها محدبًا لأسفل.

الحل

د متصلة وقابلة للاشتقاق لكل س ∈ ع حيث:

د′(س) = - ٦س - ٣ س^{٢} ، د″(س) = -٦ - ٦ س = - ٦ (١ + س)

عندما د″(س) = ٠ ∴ س = -١



س	∞-	-١	∞
إشارة د″	+	٠	-
تحدب منحنى د	∪		∩

فترات التحدب: يبين الجدول المقابل إشارة د″ وفترات تحدب منحنى الدالة د لأعلى ولأسفل،

أى إن: منحنى الدالة محدب لأسفل فى الفترة]-∞ ، -١ [ومحدب لأعلى فى الفترة]-١ ، ∞[

حاول أن تحل

(١) حدد فترات التحدب لأعلى والتحدب لأسفل لكل من المنحنيات التالية:

أ د(س) = س^{٢} - ٤س + ٢ ب ر(س) = س^{٤} - ٤س^{٣}

تكنولوجيا: باستخدام أحد البرامج الرسومية إرسم منحنى الدالتين د ، ر حيث ر(س) = $\sqrt[٣]{\text{س}}$ ، د(س) = س$^{\frac{٢}{٣}}$ وحدد فترات التحدب لأعلى والتحدب لأسفل وحقق إجابتك باستخدام اختبار المشتقة الثانية .

لاحظ أن: قد يتغير اتجاه تحدب منحنى الدالة المتصلة من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى عند نقطة تنعدم عندها المشتقة الثانية للدالة أو تكون غير موجودة .

تعريف


نقطة الانقلاب *Inflection point*

إذا كانت د دالة متصلة على الفترة المفتوحة]أ ، ب[، جـ ∈] أ ، ب[وكان لمنحنى الدالة مماس عند النقطة (جـ، د (جـ)). فإن هذه النقطة تسمى نقطة انقلاب لمنحنى الدالة د إذا تغير تحدب منحنى الدالة عند هذه النقطة من محدب لأسفل إلى محدب لأعلى أو من محدب لأعلى إلى محدب لأسفل.

nezakr.natega4dk.net










توجد نقط انقلاب للمنحنيات ١ ، ٢، ٣ لتغير اتجاه تحدب المنحنى ووجود مماس له عند جـ

لا توجد نقط انقلاب لعدم وجود مماس عند جـ

لاحظ أن:

١- المماس عند نقطة الانقلاب يقطع منحنى الدالة، لأن المنحنى فى إحدى جهتى هذه النقطة يقع تحت المماس ، وفى الجهة الأخرى يقع فوق المماس.

٢- فى الشكل المقابل يوجد لمنحنى الدالة د نقطتى انقلاب الأولى عند نقطة الأصل و (٠، ٠) والأخرى عند النقطة ب (٢، د(٢)).



مثال التحدب ونقط الانقلاب

(٢) إذا كانت د(س) = $\begin{cases} س^{٢} - ٤ & \text{عندما } س < -٢ \\ س^{٣} - ٣س + ٢ & \text{عندما } س \geq -٢ \end{cases}$

حدد فترات تحدب منحنى د لأعلى ولأسفل ، وأوجد نقط الانقلاب ومعادلة المماس عندها إن وجد.

الحل

الدالة د متعددة التعريف مجالها ع ، ومتصلة عند س = -٢ لأن د(-٢)$^{-}$ = د(-٢)$^{+}$ = د(-٢) = ٠

د$'$(-٢$^{-}$) = $\lim_{هـ \to ٠^{-}} \frac{د(-٢ + هـ) - د(-٢)}{هـ}$

= $\lim_{هـ \to ٠^{-}} \frac{(-٢ + هـ)^{٢} - ٤ - ٠}{هـ}$ = $\lim_{هـ \to ٠^{-}}$ (هـ - ٤) = -٤

د$'$(-٢$^{+}$) = $\lim_{هـ \to ٠^{+}} \frac{د(-٢ + هـ) - د(-٢)}{هـ}$

= $\lim_{هـ \to ٠^{+}} \frac{(-٢ + هـ)^{٣} - ٣(-٢ + هـ) + ٢ - ٠}{هـ}$ = $\lim_{هـ \to ٠^{+}}$ (هـ^{٢} - ٦هـ + ٩) = ٩

∵ د$'$(-٢$^{-}$) ≠ د$'$(-٢$^{+}$) ∴ الدالة غير قابلة للاشتقاق عند س = -٢


د$'$(س) = $\begin{cases} ٢س & \text{عندما } س < -٢ \\ ٣س^{٢} - ٣ & \text{عندما } س > -٢ \\ \text{غير موجودة} & \text{عندما } س = -٢ \end{cases}$ [د$'$(-٢$^{-}$) ≠ د$'$(-٢$^{+}$)]

د$''$(س) = $\begin{cases} ٢ & \text{عندما } س < -٢ \\ ٦س & \text{عندما } س > -٢ \end{cases}$

nezakr.natega4dk.net

يبين الجدول التالى إشارة د″ وفترات تحدب منحنى الدالة لأعلى ولأسفل.

س	$-\infty$	-٢	١	∞
إشارة د″	+	غير موجودة	-	+
تحدب منحنى د	∩		∩	∪



فترات التحدب: منحنى د محدب لأسفل فى الفترة $]-\infty ، -٢[$ ، الفترة $]٠ ، \infty[$ ومحدب لأعلى فى الفترة $]-٢ ، ٠[$

نقط الانقلاب


- النقطة (-٢ ، د(-٢)) أى (-٢ ، ٠) ليست نقطة انقلاب لمنحنى د رغم تغير اتجاه تحدبه حولها، لعدم وجود مماس لمنحنى الدالة عند هذه النقطة (د′(س) غير موجودة)
- النقطة (٠ ، د(٠)) أى (٠ ، ٢) هى نقطة انقلاب لمنحنى د لتغير اتجاه تحدبه حولها، ويوجد عندها مماس للمنحنى يقطعه فى هذه النقطة ، ميله د′(س) = -٣، ومعادلته هى : ص - ٢ = -٣ س (كما فى الرسم)

حاول أن تحل

(٢) إذا كانت د (س) = $\begin{cases} (س + ٣)^{٢} & \text{عندما س} < -١ \\ ٣س^{٢} - س^{٣} & \text{عندما س} \leq -١ \end{cases}$

حدد فترات التحدب لأعلى والتحدب لأسفل لمنحنى الدالة د، وأوجد نقط الانقلاب ومعادلة مماس المنحنى عندها.

تفكير ناقد: يمثل الشكل المقابل منحنى د′(س) على الفترة $]-٢ ، ٥[$ للدالة المتصلة د.



- وضح فترات التحدب لأعلى والتحدب لأسفل لمنحنى الدالة د إن وجدت.
- هل توجد نقط انقلاب لمنحنى د فى هذه الفترة ؟ فسر إجابتك.

اختبار المشتقة الثانية للقيم العظمى أو الصغرى المحلية


نظرية

لتكن الدالة د قابلة للاشتقاق مرتين على فترة مفتوحة تحوى جـ حيث د′(جـ) = ٠


(١) إذا كانت د″(جـ) < ٠ فإن د(جـ) قيمة عظمى محلية.

(٢) إذا كانت د″(جـ) > ٠ فإن د(جـ) قيمة صغرى محلية.

(٣) إذا كانت د″(جـ) = ٠ فإن اختبار المشتقة الثانية لايستطيع تحديد نوع النقطة(جـ، د(جـ)) من حيث كونها عظمى محلية أو صغرى محلية.



د(جـ) قيمة عظمى محلية



د(جـ) قيمة صغرى محلية

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٣) استخدم اختبار المشتقة الثانية فى إيجاد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د حيث :
د(س) = س^{٤} - ٨س^{٢} + ١٠

الحل

د(س) كثيرة حدود فهى متصلة ومجالها ع

د′(س) = ٤س^{٣} - ١٦ س = ٤س (س^{٢} - ٤) ، د″(س) = ١٢س^{٢} - ١٦

للدالة نقط حرجة عندما د′(س) = ٤س (س^{٢} - ٤) = ٠ أى عند : س = ٠ ، س = ٢ ، س = -٢

اختبار المشتقة الثانية لوجود قيم عظمى أو صغرى محلية:

عند س = ٠ د″(٠) = -١٦ < ٠ ∴ د(٠) = ١٠ قيمة عظمى محلية

عند س = ٢ د″(٢) = ٣٢ < ٠ ∴ د(٢) = -٦ قيمة صغرى محلية


عند س = -٢ د″(-٢) = ٣٢ > ٠ ∴ د(-٢) = -٦ قيمة صغرى محلية

حاول أن تحل

(٣) باستخدام اختبار المشتقة الثانية أوجد القيم العظمى والصغرى المحلية للدالة د حيث د(س) = س^{٣} - ٣س^{٢} - ٩س وتحقق من صحة إجابتك باستخدام الحاسبة البيانية أو البرامج الرسومية.

دراسة ورسم الشكل العام لمنحنيات كثيرات الحدود

Curve Sketching for Polynomials



يستخدم حساب التفاضل فى رسم الشكل العام لمنحنيات الدوال، ويعتمد على تتبع سلوك د(س) للدالة د عندما تتغير قيمة س فى فترة معينة، وتمثيل الأزواج المرتبة (س ، ص) فى المستوى الإحداثى المتعامد حيث ص = د(س) وسنقصر دراستنا على رسم الشكل العام لمنحنيات الدوال على دوال كثيرة الحدود من الدرجة الثالثة فأقل على الصورة د(س) = أ س^{٣} + ب س^{٢} + جـ س + ى

لرسم الشكل العام لمنحنى الدالة د حيث ص = د(س) نتبع المخطط المقابل كما يلى:

١- إذا كانت د زوجية يكون منحناها متماثلاً بالنسبة لمحور الصادات، ويكون متماثلاً حول نقطة الأصل إذا كانت د فردية.

٢- دراسة تغيرات الدالة وتحديد فترات التحدب ونقط الانقلاب إن وجدت والقيم العظمى والصغرى المحلية إن وجدت.

٣- إعداد جدول التزايد والتناقص والتحدب لمعرفة الشكل العام للمنحنى ونوع النقط الحرجة.

٤- إيجاد نقط تقاطع منحنى الدالة مع محورى الإحداثيات إن امكن ذلك .

٥- رسم تخطيطى لمنحنى الدالة ويمكن الاستعانة ببعض النقط الإضافية لتحسين الرسم.

nezakr.nateg4dk.net

مثال
رسم منحنى دالة

(٤) ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة د حيث ص = د(س) = س^{٣} - ٣س^{٢} + ٤

الحل

١- الدالة د كثيرة حدود مجالها ع ، والدالة ليست زوجية وليست فردية.

٢- د$'$(س) = ٣س^{٢} - ٦س = ٣س (س - ٢) ، د$''$(س) = ٦س - ٦ = ٦ (س - ١)

للدالة نقط حرجة عند د(س) = ٠ أى عند س = ٠ ، س = ٢

وتكون د متزايدة فى الفترة]-∞ ، ٠[والفترة]٢ ، ∞[ومتناقصة فى الفترة]٠ ، ٢[

د$''$(س) = ٠ عند س = ١

د$''$(س) < ٠ فى الفترة]-∞ ، ١[ويكون المنحنى محدبًا لأعلى فى هذه الفترة،

د$''$(س) > ٠ فى الفترة]١ ، ∞[ويكون المنحنى محدبًا لأسفل فى هذه الفترة

النقطة (١ ، د(١)) أى (١ ، ٢) نقطة انقلاب.


٣- جدول التزايد والتناقص والتحدب

س	-∞		٠		١		٢		∞
إشارة د$'$		+	٠	-		-	٠	+	
سلوك د		↗		↘		↘		↗	
إشارة د$''$		-	٠	+					
تحدب د		∩		∪					
ص			٤		٢		٠		

قيمة صغرى محلية — نقطة انقلاب — قيمة عظمى محلية

٤- نقط التقاطع مع محورى الإحداثيات : (٠ ، ٤) ، (٢ ، ٠)

٥- الشكل العام لمنحنى الدالة د



نقط إضافية : (-١ ، د(-١)) أى (-١ ، ٠) (٣ ، د(٣)) أى (٣ ، ٤)

حاول أن تحل

(٤) ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة د حيث ص = د(س) = ١٢ س - س^{٣}

مثال
الشكل العام لمنحنى دالة

(٥) ارسم شكلاً عامًّا لمنحنى الدالة د حيث ص = د(س) إذا علمت مايلى:

١- د دالة متصلة مجالها [١ ، ٧] ، د(١) = -٢ ، د(٥) = ٤

٢- د$'$(٥) = ٠ ، د$'$(س) < ٠ عندما س > ٥ ، د$'$(س) > ٠ عندما س < ٥

٣- د$''$(س) < ٠ عندما ١ < س < ٧


نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net


الحل

من (١): نرسم محورى الإحداثيات المتعامدة النقطتين (١، -٢) ، (٥، ٤) فى المجال [١، ٧].

من (٢): عند س = ٥ المماس // محور السينات، ود متزايدة على الفترة] ١، ٥[ومتناقصة على الفترة] ٥، ٧[

من (٣): المنحنى محدب لأعلى على] ١، ٧[





حاول أن تحل

(٥) ارسم شكلاً عامًّا لمنحنى الدالة د حيث ص = د(س) إذا علمت ما يلى :

١- د متصلة مجالها [٠، ∞[، د(٤) = ٣ ، د(٠) = ١ ٢- د′(س) > ٠ عندما س > ٠

٣- د″(س) > ٠ عندما س < ٤ ، د″(٤) = ٠ ، د″(س) < ٠ عندما س > ٤

مثال حل معادلات

(٦) إذا كانت النقطة (١، ١٢) هى نقطة انقلاب لمنحنى الدالة د حيث د(س) = أس^{٣} + ب س^{٢} فأوجد قيم أ ، ب الحقيقية.

الحل


∵ النقطة (١ ، ١٢) نقطة انقلاب لمنحنى د

∴ د″(١) = ٠ (١) ، د(١) = ١٢ (٢)

د′(س) = ٣أس^{٢} + ٢ب س ، د″(س) = ٦أس + ٢ب

من (١) : ٦أ + ٢ب = ٠ ∴ ب = -٣أ

من (٢) : أ + ب = ١٢ ∴ أ - ٣أ = ١٢ ويكون أ = -٦ ، ب = ١٨




حاول أن تحل

(٦) إذا كانت النقطة (٢، ٢) هى نقطة انقلاب لمنحنى الدالة د حيث د(س) = س^{٣} + أس^{٢} + ب س فأوجد قيم أ ، ب الحقيقية.

nezakr.natega4dk.net

تكنولوجيا: بعض الدوال يصعب رسم منحناها البيانى. يمكنك باستخدام برنامج geogebra أو أى برنامج رسومى آخر رسم منحنى الدالة ودراسة خواصه.

يوضح الشكل المقابل منحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{(س+1)^{2}}{س^{2}+1}$،



لاحظ:

١) **النقط الحرجة:** للمنحنى نقط حرجة عند س = -١ ، س = ١

عند س = -١ د(-١) = ٠ قيمة صغرى محلية، عند س = ١ د(١) = ٢ قيمة عظمى محلية.

٢) **فترات التحدب:** إلى أعلى:]-∞ ، -$\sqrt{٣}$[،]٠ ، $\sqrt{٣}$[إلى أسفل:]-$\sqrt{٣}$ ، ٠[،]$\sqrt{٣}$ ، ∞[

٣) **نقطة الانقلاب:** عند س = -$\sqrt{٣}$ يوجد مماس يقطع منحنى د ، عند س = $\sqrt{٣}$ يوجد مماس يقطع منحنى د

٤) **الشكل العام للمنحنى:** منحنى الدالة يقترب بطرفيه من المستقيم ص = ١ ويعرف بخط التقارب الأفقى لمنحنى الدالة ومعادلته ص = أ حيث: أ = $\lim_{س \to \pm\infty}$ د(س) = $\lim_{س \to \pm\infty} \frac{(س+1)^{2}}{س^{2}+1}$ = ١


تطبيق: ارسم منحنى الدالتين بأحد البرامج الرسومية ثم ادرس خواص كل منهما:

د(س) = $\frac{٤س^{2}}{س^{2}+٣}$ ، ر(س) = $\frac{س^{2}-٤س}{س^{2}-٤س+٣}$

nezakr.natega4dk.net

تمـــاريـن ٢ - ٣

(١) يبين الشكل المقابل منحنى الدالة د حيث ص = د(س)، اكمل:



(أ) مجال د = ...

(ب) د'(س) = ٠ عندما س ∈ .....

(جـ) د''(س) > ٠ عندما س ∈ .....

(د) المنحنى محدب لأعلى عندما س ∈ .....

(هـ) للمنحنى نقطة انقلاب هى .....

(و) للدالة قيمة صغرى محلية عند س = ...

(ز) للدالة قيمة عظمى مطلقة تساوى .....

ابحث فترات تحدب الدالة د ثم أوجد إحداثيات نقط الانقلاب (إن وجدت) لكل ممايأتى:

(٢) د (س) = ٤ - ٦ س - ٣س^{٢}

(٣) د(س) = س^{٣} - ٣س^{٢} + ١

(٤) د(س) = ١٥س + ٦ س^{٢} - س^{٣}

(٥) د(س) = س^{٤} - ٨س^{٢} + ١٦

(٦) د(س) = $\frac{٦}{س^{٢}+٣}$

(٧) د(س) = $\frac{س^{٢}-١}{س^{٢}-٤}$

(٨) د(س) = $\begin{cases} (س-٢)^{٢} & \text{عندما } س > ٤ \\ ٢٠ - س^{٢} & \text{عندما } س \leq ٤ \end{cases}$

(٩) د(س) = $\begin{cases} س^{٣} - ٣س & \text{عندما } س < ٠ \\ ٤س - س^{٢} & \text{عندما } س \geq ٠ \end{cases}$

(١٠) أثبت أن قياس زاوية ميل المماس عند نقطة الانقلاب لمنحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{س}{١ - س^{٢}}$ يساوى $\frac{\pi}{٤}$

(١١) إذا كان لمنحنى الدالة د حيث د(س) = س (س - ٣)^{٢} قيمة عظمى محلية عند س$_{١}$ ، وقيمة صغرى محلية عند س$_{٢}$ فأثبت أن الإحداثى السينى لنقطة الانقلاب = $\frac{س_{١} + س_{٢}}{٢}$

(١٢) أوجد أ ، ب بحيث يكون للمنحنى س^{٢} ص + أ ص + ب س^{٢} = ٠ نقطة انقلاب عند النقطة (١ ، -١).

nezakr.natega4dk.net

ارسم الشكل العام لمنحنى الدالة المتصلة د الذى له الخواص المعطاة فى كل مما يأتى:

(١٣) د(٠) = ٤ د(٣) = ٤ ، د′(س) < ٠ لكل س < ٢ ، د′(س) > ٠ لكل س > ٢ ، د″(س) < ٠

(١٤) د(١) = د(٥) = ٠ ، د′(س) < ٠ لكل س < ٣ ، د′(س) > ٠ لكل س > ٣ ، د″(س) < ٠ لكل س ≠ ٣

(١٥) د(-١) = ٢ د(٠) = ٤ ، د(١) = ٠ ، د′(١) = د′(-١) = ٠ ، د″(س) < ٠ لكل س < ٠ ، د″(س) > ٠ لكل س > ٠

(١٦) د(٣) = ٤ ، عند س < ٣ فإن د′(س) > ٠ ، د″(س) > ٠ وعند س > ٣ فإن د′(س) < ٠ ، د″(س) < ٠

ادرس تغيرات الدالة د وارسم الشكل العام لمنحناها فى كل مما يأتى:

(١٧) د(س) = س^{٢} - ٦س + ٥

(١٨) د(س) = ٣ - س^{٢}

(١٩) د(س) = س^{٣} - ٣س^{٢} + ٣

(٢٠) د(س) = $\frac{١}{٣}$ س^{٣} - س + ٢

(٢١) د(س) = $\frac{١}{٨}$ س^{٣} - $\frac{٣}{٢}$ س + ١

(٢٢) د(س) = - س (س - ٣)^{٢}

(٢٣) د(س) = (٢ - س) (س + ١)^{٢}

(٢٤) د(س) = $\frac{١}{٨}$ (س + ٤) (س - ٢)^{٢}

(٢٥) د(س) = { س^{٣} - ٣س^{٢} عندما س < ٠ ؛ س^{٢} - ٢س عندما س ≥ ٠ }

(٢٦) د(س) = س |س - ٤|

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net



تطبيقات على القيم العظمى والصغرى

٢ - ٤

Applications of Maxima and Minima

النمذجة الرياضية

Mathematical Modeling

سوف تتعلم

- النمذجة الرياضية

المصطلحات الأساسية

- نمذجة رياضية

Mathematical Modeling

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية


إن عملية اتخاذ قرار علمى فى حل أى مشكلة تمر بعدة مراحل تتلخص فى:

١- تحديد المشكلة (الهدف والإمكانات).

٢- وضع نموذج فكرى أو تصور لأبعاد المشكلة.

٣- إيجاد نموذج علمى مناسب.

٤- حل النموذج واتخاذ القرار.



والنمذجة الرياضية هى صياغة مشكلة ما وفق علاقات رياضية يطلق عليها النموذج الرياضى، **ويتلخص فى المخطط المقابل حيث يتضمن :**

١- تحديد المشكلة المطروحة غايتها ومكوناتها (ربح أعظم - تكلفة أقل - مساحة أكبر ...)

٢- تحديد مجاهيل المسألة التى يجب إيجاد قيمها للوصول إلى الغاية المطلوبة.

٣- بيان العلاقات بين المجاهيل (معادلات - متباينات).

٤- صياغة النموذج الرياضى وهو تمثيل للمشكلة بصورة رياضية قابلة للحل.

٥- حل النموذج الرياضى وتفسير نتائجه وفق طبيعة المسألة .

٦- تحديد البدائل المتاحة إذا كان للمسألة أكثر من حل واحد.

ويسهم حساب التفاضل فى حل النموذج الرياضى لمعظم مشكلات الحياة العملية حين يكون الهدف هو الحصول على أكبر قيمة أو أصغر قيمة لمتغير ما فى إطار القيم القصوى المحلية والقيم القصوى المطلقة كما فى الأمثلة التالية.

مثال

اختبار المشتقة الأولى

(١) أوجد بعدى مستطيل له أكبر مساحة يمكن رسمه داخل مثلث، طول قاعدته ١٦سم وارتفاعه ١٢سم، بحيث ينطبق بأحد أضلاعه على قاعدة المثلث وتقع رأسا الضلع المقابل على الضلعين الآخرين للمثلث.

الحل

١- لحساب أكبر مساحة نرسم المسألة تبعًا للمعطيات والقيود .

٢- تحديد المتغيرات (المجاهيل)


بفرض أن عرض المستطيل = س سم وطوله ص سم ومساحته = م سم^{٢}

nezakr.natega4dk.net

٣- العلاقات بين المتغيرات (النموذج الرياضى)

مساحة المستطيل م = س × ص

٤- وضع النموذج الرياضى فى متغير واحد إن أمكن



$\frac{ص}{١٦} = \frac{اء}{اب} = \frac{١٢ - س}{١٢}$ (من التشابه)

∴ ص = $\frac{٤}{٣}$ (١٢ - س)، س ∈ [٠، ١٢] (١)

مساحة المستطيل م = $\frac{٤}{٣}$ س (١٢ - س)

أى إن: م = د(س) = ١٦ س - $\frac{٤}{٣}$ س^{٢} (٢)

٥- حل النموذج الرياضى: باشتقاق طرفى العلاقة (٢) بالنسبة إلى س

∴ د$'$(س) = ١٦ - $\frac{٨}{٣}$ س ، د$''$(س) = - $\frac{٨}{٣}$

عند د$'$(س) = ٠ ∴ س = $\frac{١٦ \times ٣}{٨}$ = ٦ ويكون عندها د$''$(س) < ٠

∵ م لها نقطة حرجة وحيدة عند س = ٦ ، والمشتقة الثانية سالبة دائمًا ، فإن هذه النقطة الحرجة تعطى القيمة العظمى المطلقة.

∴ للدالة م قيمة عظمى مطلقة عند س = ٦ ، ص = $\frac{٨}{٣}$ (١٢ - ٦) = ٨

أى إن: للمستطيل أكبر مساحة عندما يكون بعداه ٦سم ، ٨سم


حاول أن تحل

(١) أوجد أكبر مساحة لمثلث متساوى ساقين يمكن رسمه داخل دائرة طول نصف قطرها ١٢سم.

مثال

حساب أقل تكلفة

(٢) يراد بناء صومعة حبوب على شكل أسطوانة رأسية ذات سقف نصف كُروى بحيث تتسع لتخزين ١٠٨πم^{٣} من الحبوب (بفرض أن تخزين الحبوب يتم فى الجزء الأسطوانى فقط دون السقف)، إذا كانت تكلفة وحدة المساحة من السقف ضعف تكلفة وحدة المساحة من الجدار الجانبى. ما أبعاد الصومعة التى تجعل التكلفة أقل ما يمكن؟



الحل

١- لحساب أقل تكلفة نرسم المسألة تبعًا للمعطيات والقيود.

٢- **تحديد المتغيرات:** نفرض أن ارتفاع الأسطوانة = ع مترًا، طول نصف قطر قاعدتها = نق مترًا وأن تكلفة وحدة المساحة من الجدار = جـ جنيهًا فتكون تكلفة وحدة المساحة من السقف = ٢ جـ جنيهًا والتكاليف الكلية = ك جنيهًا.

٣- **العلاقات بين المتغيرات (النمذجة):**

مساحة السطح الأسطوانى = محيط القاعدة × الارتفاع = ٢πنق ع وحدة مساحة

nezakr.natega4dk.net

مساحة السطح النصف كرى = $\frac{1}{2}$ مساحة الكرة = $2\pi نق^2$ وحدة مساحة

التكاليف الكلية ك = $2\pi نق ع \times$ جـ + $2\pi نق^2 \times 2$ جـ = $2\pi نق$ جـ (ع + نق)

٤- وضع النموذج الرياضى فى متغير واحد:

∵ حجم الجزء الأسطوانى = 108π ∴ $\pi نق^2 ع = 108\pi$ أى إن ع = $\frac{108}{نق^2}$

التكاليف الكلية ك = $2\pi نق$ جـ $(\frac{108}{نق^2} + 2نق)$

ك = د(نق) = 216π جـ $نق^{-1} + 4\pi$ جـ $نق^2$

٥- حل النموذج: د′(نق) = -216π جـ $نق^{-2} + 8\pi$ جـ نق

النقط الحرجة = عند د′(نق) = ٠ ∴ $نق^3 = \frac{216}{8}$ أى إن نق = ٣(نقطة وحيدة)

اختبار المشتقة الثانية:

∵ د″(نق) = 432π جـ $نق^{-3} + 8\pi$ جـ ∴ د″(٣) > ٠

أى إن: عندما يكون طول نصف قطر الأسطوانة الرأسية ٣ أمتار يكون للصومعة أقل تكاليف، ويكون ارتفاعها عندئذ $\frac{108}{9}$ = ١٢ مترًا.

حاول أن تحل

(٢) خزان على شكل صندوق مغلق سعته ٢٥٢ مترًا مكعبًا، وقاعدته مربعة. يراد طلاؤه من الداخل بمادة عازلة، يتكلف القاع ٥٠ جنيهًا لكل متر مربع، ويتكلف الغطاء ٢٠ جنيهًا لكل متر مربع، كما يتكلف الجوانب ٣٠ جنيهًا لكل متر مربع، أوجد أبعاد الصندوق التى تجعل التكلفة أقل ما يمكن.

مثال تطبيقات حياتية

(٣) جدار ارتفاعه ٢ متر ويبعد مترين عن أحد المنازل، أوجد طول أقصر سلم يصل من الأرض إلى المنزل مرتكزًا على الجدار.


الحل

١- لحساب أقصر طول للسلم نرسم المسألة تبعًا للمعطيات والقيود.

٢- تحديد المتغيرات: نفرض أن:

طول السلم = ل مترًا، ارتفاع قمة السلم عن الأرض = ص مترًا، بعد طرف السلم السفلى عن الجدار = س مترًا.

٣- نمذجة المسألة:



من فيثاغورث: $ل^2 = (س + 2)^2 + ص^2$ (١)

من التشابه: $\frac{ص}{2} = \frac{س + 2}{س}$

∴ ص = $\frac{2س + 4}{س} = 2 + 4س^{-1}$ (٢)

لإيجاد أقصر طول للسلم يكفى أن تكون $ل^2$ قيمة صغرى

٤- حل النموذج باشتقاق طرفى العلاقة (١)، (٢) بالنسبة إلى س.

∴ $\frac{د}{د س}(ل^2) = 2(س + 2) \times 1 + 2ص$ ، $\frac{د ص}{د س} = \frac{-4}{س^2}$

nezakr.nateg4dk.net

$\therefore \frac{د}{د س}(ل^{٢}) = ٢(س + ٢) + ٢\left(\frac{٢س + ٤}{س}\right) \times \frac{-٤}{س^{٢}} = ٢(س + ٢)\left(١ - \frac{٨}{س^{٣}}\right)$

س	٢	
إشارة $\frac{د}{د س}(ل^{٢})$	−	+
$ل^{٢}$	↘	↗

عند النقط الحرجة: $\frac{د}{د س}(ل^{٢}) =$ صفر

$\therefore س = -٢$ مرفوض أو $\frac{٨}{س^{٣}} = ١$

$\therefore س = ٢$

من اختبار المشتقة الأولى للتزايد والتناقص نلاحظ تغير إشارة $\frac{د}{د س}(ل^{٢})$ من - إلى +

$\therefore$ عند س = ٢ تكون $ل^{٢}$ أصغر ما يمكن

بالتعويض فى (٢) $\therefore ص = \frac{٢ \times ٢ + ٤}{٢} = ٤$

بالتعويض فى (١)

$\therefore ل^{٢} = (٢ + ٢)^{٢} + (٤)^{٢} = ٣٢$ $\therefore ل = ٤\sqrt{٢}$

أى إن: طول أقصر سلم يصل من الأرض إلى المنزل يساوى $٤\sqrt{٢}$ مترًا

حاول أن تحل

(٣) فى مستوى إحداثى متعامد رسم $\overleftrightarrow{أ ب}$ يمر بالنقطة جـ (٣، ٢) ويقطع محورى الإحداثيات فى النقطة أ والنقطة ب ، أثبت أن أصغر مساحة للمثلث أ و ب تساوى ١٢ وحدة مربعة حيث و نقطة الأصل (٠، ٠).

مثال القطاع الدائرى

(٤) قطعة معدنية على شكل قطاع دائرى مساحته ١٦سم^{٢} أوجد طول نصف قطر دائرة القطاع الذى يجعل محيطه أقل ما يمكن، وما قياس زاويته عندئذ؟

الحل

بفرض أن طول قوس القطاع ل سم ، طول نصف قطر دائرة القطاع = نق سم

$\therefore$ محيط القطاع ع = ٢ نق + ل (١)

$\because$ مساحة القطاع $= \frac{١}{٢}$ ل نق = ١٦ $\therefore ل = \frac{٣٢}{نق}$ (٢)

بالتعويض فى (١) $\therefore ع = ٢ نق + \frac{٣٢}{نق}$

باشتقاق طرفى العلاقة (٢) بالنسبة إلى نق

$\frac{د ع}{د نق} = ٢ - \frac{٣٢}{نق^{٢}}$ ، $\frac{د^{٢} ع}{د نق^{٢}} = \frac{٦٤}{نق^{٣}}$

عندما $\frac{د ع}{د نق} = ٠$ نق = ٤ ، $\frac{د^{٢} ع}{د نق^{٢}} > ٠$

$\therefore$ عند نق = ٤ يكون محيط القطاع أقل ما يمكن

$\because$ مساحة القطاع $= \frac{١}{٢} نق^{٢} \theta^{د}$ $\therefore \theta = \frac{٢ \times ١٦}{٤ \times ٤} = ٢^{د}$

حاول أن تحل

(٤) إذا كان محيط قطاع دائرى = ١٢سم، أوجد قياس زاوية القطاع الذى يجعل مساحته أكبر ما يمكن.

nezakr.natega4dk.net



تمـارين ٢ - ٤

(١) عددان مجموعهما ٣٠ وحاصل ضربهما أكبر ما يمكن، أوجد العددين.

(٢) عددان صحيحان موجبان مجموعهما ٥، ومجموع مكعب أصغرهما وضعف مربع الآخر أصغر ما يمكن، أوجد العددين.

(٣) أوجد العدد الموجب الذى إذا أضيف إليه معكوسه الضربى كان الناتج أصغر ما يمكن.

(٤) أوجد أكبر مساحة من الأرض مستطيلة الشكل يمكن أن تُحاط بسياج طوله ١٢٠ مترًا.

(٥) قطاع دائرى محيطه ٣٠سم، ومساحته أكبر ما يمكن، أوجد طول نصف قطر دائرته.

(٦) علبة على هيئة متوازى مستطيلات، قاعدتها مربعة الشكل . إذا كان مجموع جميع أحرفها يساوى ٢٤٠سم، فأوجد أبعادها حتى يصير حجمها أكبر ما يمكن.

(٧) إذا كان طول وتر مثلث قائم الزاوية يساوى ١٠سم، فأوجد طول كل من ضلعى القائمة عندما تصبح مساحة المثلث أكبر ما يمكن.

(٨) حقل مفتوح يحدُّه من أحد الجوانب نهر مستقيم . حدد كيفية وضع سياج حول الجوانب الأخرى من قطعة أرض مستطيلة من الحقل للإحاطة بأكبر مساحة ممكنة بواسطة ٨٠٠ متر من السياج، وما مساحة هذه الأرض حينئذ؟

(٩) تُصَنْع علب أسطوانية الشكل مغلقة لتعبئة المشروبات، سعة كل منهما ك من وحدات الحجم بأقل قدر من المادة ، أوجد نسبة ارتفاع العلبة (ع) إلى طول نصف قطر قاعدتها (نق).

(١٠) ملعب على شكل مستطيل ينتهى بنصفى دائرتين، إذا كان محيط الملعب ٤٢٠ مترًا، فأوجد أكبر مساحة له.

(١١) مثلث قائم الزاوية طول وتره ٣٠سم ، أوجد طول كل من ضلعيه الآخرين إذا كان طول العمود النازل من رأس الزاوية القائمة على الوتر أكبر ما يمكن.

(١٢) قطعة من الورق المقوى على شكل مستطيل، بعداه ١٥سم ، ٢٤سم، قُطِعَ من أركانها الأربعة مربعات متطابقة، طول ضلع كل منها س سم، ثم ثُنيت الأجزاء البارزة لأعلى لتكون علبة بدون غطاء . احسب أبعاد العلبة عندما يكون لها أكبر حجم ممكن.

(١٣) خزان مفتوح، قاعدته مربعة، وجوانبه رأسية، يسع كمية معينة من الماء . أثبت أن تكاليف طلاء الخزان من الداخل بطبقة منتظمة عازلة تكون أقل ما يمكن إذا كان عمقه يساوى نصف طول ضلع قاعدته.

(١٤) أوجد أقرب نقطة إلى النقطة (٠، ٥) وتقع على المنحنى ص = $\frac{١}{٢}$ س^{٢} - ٤ .

(١٥) أوجد أقصر بعد بين المستقيم س - ٢ص + ١٠ = ٠ والمنحنى ص^{٢} = ٤س .

nezakr.nateg4dk.net

(١٦) أ ب جـ مثلث حيث أ، ب ثابتان . أوجد قياس الزاوية المحصورة بينهما والتى تجعل مساحة المثلث أكبر ما يمكن.

(١٧) تُعطى شدة التيار ت (بالأمبير) فى دائرة للتيار المتردد عند أى لحظة ن (ثانية) بالعلاقة ت = ٢ جتا ن + ٢ جا ن، ما أقصى قيمة للتيار فى هذه الدائرة.

(١٨) ينمو حجم مزرعة بكتيريا موضوعة فى وسط غذائى طبقًا للعلاقة د(ن) = $٢٠٠٠ + \frac{٥٠٠٠ ن}{١٠٠ + ن^{٣}}$، حيث الزمن ن مقيس بالساعات ، عين القيمة العظمى لحجم المزرعة.

(١٩) أ ب جـ ء مربع طول ضلعه ١٠سم ، م ∈ $\overline{ب جـ}$ بحيث ب م = س سم ، ن ∈ $\overline{جـ ء}$ بحيث جـ ن = $\frac{٣}{٢}$ س . أوجد قيمة س التى تجعل مساحة △ أ م ن أصغر ما يمكن.

(٢٠) $\overline{أ ب}$ قطر فى دائرة طول نصف قطرها ق رُسم مماسان للدائرة عند كل من أ ، ب من النقطة هـ على الدائرة رسم مماس آخر للدائرة قطع المماسين السابقين من ء ، جـ على الترتيب . أثبت أن أصغر مساحة لشبه المنحرف أ ب جـ ء تساوى ٢ق^{٢} وحدة مربعة.

nezakr.natega4dk.net



الوحدة الثالثة

التكامل المحدد وتطبيقاته

The Definite Integral and its Applications

مقدمة الوحدة

هل رأيت صانع السلال وهو يصنع إحدى سلاله؟ إن عملية تجميع الشرائح المتوازية جنبًا إلى جنب يؤدى إلى تكامل سلته. ساعد ذلك إلى محاولة العلماء اكتشاف طرق عامة لتقدير مساحة أى منطقة مستوية بتقسم أي منطقة مستوية إلى مناطق صغيرة جدًّا ثم جمع مساحات هذه المناطق الصغيرة لتقدير المساحة المطلوبة مما ساهم في اكتشاف علم التكامل ورمز لعملية التكامل بالرمز $\int$ وهو الحرف الأول من كلمة Sum والتي تعني عملية التجميع، فى هذه الوحدة ستعرف طرق مختلفة لحساب التكامل غير المحدد مثل التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزئ لإيجاد مجموعة المشتقات العكسية لدالة متصلة على فترة معطاة ثم التعرف على التكامل المحدد من خلال النظرية الأساسية فى التفاضل والتكامل التى تربط بين التكامل المحدد والتكامل غير المحدد واستخدام التكامل المحدد فى إيجاد مساحة منطقة مستوية أو حجم جسم دورانى كما تتعرف على بعض التطبيقات الاقتصادية للتكامل المحدد واستخدام النمذجة الرياضية فى حل المشكلات الرياضية والحياتية .

مخرجات التعلم

بعد دراسة هذه الوحدة، وتنفيذ الأنشطة فيها، يتوقع من الطالب أن:

- يتعرف تكامل الدالة الآسية، $\int \frac{د(ر)}{د(ر)}$ و س
- يتعرف بعض طرق التكامل مثل: التعويض غير المثلثى، التكامل بالتجزىء $\int$ س هـ^{س} و س
- يتعرف التكامل المحدد (النظرية الأساسية فى التفاضل) ويستنتج بعض خواصه.
  - $\int_{ب}^{ا}$ د (س) و س = $-\int_{ا}^{ب}$ د (س) و س
  - $\int_{ا}^{ا}$ د(س) و س = ٠
  - $\int_{ا}^{ب}$ ك د (س) و س = ك $\int_{ا}^{ب}$ د (س) و س
  - $\int_{ا}^{ب}$ [د (س) ± ر (س)] و س
    = $\int_{ا}^{ب}$ د (س) و س ± $\int_{ا}^{ب}$ ر (س) و س
  - $\int_{ا}^{ب}$ د(س) و س + $\int_{ب}^{جـ}$ د(س) و س = $\int_{ا}^{جـ}$ د(س) و س
  - $\int_{-ا}^{ا}$ د(س) و س = ٢ . $\int_{٠}^{ا}$ د (س) و س حيث د دالة زوجية.
  - $\int_{-ا}^{ا}$ د (س) و س = ٠ حيث د دالة فردية.
- يوجد مساحة المنطقة المستوية بين منحنى ومحور السينات .
- يستخدم التكامل المحدد فى حل مشكلات تتضمن إيجاد حجم سطح دورانى حول محور السينات.

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

المصطلحات الأساسية

مشتقة عكسية	*Antiderivative*	قاعدة	*Rule*	حجوم الأجسام الدورانية	*Volumes of Revolution solids*
تكامل غير المحدد	*Indefinite Integral*	تكامل محدد	*Definite Integral*		
تفاضلى	*Differential*	النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل	*Fundamental theorem of calculus*		
تكامل بالتعويض	*Integration by Substitution*				
تكامل بالتجزئ	*Integration by Parts*	المساحات فى المستوى	*Areas in the plane*		

دروس الوحدة

الدرس (٣ - ١): تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية.

الدرس (٣ - ٢): طرق التكامل.


الدرس (٣ - ٣): التكامل المحدد.

الدرس (٣ - ٤): تطبيقات على التكامل المحدد.

الأدوات والوسائل

- آلة حاسبة علمية - برامج رسومية للحاسوب.
- الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).

مخطط تنظيمى للوحدة



nezakr.nateqa4d.net

٣-١ تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية

Integrals of Exponential and Logarithmic Function

سوف تتعلم

- تكامل الدوال الأسية واللوغاريتمية.
- تطبيقات هندسية.
- تطبيقات فيزيائية.


المصطلحات الأساسية

- مشتقة عكسية Antiderivative
- تكامل Integration
- تكامل غير محدد Indefinite integral
- ثابت اختياري Arbitrary constant

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية للحاسب الآلي.

استكشف



من دراستك السابقة فى التفاضل تعلم أن مشتقة الدالة و بالنسبة إلى س حيث و(س) = هـ^{س} + ٥ هى و′(س) = هـ^{س}

إذا رمزنا للدالة و′(س) بالرمز د(س) فإننا نستطيع بعملية عكسية (التكامل غير المحدد) إيجاد عدد غير محدد من الدوال الأخرى (ت(س) + ث) مشتقة كل منها يساوى د(س) تسمى بمجموعة المشتقات العكسية للدالة د إحداها يساوى و(س) حيث:

$\int$ د(س) دس = ت(س) + ث حيث ث ثابت اختيارى

استكشف مجموعة المشتقات العكسية لكل من:

د(س) = ٥هـ^{٥س} ، ر(س) = ٨هـ^{س٤} ، و(س) = $\frac{١}{س}$

تعلم

التكامل غير المحدد للدالة الأسية

Indefinite Integrals of Exponential Function

إذا كان ك عددًا حقيقيًّا حيث ك ≠ ٠

فإن: $\int$ هـ^{س} دس = هـ^{س} + ث

، $\int$ هـ$^{ك س}$ دس = $\frac{١}{ك}$ هـ$^{ك س}$ + ث حيث ث ثابت اختيارى

مثال

١ أوجد:

أ $\int$ هـ^{٧س} دس ب $\int$ هـ$^{-\frac{٣}{٤}ص}$ دص جـ $\int$ ٨هـ^{ع٢} دع

الحل

أ $\int$ هـ^{٧س} دس = $\frac{١}{٧}$ هـ^{٧س} + ث

nezakr.natega4dk.net

ب $\int هـ^{-\frac{٣}{٤}ص}\,وص = \frac{١}{-\frac{٣}{٤}} هـ^{-\frac{٣}{٤}ص} + ث = -\frac{٤}{٣} هـ^{-\frac{٣}{٤}ص} + ث$

ج $\int ٨هـ^{ع^٢}\,وع = ٨\int هـ^{ع^٢}\,وع = \frac{٨}{٢} هـ^{ع^٢} + ث = ٤هـ^{ع^٢} + ث$

تذكر أن

$\int د(س)\,وس = \int د(س)\,وس$

حاول أن تحل

(١) أوجد

أ $\int \pi هـ^{س}\,وس$ ب $\int -هـ^{-ع}\,وع$ ج $\int -٦هـ^{٠,٢ص}\,وص$ د $\int ٣\sqrt{٢}\,هـ^{-٢ن}\,ون$

مثال

(٢) أوجد كل من التكاملات التالية:

أ $\int \frac{هـ^{س} + هـ^{-س}}{٢}\,وس$ ب $\int \frac{٣هـ^{س} - ٢هـ^{٢س}}{٢هـ^{س}}\,وس$

الحل

أ $\int \frac{هـ^{س} + هـ^{-س}}{٢}\,وس = \frac{١}{٢}\int (هـ^{س} + هـ^{-س})\,وس$

$= \frac{١}{٢}[\int هـ^{س}\,وس + \int هـ^{-س}\,وس]$

$= \frac{١}{٢}(هـ^{س} - هـ^{-س}) + ث$

ب $\int \frac{٣هـ^{س} - ٢هـ^{٢س}}{٢هـ^{س}}\,وس = \int \frac{٣}{٢}\,وس - \int هـ^{س}\,وس$

$= \frac{٣}{٢}س - هـ^{س} + ث$

تذكر أن

$\int [د(س) \pm ر(س)]\,وس$
$= \int د(س)\,وس \pm \int ر(س)\,وس$

حاول أن تحل

(٢) أوجد:

أ $\int \frac{هـ^{س} + هـ^{-س}}{هـ^{س}}\,وس$ ب $\int (س^٢ + ٢هـ^{س})\,وس$ ج $\int (س^{٢هـ} + هـ^{٣س})\,وس$

لاحظ أن: إذا كانت د(س) دالة قابلة للاشتقاق فإن:

$$\int هـ^{د(س)} \times د'(س)\,وس = هـ^{د(س)} + ث$$

مثال

(٣) أ $\int جا\,س\,هـ^{جتا\,س}\,وس$ ب $\int ٤س\,هـ^{س^٢+١}\,وس$

الحل

أ بوضع د(س) = جتا س ∴ د'(س) = - جا س

$\int جا\,س\,هـ^{جتا\,س}\,وس = -\int هـ^{جتا\,س}(-جا\,س)\,وس = -هـ^{جتا\,س} + ث$

ب بوضع د(س) = $س^٢ + ١$ ∴ د'(س) = ٢س

$\int ٤س\,هـ^{س^٢+١}\,وس = ٢\int هـ^{س^٢+١}(٢س)\,وس = ٢هـ^{س^٢+١} + ث$

nezakr.natega4dk.net



حاول أن تحل

(٣) أوجد التكاملات التالية:

(أ) $\int$ (جتا س هـ$^{\text{جاس}}$ + ٣س^{٢}) ؤس

(ب) $\int$ (س - ٣) هـ$^{\text{س}^{٢}-٦\text{س}+٥}$ ؤس

التكامل غير المحدد لدوال تؤول لدوال لوغارتيمية *Indefinite Integral of Logarithmic Functions*

تعلم أن $\frac{\text{ك}}{\text{ؤس}}$ (لو$_{\text{هـ}}$ س) = $\frac{١}{\text{س}}$ حيث س > ٠ ، $\frac{\text{ك}}{\text{ؤس}}$ (لو$_{\text{هـ}}$ - س) = - $\frac{١}{\text{س}}$ حيث س < ٠

وبوجه عام فإن $\frac{\text{ك}}{\text{ؤس}}$ لو$_{\text{هـ}}$ |س| = $\frac{١}{\text{س}}$ حيث س ≠ ٠

أى إن الدالة لو$_{\text{هـ}}$ |س| حيث س ≠ ٠ إحدى المشتقات العكسية للدالة $\frac{١}{\text{س}}$

وعلى ذلك فإن: $\int \frac{١}{\text{س}}$ ؤس = لو$_{\text{هـ}}$ |س| + ث حيث س ≠ ٠

مضاعفات الدالة

مثال

(٤) أوجد كلًّا من التكاملات التالية:

(أ) $\int \frac{٢}{\text{س}}$ ؤس (ب) $\int \frac{٧}{\text{س لو}_{\text{هـ}}^{٣}}$ ؤس

الحل

(أ) $\int \frac{٢}{\text{س}}$ ؤس = ٢ $\int \frac{١}{\text{س}}$ ؤس = ٢ لو$_{\text{هـ}}$ |س| + ث حيث س ≠ ٠

(ب) $\int \frac{٧}{\text{س لو}_{\text{هـ}}^{٣}}$ ؤس = $\frac{٧}{\text{لو}_{\text{هـ}}^{٣}}$ $\int \frac{١}{\text{س}}$ ؤس = $\frac{٧}{\text{لو}_{\text{هـ}}^{٣}}$ لو$_{\text{هـ}}$ |س| + ث حيث س ≠ ٠

حاول أن تحل

(٤) أوجد:

(أ) $\int \frac{\text{لو}_{\text{هـ}}^{٣}}{\text{س}}$ ؤس (ب) $\int \frac{٤}{٣\text{س لو}_{\text{هـ}}^{٥}}$ ؤس (جـ) $\int \frac{\text{لو}_{\text{هـ}}^{\text{س}^{٢}}}{\text{س لو}_{\text{هـ}}^{\text{س}^{٣}}}$ ؤس

nezakr.natega4dk.net

مثال

(٥) أوجد كلًّا من التكاملات الآتية:

أ $\int \left(٣س^{٢} + \frac{٥}{س}\right) وس$ ب $\int \left(\frac{٢هـ}{س} + \frac{س}{هـ}\right) وس$ ج $\int \frac{(٣س - ١)^{٢}}{٣س}$

الحل

أ $\int \left(٣س^{٢} + \frac{٥}{س}\right) وس = \int ٣س^{٢} وس + \int \frac{٥}{س} وس = س^{٣} + ٥ \text{ لو}_{هـ} |س| + ث$

ب $\int \left(\frac{٢هـ}{س} - \frac{س}{هـ}\right) وس = ٢هـ \int \frac{١}{س} وس - \frac{١}{هـ} \int س وس = ٢هـ \text{ لو}_{هـ} |س| - \frac{س^{٢}}{٢هـ} + ث$

ج $\int \frac{(٣س - ١)^{٢}}{٣س} وس = \int \frac{٩س^{٢} - ٦س + ١}{٣س} وس = \int \left(٣س - ٢ + \frac{١}{٣س}\right) وس$

$= \frac{٣س^{٢}}{٢} - ٢س + \frac{١}{٣} \text{ لو}_{هـ} |س| + ث \quad$ حيث س $\neq ٠$

حاول أن تحل

(٥) أوجد كلًّا من التكاملات الآتية:

أ $\int \frac{٦س^{٢} - ٥}{٣س} وس$ ب $\int \frac{س^{٢} - ٤}{س^{٣} - ٢س} وس$ ج $\int \left(\sqrt{س} - \frac{٣}{\sqrt{س}}\right)^{٢} وس$

لاحظ أن: إذا كانت د دالة قابلة للاشتقاق، د(س) $\neq ٠$ فإن $\int \frac{١}{د(س)} د'(س) وس = \text{ لو}_{هـ} |د(س)| + ث$

مثال

(٦) أوجد كلًّا من التكاملات التالية:

أ $\int \frac{٤}{١ + ٢س} وس$ ب $\int \frac{٢س + ٣}{س^{٢} + ٣س - ٢} وس$ ج $\int ظا س وس$

الحل

أ $\because (١ + ٢س)' = ٢ \quad \therefore \int \frac{٤}{١ + ٢س} وس = ٢ \int \frac{(١ + ٢س)'}{١ + ٢س} وس = ٢ \text{ لو}_{هـ} |١ + ٢س| + ث$

ب $\because (س^{٢} + ٣س - ٢)' = ٢س + ٣$

$\therefore \int \frac{٢س + ٣}{س^{٢} + ٣س - ٢} وس = \text{ لو}_{هـ} |س^{٢} + ٣س - ٢| + ث$

ج $\int ظا س وس = \int \frac{جا س}{جتا س} وس = - \text{ لو}_{هـ} |جتا س| + ث = \text{ لو}_{هـ} |قا س| + ث$

حاول أن تحل

(٦) أوجد كلًّا من التكاملات الآتية:

أ $\int ظتا س وس$ ب $\int \frac{س^{٢} - ٤}{س^{٢} + ٢س} وس$ ج $\int \frac{(س^{٢} + ٢) وس}{س^{٣} + ٦س + ١}$


نتيجة نت
nezakr.nateg4dk.net

مثال

(٧) **تطبيقات هندسية:** منحنى ميل المماس له عند أى نقطة عليه (س ، ص) يساوى $\frac{٣س + ٢}{س}$ أوجد معادلة المنحنى إذا عُلم أنه يمر بالنقطة (هـ ، ٣هـ + ٥)

الحل

بفرض معادلة المنحنى ص = د(س)



∵ ميل المماس عند أى نقطة = $\frac{ص}{س} = \frac{٣س + ٢}{س}$

∴ ص = $\int \frac{ص}{س} س = \int (٣ + \frac{٢}{س}) س$

∴ ص = ٣س + ٢ لو$_{هـ}$ س + ث حيث ث ثابت إختيارى

∵ المنحنى يمر بالنقطة (هـ ، ٣هـ + ٥) فهى تحقق معادلته أى إن:

٣هـ + ٥ = ٣ (هـ) + ٢ لو$_{هـ}$ هـ + ث ∴ ث = ٣

و تكون معادلة المنحنى هى: ص = ٣س + ٢ لو$_{هـ}$ س + ٣

حاول أن تحل

(٧) ميل المماس لمنحنى الدالة د عند أى نقطة عليه (س ، ص) يساوى $\frac{١}{٣س - هـ}$ وكان د(هـ) = $\frac{١}{٢}$ أوجد د(٢هـ)

مثال

(٨) **تطبيقات فيزيائية:** إذا كان معدل التغير فى مساحة سطح صفيحة م (بالسنتيمتر المربع) بالنسبة للزمن ن (بالثانية) يتعين بالعلاقة $\frac{م}{ن} = هـ^{-٠,١ن}$ وكانت مساحة الصفيحة عند بداية التغير تساوى ٨٠سم^{٢}، أوجد مساحة سطح الصفيحة بعد ١٠ ثوانٍ.

الحل

مساحة سطح الصفيحة م = $\int \frac{م}{ن} ن = \int هـ^{-٠,١ن} ن$

∴ م = ـ١٠هـ$^{-٠,١ن}$ + ث

عند بداية التغير ن = ٠ ، م = ٨٠ ∴ ث = ٩٠

ويكون مساحة سطح الصفيحة فى أى لحظة م = ٩٠ - ١٠هـ$^{-٠,١ن}$

بعد ١٠ ثوانٍ ∴ مساحة سطح الصفيحة = ٩٠ - ١٠هـ$^{-١}$ سم^{٢}

حاول أن تحل

(٨) اذا كان معدل تغير مبيعات أحد المصانع يتناسب عكسيًّا مع الزمن بالأسابيع، وكانت مبيعات المصنع بعد أسبوعين و٤ أسابيع هى على الترتيب ٢٠٠، ٣٠٠ وحدة. أوجد مبيعات المصنع بعد ٨ أسابيع.

nezakr.nateg4dk.net

تمـارين ٣ - ١

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(١) إذا كان د$'$(س) = $\frac{١}{٢}$ [هـ^{س} + هـ$^{-س}$] ، د(٠) = ١ ، د$'$(٠) = ٠ فإن د(س) تساوى:

(أ) - د$'$(س) (ب) د$'$(س) (ج) -د$'$(س) (د) د$'$(س)

(٢) إذا كان ميل المماس لمنحنى عند أى نقطة عليه (س ، ص) يساوى ٤هـ^{٣س} ، د(٠) = ٢ فإن د(-٢) تساوى:

(أ) ٤ (ب) ٤هـ$^{-٤}$ (ج) ٢هـ$^{-٤}$ (د) ٢هـ

(٣) $\int$ طاθ ىθ تساوى

(أ) - لو$_{هـ}$ |جتاθ| + ث (ب) - لو$_{هـ}$ جتاθ + ث (ج) لو$_{هـ}$ جتاθ + ث (د) |لو$_{هـ}$ جتاθ| + ث

(٤) $\int$ ٤س هـ$^{س^{٢}}$ ى س تساوى

(أ) $\frac{١}{٢}$ هـ$^{س^{٢}}$ + ث (ب) هـ$^{س^{٢}}$ + ث (ج) ٢هـ$^{س^{٢}}$ + ث (د) ٤هـ$^{س^{٢}}$ + ث

أوجد كلًا من التكاملات الآتية:

(٥) $\int$ هـ^{٤س} ى س (٦) $\int$ (٣س^{٢} + ٢هـ^{س}) ى س (٧) $\int$ ($\frac{٤}{س}$ - هـ$^{-س}$) ى س

(٨) $\int$ هـ$^{١-٣س}$ ى س (٩) $\int \frac{٧}{٣}$ هـ$^{٣س-٤}$ ى س (١٠) $\int$ ٢هـ^{س} (هـ^{س} + ١)^{٢} ى س

(١١) $\int \frac{هـ^{٣س} + ٢هـ^{٢س} + ٤}{هـ^{س}}$ ى س (١٢) $\int$ س^{٢} هـ$^{س^{٣}+١}$ ى س (١٣) $\int \frac{٢هـ^{س}}{هـ^{س}+١}$ ى س

(١٤) $\int \frac{ى س}{٤س-١}$ (١٥) $\int \frac{س}{س^{٢}+١}$ ى س (١٦) $\int \frac{قا^{٢}س}{ظاس}$ ى س

(١٧) $\int \frac{جاس + جتاس}{جاس - جتاس}$ ى س (١٨) $\int \frac{جتاس}{١ + جاس}$ ى س (١٩) $\int \frac{قاس ظاس}{قاس - ١}$ ى س

(٢٠) $\int \frac{١}{(س لو س)_{هـ}}$ ى س (٢١) $\int \frac{٢س}{(س+١)^{٢}}$ ى س (٢٢) $\int \frac{(لوس)^{٢}}{س}$ ى س

(٢٣) $\int \frac{٣س^{٢}}{س^{٣}-١}$ ى س (٢٤) $\int \frac{٣س^{٢} - ٥}{س^{٣} - ٥س + ١}$ ى س (٢٥) $\int \frac{٤هـ^{س} + س هـ^{٣س}}{س هـ^{س}}$ ى س

(٢٦) $\int \frac{٤}{س لو_{هـ} ٣س}$ ى س (٢٧) $\int \frac{(١ + لو س)^{٢}}{هـ^{س}}$ ى س

(٢٨) **تطبيقات هندسية:** إذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة د عند أى نقطة (س ، ص) يساوى ٢هـ$^{-\frac{١}{٣}س}$، د(٠) = ١ أوجد د(٣)

nezakr.natega4dk.net



٣-٢ طرق التكامل

Methods of Integration

سوف تتعلم

- إيجاد الدالة الأصلية لدالة معطاة.
- إيجاد تفاضلى دالة.
- حساب التكامل بالتعويض.
- حساب التكامل بالتجزئ.

المصطلحات الأساسية


- المشتقة العكسة Antiderivative
- التكامل غير المحدد Indefinite Integral
- تفاضلى Differential

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية.
- برامج رسومية للحاسب.

مقدمة

سبق وتعرفت على المشتقة العكسية أو التكامل غير المحدد، وهو عملية عكسية لعملية الاشتقاق، فيقال للدالة ت أنها مشتقة عكسية للدالة د فى فترة ف إذا كان: $\frac{ء}{ء س}$ ت (س) = د (س) لكل س ∈ ف



عند إضافة أى ثابت للمشتقة العكسية ت، (يعرف بالثابت الاختيارى) تُمثَّل المشتقة العكسية عندئذ بمجموعة المنحنيات ص = ت (س) + ث التى تختلف عن بعضها فى الثابت ث وميل المماس لأى منها متساوى لذلك فهى منحنيات متوازية كما فى الشكل المقابل، وقد اصطلح على تسمية مجموعة المشتقات العكسية هذه بالتكامل غير المحدد ويرمز له بالرمز: $\int$ د (س) ء س ويكون:

$$\int د(س)\, ء س = ت(س) + ث$$

للتكامل غير المحدد الخواص التالية:

إذا كانت د ، ر دالتين لهما مشتقتان عكسيتان فى الفترة ف فإن:

١- $\int$ [د (س) ± ر (س)] ء س = $\int$ د (س) ء س ± $\int$ ر (س) ء س

٢- $\int$ ك د (س) ء س = ك $\int$ د (س) ء س حيث ك عدد حقيقى ثابت

لاحظ أن:

$\int س^{ن} ء س = \frac{س^{ن+١}}{ن+١} + ث$ حيث ن ≠ -١ ، ث ثابت اختيارى

وعلى ذلك

$\int (٣س^{٢} + ٤س + ٥)\, ء س = س^{٣} + ٢س^{٢} + ٥س + ث$

عملية إيجاد المشتقات العكسية يتطلب معرفة صور التكاملات القياسية لبعض الدوال، إلا أن التكاملات المطلوب إيجادها قد تظهر بعيدة عن التكاملات القياسية وهو أمر يتطلب التعرف على طرق أخرى للتكامل منها التكامل بالتعويض والتكامل بالتجزىء اعتمادًا على تفاضلى الدالة.

nezakr.natega4dk.net

التفاضلات Differentials

إذا كانت د دالة قابلة للاشتقاق ، حيث ص = د (س)


من تعريف المشتقة:

$\frac{ى ص}{ى س} = د'(س) = \lim_{\Delta س \to 0} \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \lim_{\Delta س \to 0} \frac{د(س + \Delta س) - د(س)}{\Delta س}$

∴ عندما $\Delta س \to 0$ فإن: $\frac{\Delta ص}{\Delta س} \to د'(س)$

أى أن: $\frac{\Delta ص}{\Delta س} \simeq د'(س)$ عندما $\Delta س \simeq 0$ ، $\Delta س \neq 0$

∴ $\Delta ص \simeq د'(س) \Delta س$ (بالضرب × $\Delta س$)



تعريف

لتكن د دالة قابلة للاشتقاق على فترة مفتوحة تحوى س ، $\Delta س$ يرمز للتغير فى س حيث $\Delta س \neq 0$ فإن

١- تفاضلى ص (ويرمز له بالرمز ى ص) = $د'(س) \Delta س$

٢- تفاضلى س (ويرمز بالرمز ى س) = $\Delta س$

على ذلك فإن:

$ى ص = د'(س) ى س$ وهو دالة فى متغيرين س ، ى س

إذا كانت $ص = س^{٣}$ فإن : $ى ص = ٣س^{٢}$ ى س

مثال تفاضلى الدالة

(١) أوجد تفاضلى كل مما يأتى:

(أ) $ص = \frac{س}{س - ١}$ (ب) $ع = \frac{٤}{٣} \pi نق^{٣}$

(جـ) ص = ع . ل حيث كل من ع ، ل دالة فى س

الحل

(أ) ∵ $ى ص = ص' ى س$ ، $ص = \frac{س}{س - ١} = ١ + \frac{١}{س - ١} = ١ + (س - ١)^{-١}$

∴ $ى ص = \frac{-١}{(س - ١)^{٢}} ى س$

(ب) ∵ $ى ع = ع' ى نق$

∴ $ى ع = \frac{٤}{٣} \pi \times ٣ نق^{٢} ى نق = ٤ \pi نق^{٢} ى نق$

(جـ) ∵ $ى ص = (ع \cdot ل)' ى س$

$= (ع \cdot ل' + ل \cdot ع') ى س$

$= ع \cdot ل' ى س + ل \cdot ع' ى س$

$ى ص = ع ى ل + ل ى ع$

لاحظ أن

$ى ل = ل' ى س$

$ى ع = ع' ى س$

نتيجة نت
nezakr.nateg4dk.net



حاول أن تحل

(١) أوجد تفاضلى كل من:

(أ) ص = (٢س + ٥)^{٤} (ب) ص = هـ$^{٢س-٣}$

تفكير ناقد: إذا كان س^{٢} + ص^{٢} = ٢٥ أوجد: $\frac{د ص}{د س}$ بدلالة س ، ص، $\frac{د س}{د ص}$

التكاملات الأساسية (القياسية)

لا توجد طريقة عامة لإيجاد تكامل الدوال المختلفة تماثل طرق إيجاد مشتقات هذه الدوال، إذ ينحصر إيجاد تكامل أى دالة د فى البحث عن دالة تكون مشتقاتها هى الدالة د وهذا يتوقف على مدى استيعابك لمشتقات الدوال الأساسية السابق دراستها، والتى نلخصها فى الجدول التالى:

جدول مشتقات الدوال الأساسية والتكاملات القياسية المناظرة	
$\frac{د}{د س}$ (س^{ن}) = ن س$^{ن-١}$ ، ن ∈ ع	$\int$ س^{ن} د س = $\frac{س^{ن+١}}{ن+١}$ + ث ، ن ∈ ع - {-١}
$\frac{د}{د س}$ (جا س) = جتا س	$\int$ جتا س د س = جا س + ث
$\frac{د}{د س}$ (جتا س) = - جا س	$\int$ جا س د س = - حتا س + ث
$\frac{د}{د س}$ (طا س) = قا^{٢}س ، س ≠ $\frac{(٢ن+١)\pi}{٢}$ ، ن ∈ ص	$\int$ قا^{٢} س د س = ظا س + ث ، س ≠ $\frac{(٢ن+١)\pi}{٢}$ ، ن ∈ ص $\int$ قتا^{٢} س د س = -ظتا س + ث ، س ≠ ن π ، ن ∈ ص $\int$ قا س ظا س د س = قا س + ث $\int$ قتا س ظتا س د س = -قتا س + ث
$\frac{د}{د س}$ (هـ^{س}) = هـ^{س}	$\int$ هـ^{س} د س = هـ^{س} + ث
$\frac{د}{د س}$ (ا^{س}) = ا^{س} لو$_{هـ}$ ا ، ا > ٠ ، ا ≠ ١	$\int \frac{١}{س}$ د س = لو$_{هـ}$ |س| + ث ، س ≠ ٠
$\frac{د}{د س}$ (لو$_{هـ}$ س) = $\frac{١}{س}$ ، س > ٠	

التكامل بالتعويض

Integration by Substitntion


من أهم طرق التكامل لإيجاد تكامل حاصل ضرب دالتين على الصورة: $\int$ د (ر (س)) ر′(س) د س

فإذا كانت ع = ر (س) دالة قابلة للاشتقاق

فإن $\frac{د ع}{د س}$ = ر′(س) ويكون: $\frac{د س}{د ع}$

$\int$ د (ر (س)) ر′(س) د س = $\int$ د (ع) د ع

لإجراء عملية التكامل بالتعويض نتبع المخطط المقابل:



nezakr.nategа4dk.net

مثال التكامل بالتعويض

(٢) أوجد

(أ) $\int$ س^{٣} (٢ س^{٤} - ٧)^{٥} د س

(ب) $\int \frac{\text{س} + ٤}{(\text{س}^{٢} + ٨\text{س})^{٣}}$ د س

الحل

(أ) بوضع ع = ٢س^{٤} - ٧ ∴ د ع = ٨س^{٣} د س

$\int$ س^{٣} (٢س^{٤} - ٧)^{٥} د س $= \frac{١}{٨} \int$ (٢س^{٤} - ٧)^{٥} (٨س^{٣} د س)

ع د ع

$= \frac{١}{٨} \int$ ع^{٥} د ع $= \frac{١}{٦ \times ٨}$ ع^{٦} + ث

$= \frac{١}{٤٨}$ (٢ س^{٤} - ٧)^{٦} + ث

(ب) بوضع ع = س^{٢} + ٨س ∴ د ع = (٢س + ٨) د س = ٢ (س + ٤) د س

$\int \frac{\text{س} + ٤}{(\text{س}^{٢} + ٨\text{س})^{٣}}$ د س $= \frac{١}{٢} \int \frac{٢(\text{س} + ٤)\,\text{د س}}{(\text{س}^{٢} + ٨\text{س})^{٣}} = \frac{١}{٢} \int \frac{١}{\text{ع}^{٣}}$ د ع

$= \frac{١}{٢} \int$ ع$^{-٣}$ د ع $= \frac{١}{-٢ \times ٢}$ ع$^{-٢}$ + ث

$= \frac{-١}{٤(\text{س}^{٢} + ٨\text{س})^{٢}}$ + ث

حاول أن تحل

(٢) أوجد :

(أ) $\int$ ٣س (س^{٢} + ٣)^{٤} د س

(ب) $\int \frac{\text{س}^{٢}}{(\text{س}^{٣} - ٤)^{٥}}$ د س

مثال التكامل بالتعويض

(٣) أوجد

(أ) $\int$ س (س + ٤)^{٧} د س

(ب) $\int$ (س^{٢} + ٥) $\sqrt{\text{س} - ١}$ د س

الحل

(أ) بوضع ع = س + ٤ ∴ س = ع - ٤ ، د س = د ع

$\int$ س (س + ٤)^{٧} د س $= \int$ ع^{٧} (ع - ٤) د ع $= \int$ (ع^{٨} - ٤ ع^{٧}) د ع (تعويض)

$= \frac{١}{٩}$ ع$^{٩} - \frac{١}{٢}$ ع^{٨} + ث (تكامل)

$= \frac{١}{١٨}$ ع^{٨} (٢ ع - ٩) + ث (تبسيط)

$= \frac{١}{١٨}$ (س + ٤)^{٨} (٢س - ١) (تعويض عن ع)

nezakr.natega4dk.net



ب بوضع $ع^{٢} = س - ١$ لتبسيط صورة التكامل ∴ $س = ع^{٢} + ١$ ، $و س = ٢ع\ و ع$

$\int (س^{٢} + ٥)\sqrt{س - ١}\ و س = \int [(ع^{٢} + ١)^{٢} + ٥] \times ع \times ٢ع\ و ع$ (تعويض)

$= \int [ع^{٤} + ٢ع^{٢} + ٦] \times ٢ع^{٢}\ و ع$

$= ٢\int (ع^{٦} + ٢ع^{٤} + ٦ع^{٢})\ و ع$ (تبسيط)

$= ٢ [\frac{١}{٧} ع^{٧} + \frac{٢}{٥} ع^{٥} + ٢ع^{٣}] + ث$ (تكامل)

$= \frac{٢}{٣٥} ع^{٣} [٥ع^{٤} + ١٤ ع^{٢} + ٧٠] + ث$ (عامل مشترك)

$= \frac{٢}{٣٥} (س - ١)^{\frac{٣}{٢}} [٥ (س - ١)^{٢} + ١٤ (س - ١) + ٧٠] + ث$ (التعويض عن ع)

$= \frac{٢}{٣٥} \sqrt{(س-١)^{٣}}\ (٥س^{٢} + ٤س + ٦١) + ث$

٩ حاول أن تحل

(٣) أوجد التكاملات الآتية:

أ $\int س\ (٢س - ٣)^{٤}\ و س$ ب $\int س^{٢} \sqrt{٣س + ١}\ و س$

مثال التكامل بالتعويض

(٤) أوجد:

أ $\int \frac{\sqrt{١ + \sqrt{س}}}{س}\ و س$ ب $\int ٦س\ هـ^{س^{٢}}\ و س$

الحل

أ بوضع $ع = ١ + \sqrt{س}$ ∴ $\sqrt{س} = ع - ١$ ، $س = (ع - ١)^{٢}$

$و س = ٢ (ع - ١)\ و ع$

$\int \frac{\sqrt{١ + \sqrt{س}}}{س}\ و س = \int \frac{\sqrt{ع}}{(ع-١)^{٢}} \times ٢ (ع - ١)\ و ع$ (بالتعويض)

$= \int ٢ع^{\frac{١}{٢}}\ و ع = ٢ \times \frac{٢}{٣} ع^{\frac{٣}{٢}} + ث$ (بالتكامل)

$= \frac{٤}{٣} (\sqrt{١ + \sqrt{س}})^{٣} + ث$ (بالتعويض عن ع)

ب بوضع $ع = س^{٢}$ ∴ $و ع = ٢س\ و س$

$\int ٦س\ هـ^{س^{٢}}\ و س = ٣\int هـ^{س^{٢}} (٢س\ و س)$

$= ٣\int هـ^{ع}\ و ع = ٣ هـ^{ع} + ث$ (التعويض والتكامل)

$= ٣ هـ^{س^{٢}} + ث$ (بالتعويض عن ع)

nezakr.nategа4dk.net

حاول أن تحل

(٤) أوجد :

(أ) $\int \frac{س}{\sqrt{١ - ٣س^{٢}}}$ د س

(ب) $\int$ (٣ - س) $هـ^{٦س - س^{٢}}$ د س

مثال التكامل بالتعويض

(٥) أوجد

(أ) $\int \frac{٥^{س}}{٣س^{٢} - ١}$ د س

(ب) $\int \frac{\sqrt{لو_{هـ} س}}{س}$ د س

الحل

(أ) بوضع ع = $٣س^{٢} - ١$ ، د ع = ٦س د س

$\int \frac{٥^{س}}{٣س^{٢} - ١}$ د س = $\frac{١}{٦}\int \frac{٦س د س}{٣س^{٢} - ١}$ = $\frac{١}{٦}\int \frac{١}{ع}$ د ع (التعويض)

= $\frac{١}{٦}$ لو$_{هـ}$ |ع| + ث = $\frac{١}{٦}$ لو$_{هـ}$ |$٣س^{٢} - ١$| + ث (التكامل والتعويض)

(ب) بوضع ع = لو$_{هـ}$ س ∴ د ع = $\frac{١}{س}$ د س

$\int \frac{\sqrt{لو_{هـ} س}}{س}$ د س = $\int \sqrt{لو_{هـ} س}$ ($\frac{١}{س}$ د س) = $\int ع^{\frac{١}{٢}}$ د ع (بالتعويض)

= $\frac{٢}{٣}ع^{\frac{٣}{٢}}$ + ث

= $\frac{٢}{٣}$[لو$_{هـ}$ (س)]$^{\frac{٣}{٢}}$ + ث (بالتكامل والتعويض)

حاول أن تحل

(٥) أوجد :

(أ) $\int \frac{هـ^{٢س}}{هـ^{٢س} + ٣}$ د س

(ب) $\int \frac{١}{س(لو_{هـ} س)^{٢}}$ د س

تفكير ناقد: باستخدام التكامل بالتعويض أثبت صحة قواعد التكامل التالية:

١- $\int$ [د (س)]^{ن} د′(س) د س = $\frac{[د(س)]^{ن+١}}{ن + ١}$ + ث ، حيث ن ≠ -١

٢- $\int \frac{د'(س)}{د(س)}$ د (س) = لو$_{هـ}$ |د(س)| + ث ، حيث د (س) ≠ ٠

التكامل بالتجزئ *Integration by Parts*

إذا كانت ص ، ع دالتين فى المتغير س وقابلتين للإشتقاق، فإن:

$\frac{د}{د س}$ (ص ع) = ص $\frac{د ع}{د س}$ + ع $\frac{د ص}{د س}$

بتكامل الطرفين بالنسبة إلى س


$\int \frac{د}{د س}$ (ص ع) د س = $\int$ ص $\frac{د ع}{د س}$ د س + $\int$ ع $\frac{د ص}{د س}$ د س

تذكر أن

د ع = $\frac{د ع}{د س}$ د س

د ص = $\frac{د ص}{د س}$ د س

nezakr.natega4dk.net



ص ع = ل ص ى ع + ل ع ى ص

أى أن: ل ص ى ع = ص ع - ل ع ى ص

تسمى المعادلة السابقة بقاعدة التكامل بالتجزىء ، وتستخدم لإيجاد تكامل حاصل ضرب دالتين ليست أحدهما مشتقة للأخرى، ذلك باختيار مناسب لكل من ص ، ع بحيث يمكن حساب التكامل بالطرف الأيسر بطريقة أسهل من حساب التكامل بالطرف الأيمن، وتتبع المخطط المقابل كما يتضح من الأمثلة التالية:

مثال التكامل بالتجزئ

٦ أوجد:

أ ل س هـ^س ى س ب ل س^٢ هـ^س ى س

الحل

أ لايجاد ل س هـ^س ى س:

نفرض أن: ص = س ، ى ع = هـ^س ى س

∴ ى ص = ى س ع = ل هـ^س ى س = هـ^س

∵ ل ص ى ع = ص ع - ل ع ى ص

∴ ل س هـ^س ى س = س هـ^س - ل هـ^س ى س = س هـ^س - هـ^س + ث = هـ^س (س - ١) + ث

ملاحظة هامة: إضافة ثابت إلى الدالة ع لا يغير من النتيجة (أثبت ذلك)

ب لإيجاد ل س^٢ هـ^س ى س:

نفرض أن: ص = س^٢ ، ى ع = هـ^س ى س

ى ص = ٢س ى ص ع = ل هـ^س ى س = هـ^س

ل س^٢ هـ^س ى س = س^٢ هـ^س - ل ٢س هـ^س ى س

= س^٢ هـ^س - ٢ ل س هـ^س ى س

ل س هـ^س ى س = هـ^س (س - ١) + ث من أ

= س^٢ هـ^س - ٢ هـ^س (س - ١) + ث

= هـ^س [س^٢ - ٢س + ٢] + ث

حاول أن تحل

٦ أوجد:

أ ل س هـ^-٢س ى س ب ل س^٢ هـ^س+٣ ى س

nezakr.natega4dk.net

لاحظ أن:

إختيار ص ، ﻭ ع يتوقف على:

١- ﻭ ص أبسط من ص

٢- ﻭ ع اسهل فى التكامل

مثال تكامل بالتجزىء

(٧) أوجد

(أ) $\int$ لو$_{هـ}$ س ﻭ س (ب) $\int$ س لو$_{هـ}$ س ﻭ س

الحل

(أ) بفرض أن : ص = لو$_{هـ}$ س ﻭ ص = $\frac{١}{س}$ ﻭ س ⟵ ع = $\int$ ﻭ س = س ، ﻭ ع = ﻭ س

$\int$ لو$_{هـ}$ س ﻭ س = س لو$_{هـ}$ س - $\int$ س × $\frac{١}{س}$ ﻭ س

= س لو$_{هـ}$ س - س + ث = س (لو$_{هـ}$ س - ١) + ث

(ب) نفرض أن: ص = لو$_{هـ}$ س ﻭ ص = $\frac{١}{س}$ ﻭ س ⟵ ع = $\int$ س ﻭ س = $\frac{١}{٢}$ س^{٢} ، ﻭ ع = س ﻭ س

$\int$ س لو$_{هـ}$ س ﻭ س = $\frac{١}{٢}$ س^{٢} لو$_{هـ}$ س - $\int \frac{١}{٢}$ س^{٢} × $\frac{١}{س}$ ﻭ س

= $\frac{١}{٢}$ س^{٢} لو$_{هـ}$ س - $\frac{١}{٤}$ س^{٢} + ث = $\frac{١}{٢}$ س^{٢} (لو$_{هـ}$ س - $\frac{١}{٢}$) + ث

حاول أن تحل

(٧) أوجد :

(أ) $\int$ لو$_{هـ}$ (س + ١) ﻭ س (ب) $\int$ (لو$_{هـ}$ س ÷ $\sqrt{س}$) ﻭ س

مثال تكامل بالتجزئ

(٨) أوجد:

(أ) $\int \frac{س\ هـ^{-س}}{(س+١)^{٢}}$ ﻭ س (ب) $\int \frac{٤س}{\sqrt[٣]{٢س+١}}$ ﻭ س

الحل

(أ) لاحظ أن (س + ١)$^{-٢}$ أسهل فى التكامل

بوضع ص = س هـ$^{-س}$ ، ﻭ ع = (س + ١)$^{-٢}$ ﻭ س

ﻭ ص = (س هـ$^{-س}$ + هـ$^{-س}$) ﻭ س ⟵ ع = $\frac{-١}{س+١}$

$\int \frac{س\ هـ^{-س}}{(س+١)^{٢}}$ ﻭ س = $-\frac{س\ هـ^{-س}}{س+١}$ - $\int \frac{-١}{س+١}$ × هـ$^{-س}$ (س + ١) ﻭ س

nezakr.natega4dk.net

$= -\frac{س\,هـ^{-س}}{-س+1} + \int هـ^{-س}\,د\,س$

$= \frac{-س\,هـ^{-س} + هـ^{-س}(-س+1)}{-س+1} + ث = \frac{هـ^{-س}}{-س+1} + ث$

ب بوضع ص = ٤س ⟵ $د\,ع = (٢س+1)^{-\frac{1}{3}}\,د\,س$

$د\,ص = ٤\,د\,س$ ⟵ $ع = \frac{٣}{٢\times٢}(٢س+1)^{\frac{2}{3}}$

$\int \frac{٤س}{\sqrt[3]{٢س+1}}\,د\,س = ٣س(٢س+1)^{\frac{2}{3}} - \int \frac{٣}{٤}(٢س+1)^{\frac{2}{3}}\times٤\,د\,س$

$= ٣س(٢س+1)^{\frac{2}{3}} - \frac{٣\times٣}{٢\times٥}(٢س+1)^{\frac{5}{3}} + ث$

$= \frac{٣}{١٠}(٢س+1)^{\frac{2}{3}}[١٠س - ٣(٢س+1)] + ث$

$= \frac{٣}{١٠}(٢س+1)^{\frac{2}{3}}(٤س-٣) + ث$

حاول أن تحل

٨ أوجد :

أ $\int \frac{٣س+٥}{هـ^{٢س}}\,د\,س$ ب $\int \frac{س}{\sqrt[3]{٢س+٣}}\,د\,س$

تفكير ناقد: هل يمكنك إيجاد $\int \frac{٤س}{\sqrt[3]{٢س+1}}\,د\,س$ بطريقة التكامل بالتعويض؟ فسر إجابتك.

بعض تطبيقات التكامل غير المحدد

إذا علمنا أن الدالة ر تعطى ميل المماس عند أى نقطة على منحنى الدالة د فإنه يمكن أن نعرف الدالة ت من عملية التكامل غير المحدد للدالة ر حيث: $د(س) = \int ر(س)\,د\,س$

يلاحظ أن هذا التكامل لا يعطى دالة وحيدة إذ يحتوى على ثابت اختيارى يمكن تحديده من البيانات المعطاة.

مثال

معادلة منحنى دالة

٩ إذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة د عند أى نقطة (س ، ص) واقعة عليه يعطى بالعلاقة $ر(س) = \frac{س\,هـ^{-س}}{(س+1)^{٢}}$ فأوجد معادلة المنحنى إذا كان يمر بالنقطة (١ ، ٢ هـ) .

الحل

بفرض أن معادلة منحنى الدالة هى ص = د(س)

$\therefore د(س) = \int \frac{س\,هـ^{-س}}{(س+1)^{٢}}\,د\,س = \frac{هـ^{-س}}{س+1} + ث$ [من حل مثال٨ (أ)]

∵ منحني د يمر بالنقطة (١ ، ٢ هـ) فهى تحقق معادلة $\therefore ٢هـ = \frac{هـ}{(1+1)} + ث$

$\therefore ث = \frac{٣}{٢}هـ$ وتكون $د(س) = \frac{هـ^{-س}}{-س+1} + \frac{٣}{٢}هـ$

$\therefore د(س) = \int ر(س)\,د\,س$

nezakr.nategа4dk.net

حاول أن تحل

(٩) أوجد معادلة المنحنى المار بالنقطة (٠ ، ١) والذى ميل المماس له عند أى نقطة (س ، ص) واقعة عليه يساوى $س\sqrt{س^٢+١}$

تمـــارين ٣ - ٢

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

(١) $\int$ س $(س^٢+٣)^٥$ د س يساوى

أ $\frac{١}{٦}(س^٢+٣)^٦+ث$ ب $\frac{١}{١٢}(س^٢+٣)^٦+ث$ ج $\frac{١}{٤}(س^٢+٣)^٤+ث$ د $\frac{١}{٨}(س^٢+٣)^٤+ث$

(٢) إذا كان $\int$ $(٢س+٣)$ لو$_{هـ}$ س د س = ص ع - $\int$ ع د ص فإن ص ع يساوى

أ ٢س لو$_{هـ}$ س ب $(٢س+٣)$ لو$_{هـ}$ س ج $\frac{١}{٢}(٢س+٣)$ لو$_{هـ}$ س د س $(س+٣)$ لو$_{هـ}$ س

(٣) إذا كان $\int$ $(٢س-١)$ هـ$^{٢س+٣}$ د س = ص ع - $\int$ ع د ص فإن $\int$ ع د ص

أ هـ$^{٢س+٣}+ث$ ب $\frac{١}{٢}$ هـ$^{٢س+٣}+ث$ ج - هـ$^{٢س+٣}+ث$ د $-\frac{١}{٢}$ هـ$^{٢س+٣}+ث$

باستخدام التعويض المناسب أوجد التكاملات الآتية:

(٤) $\int$ س $(س-٢)^٤$ د س (٥) $\int$ س^٢ $(س-٢)^٣$ د س (٦) $\int$ س^٣ $(س^٢-١)^٥$ د س

(٧) $\int$ س $\sqrt{س+٤}$ د س (٨) $\int$ $(س^٢-١)\sqrt{س+١}$ د س (٩) $\int$ س^٥ $(س^٢+٣)^٤$ د س

(١٠) $\int \frac{س}{(٣س^٢+٢)}$ د س (١١) $\int \frac{س}{س+١}$ د س (١٢) $\int \frac{س+١}{\sqrt{س-١}}$ د س

(١٣) $\int \frac{س^٢}{\sqrt{٢س-١}}$ د س (١٤) $\int$ س هـ$^{-س^٢}$ د س (١٥) $\int \frac{هـ^{-س}-١}{هـ^{-س}+س}$ د س

(١٦) $\int$ لو$_{هـ}$ س $\frac{د س}{س}$ (١٧) $\int \frac{(لو_{هـ} س)^٣ د س}{س}$ (١٨) $\int \frac{١}{س \text{ لو}_{هـ} س}$ د س

باستخدام التجزىء المناسب أوجد التكاملات الآتية:

(١٩) $\int$ ٤س هـ^{٢س} د س (٢٠) $\int$ س^٣ هـ$^{س^٢}$ د س (٢١) $\int \frac{س}{هـ^{٢س}}$ د س

(٢٢) $\int$ س^٣ لو$_{هـ}$ س د س (٢٣) $\int$ لو$_{هـ}$ س^٢ د س (٢٤) $\int$ $(لو_{هـ} س)^٢$ د س

(٢٥) $\int$ لو$_{هـ}$ س $\frac{د س}{س^٣}$ (٢٦) $\int$ $(س+١)^٢$ هـ^{٣س} د س (٢٧) $\int$ س $(لو_{هـ} س)^٢$ د س

أجب عن ما يأتى:

(٢٨) أوجد معادلة المنحنى الذى يمر بالنقطة أ (٢ ، ٣)، وميل العمودى عليه عند أى نقطة (س ، ص) هو ٣- س.

(٢٩) اذا كان ميل المماس لمنحنى عند نقطة (س ، ص) واقعة عليه هو $س\sqrt{س+١}$ أوجد معادلة المنحنى علمًا بأن المنحنى يمر بالنقطة $(٠ ، \frac{١١}{١٥})$

(٣٠) أوجد معادلة المنحنى ص = د (س) إذا كان $\frac{د^٢ س}{د س^٢}$ = أ س + ب حيث أ ، ب ثابتان وللمنحنى نقطة انقلاب عند النقطة (٠ ، ٢) وقيمة صغرى محلية عند النقطة (١ ، ٠) ثم أوجد القيمة العظمى المحلية لهذا المنحنى.

nezakr.natega4dk.net



٣ - ٣ التكامل المحدد

The Definite Integral

فكر و ناقش

إذا كانت ص = د(س) ، وميل المماس عند أى نقطة (س، ص) على منحنى الدالة د هو:

$$\frac{\text{و ص}}{\text{و س}} = \text{د}'(\text{س}) = ٢\text{س} + ٣$$

هل يمكنك تعيين قيمة محددة لكل من د(٣)، د(٥) ، د(٥) - د(٣) ؟ فسر إجابتك.

لاحظ أن

١ من تعريف التكامل غير المحدد:

$$\text{ص} = \int \text{د}'(\text{س})\ \text{و س} = \text{د}(\text{س}) + \text{ث}$$

حيث ث مقدار ثابت إختيارى لا يتوقف على س ومن الضرورى الاحتفاظ به فى التكامل حتى يكون شاملاً لجميع الدوال التى معدل تغيرها هو د(س) وعلى ذلك فإن التكامل غير المحدد لاينتج قيمة محددة تناظر قيمة معينة للمتغير س .

٢ إذا كانت قيمة التكامل عند س = أ هى د(أ) + ث

وقيمته عند س = ب هى د(ب) + ث

∴ الفرق بين قيمتى التكامل عند س = أ ، س = ب

يساوى د(ب) - د(أ) وهو قيمة معينة (مهما كانت قيمة المقدار الثابت ث)

ويرمز له بالرمز $\int_{\text{أ}}^{\text{ب}} \text{د}'(\text{س})\ \text{و س}$ حيث :

$$\int_{\text{أ}}^{\text{ب}} \text{د}'(\text{س})\ \text{و س} = \text{د}(\text{ب}) - \text{د}(\text{أ})$$

وتعرف هذه الصورة بالتكامل المحدد.

سوف تتعلم

- مفهوم التكامل المحدد.
- استخدام النظرية الأساسية فى التفاضل والتكامل لإيجاد التكامل المحدد.
- بعض خواص التكامل المحدد.

المصطلحات الأساسية

- تكامل محدد — Definite Integral

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

تعلم

النظرية الأساسية فى التفاضل
Foundamental Theorem of Calculus

إذا كانت الدالة د متصلة على الفترة [أ ، ب] ، وكانت ت أى مشتقة عكسية للدالة د على نفس الفترة، فإن:

$$\int_{أ}^{ب} د(س)\,ى\,س = ت(ب) - ت(أ)$$

ملاحظات:

١ يسمى $\int_{أ}^{ب} د(س)\,ى\,س$ بالتكامل المحدد، و يقرأ تكامل د(س) بالنسبة إلى س من أ إلى ب، وهو عدد حقيقى تتوقف قيمته على:

(أ) الحدان السفلى والعلوى للتكامل المحدد أى على العددين أ، ب على الترتيب.

(ب) قاعدة الدالة د

أما رمز المتغير س فيمكن استبداله بأى رمز آخر دون أن يؤثر ذلك على مقدار التكامل، أى أن:

$$\int_{أ}^{ب} د(س)\,ى\,س = \int_{أ}^{ب} د(ص)\,ى ص = \int_{أ}^{ب} د(ع)\,ى\,ع \ldots\ldots$$

ولذلك نكتب أحيانًا

$$\int_{أ}^{ب} د(س)\,ى س = \int_{أ}^{ب} د$$

٢ يعبر عن ت(ب) - ت(أ) بالصورة $[ت(س)]_{أ}^{ب}$ أو $ت(س)|_{أ}^{ب}$

٣ يمكن الحصول على التكامل المحدد بإيجاد التكامل غير المحدد مع إهمال ثابت التكامل (لماذا)؟ ثم التعويض عن المتغير بحدى التكامل.

٤ تطبق جميع قواعد التكامل غير المحدد وجدول التكاملات القياسية عند إيجاد قيمة التكامل المحدد لدالة متصلة، فإذا كانت د، ر دالتين متصلتين على الفترة [أ، ب]

فإن:

- $\int_{أ}^{ب} [د(س) \pm ر(س)]\,ى\,س = \int_{أ}^{ب} د(س)\,ى\,س \pm \int_{أ}^{ب} ر(س)\,ى\,س$
- $\int_{أ}^{ب} ك\,د(س)\,ى\,س = ك \int_{أ}^{ب} د(س)\,ى\,س$ حيث ك ∈ ع

مثال حساب قيمة تكامل محدد

(١) أوجد التكامل المحدد للدالة د من س = -٢ إلى س = ٤ حيث د(س) = ٣س^{٢} - ٢

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

الحل

الدالة د كثيرة الحدود متصلة على ع

∴ $\int_{-2}^{-1} (3س^2 - 2) \, د س = [س^3 - 2س]_{-2}^{-1}$

$= [(-1)^3 - 2(-1)] - [(-2)^3 - (-4)]$

$= 1 - 8 + 8 - 4 = 7 \in ع$

حاول أن تحل

(١) أوجد قيمة كل مما يأتى:

أ $\int_{-1}^{2} (2س + 3) \, د س$ ب $\int_{0}^{3} \frac{1}{\sqrt{4 + ن}} \, د ن$ ج $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} جتا \theta \, د \theta$

نظرية إذا كانت الدالة د متصلة على الفترة [أ، ب] فإنها تكون قابلة للتكامل على هذه الفترة.

تفكير ناقد

ما الفرق بين التكامل المحدد والمتكامل غير المحدد؟ فسر إجابتك.

خواص التكامل المحدد

Properties of Definite Integral

إذا كانت د دالة متصلة على [أ، ب]، جـ ∈] أ، ب [، فإن:

١- $\int_{ب}^{أ} د(س) \, د س = -\int_{أ}^{ب} د(س) \, د س$

٢- $\int_{أ}^{أ} د(س) \, د س = 0$

٣- $\int_{أ}^{ب} د(س) \, د س = \int_{أ}^{جـ} د(س) \, د س + \int_{جـ}^{ب} د(س) \, د س$

مثال حساب قيمة تكامل محدد

(٢) إذا كانت د دالة متصلة على ع، $\int_{1}^{3} د(س) \, د س = 6$ ، $\int_{5}^{3} د(س) = -14$ أوجد $\int_{1}^{5} د(س) \, د س$

الحل

∵ د متصلة على ع ، س = ٣ تجزىء الفترة [١، ٥]

∴ $\int_{1}^{5} د(س) \, د س = \int_{1}^{3} د(س) \, د س + \int_{3}^{5} د(س) \, د س$ خاصية (٣)

$= \int_{1}^{3} د(س) \, د س - \int_{5}^{3} د(س) \, د س$ خاصية (١)

$= 6 - (-14) = 20$

حاول أن تحل

(٢) إذا كانت د دالة متصلة على ع، $\int_{-1}^{4} د(س) \, د س = 255$، $\int_{2}^{-1} د(س) \, د س = -15$ فأوجد: $\int_{2}^{4} د(س) \, د س$

nezakr.nateg4dk.net

مثال حساب قيمة تكامل محدد

(٣) أوجد $\int_{-٥}^{٣} |س - ٣|\, د س$

الحل


من تعريف دالة المقياس نجد أن $|س - ٣| = \begin{cases} -(س - ٣) & \text{عندما } س < ٣ \\ س - ٣ & \text{عندما } س \geq ٣ \end{cases}$ ، د متصلة عند $س = ٣$

$$\int_{-٥}^{٣} |س - ٣|\, د س = \int_{-٥}^{٣} |س - ٣|\, د س + \int_{٣}^{٥} |س - ٣|\, د س$$

$$= \int_{-٥}^{٣} (٣ - س)\, د س + \int_{٣}^{٥} (س - ٣)\, د س$$

$$= [٣س - \frac{س^٢}{٢}]_{-٥}^{٣} + [\frac{س^٢}{٢} - ٣س]_{٣}^{٥}$$

$$= (٩ - \frac{٩}{٢}) + (\frac{٢٥}{٢} - ١٥ + \frac{٩}{٢}) = \frac{١٣}{٢}$$



لاحظ أن المساحة الملونة تساوى $\frac{١٣}{٢}$ وحدة مربعة

حاول أن تحل

(٣) أوجد:

(أ) $\int_{-٤}^{٢} |س + ١|\, د س$ (ب) $\int_{-٣}^{٣} |س^٢ - ٤|\, د س$

مثال حساب قيمة تكامل محدد بالتعويض

(٤) أوجد قيمة $\int_{٣}^{٣} س \sqrt{س^٢ + ٣}\, د س$

الحل

يمكن الحصول على التكامل المحدد بإيجاد التكامل غير المحدد أولًا، ثم التعويض عن المتغير س بحدى التكامل:

أولًا:

لإيجاد $\int س \sqrt{س^٢ + ٣}\, د س$ نضع $ع = س^٢ + ٣$ $\therefore د ع = ٢س\, د س$

$\therefore \int س \sqrt{س^٢ + ٣}\, د س = \frac{١}{٢} \int \sqrt{س^٢ + ٣} (٢س\, د س) = \frac{١}{٢} \int \sqrt{ع}\, د ع$ (تعويض)

$= \frac{١}{٢} \int ع^{\frac{١}{٢}}\, د ع = \frac{١}{٢} \times \frac{٢}{٣} ع^{\frac{٣}{٢}} + ث$ (تكامل)

$= \frac{١}{٣} \sqrt{(س^٢ + ٣)^٣} + ث$ (تعويض عن ع)

ثانيًا:

$$\int_{٣}^{٣} س \sqrt{س^٢ + ٣}\, د س = [\frac{١}{٣} \sqrt{(س^٢ + ٣)^٣}]_{٣}^{٣}$$

$$= \frac{١}{٣} [\sqrt{(١٢)^٣} - \sqrt{(٣)^٣}] = ٧\sqrt{٣}$$

nezakr.natega4dk.net



حاول أن تحل

(٤) أوجد:

(أ) $\int_{0}^{5} س \sqrt{٢٥ - س^{٢}}$ د س

(ب) $\int_{-٢}^{٢} س^{٣} \sqrt{س^{٢} + ٣}$ د س

لاحظ أن

١- يمكن حل مثال ٤ مباشرة بإيجاد قيم ع المناظرة لقيم حدى المتكامل (س = ٠ ، س = ٣)

عند س = ٠ ∴ ع = ٣ ، عند س = ٣ ع = ١٢

∴ $\int_{0}^{٣} س \sqrt{س^{٢} + ٣}$ د س = $\frac{١}{٢} \int_{٣}^{١٢} ع^{\frac{١}{٢}}$ د ع = $[\frac{١}{٣} ع^{\frac{٣}{٢}}]_{٣}^{١٢}$

= $\frac{١}{٣} [\sqrt{(١٢)^{٣}} - \sqrt{(٣)^{٣}}] = ٧ \sqrt{٣}$

٢- في بند **حاول أن تحل** ٤ ب: د(س) = $س^{٣} \sqrt{س^{٢} + ٣}$ دالة فردية

وفي بند **حاول أن تحل** ٣ب: د(س) = |$س^{٢}$ - ٤| دالة زوجية

للدوال الفردية والدوال الزوجية فى التكامل المحدد الخواص التالية:

١- إذا كانت الدالة د متصلة وفردية على الفترة [-أ ، أ] فإن:

$\int_{-أ}^{أ}$ د(س) د س = صفرًا

٢- إذا كانت الدالة د متصلة وزوجية على الفترة [-أ ، أ] فإن:

$\int_{-أ}^{أ}$ د(س) د س = ٢ $\int_{٠}^{أ}$ د(س) د س

باستخدام الخواص السابقة تحقق من صحة إجابتك فى حاول أن تحل ٣، ٤

مثال **التكامل المحدد للدوال الفردية والزوجية**

(٥) أوجد:

(أ) $\int_{-٢}^{٢} \frac{س^{٣} - ٣س}{س^{٢} + ١}$ د(س)

(ب) $\int_{-٣}^{٣} (س^{٢} - ١)$ د س

الحل

(أ) د دالة متصلة على ع

∵ د(-س) = $\frac{(-س)^{٣} - ٣(-س)}{(-س)^{٢} + ١} = - \frac{س^{٣} - ٣س}{س^{٢} + ١}$ = - د(س)

∴ د دالة فردية ويكون: $\int_{-٢}^{٢} \frac{س^{٣} - ٣س}{س^{٢} + ١}$ = صفر

nezakr.natega4dk.net

(ب) د دالة كثيرة الحدود متصلة على ع

∵ د(-س) = (-س)^{٢} - ١ = س^{٢} - ١ = د(س)

∴ د دالة زوجية ويكون: $\int_{-٣}^{٣}$ (س^{٢} - ١) ﻫ س = ٢ $\int_{٠}^{٣}$ (س^{٢} - ١) ﻫ س

= ٢ [$\frac{١}{٣}$ س^{٣} - س]$_{٠}^{٣}$ = ٢ × ٦ = ١٢

حاول أن تحل

(٥) أوجد

(أ) $\int_{-٣}^{٣} \frac{س}{١ + س^{٢}}$ ﻫ س

(ب) $\int_{-\pi}^{\pi}$ (٤ + π جتا ٢س) ﻫ س

تفكير ناقد

١ إذا كانت د دالة فردية متصلة على الفترة [-٣ ، ٥] ، $\int_{-٣}^{٥}$ د(س) ﻫ س = ٩ ما قيمة $\int_{-٣}^{٥}$ د(س) ﻫ س ؟

٢ إذا كانت د دالة زوجية متصلة على الفترة [-٤، ٤] ، $\int_{-٤}^{٤}$ د(س) ﻫ س = ٢٠

$\int_{٠}^{٢}$ د(س) ﻫ س = ٦ ، ما قيمة $\int_{-٤}^{-٢}$ د(س) ﻫ س ؟

nezakr.nateg4dk.net

تمـــاريـن ٣- ٣

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

(١) إذا كان $\int_{-٢}^{٣} د(س)\,و\,س = ١٢$، $\int_{-٢}^{٥} د(س)\,و\,س = ١٦$ فإن $\int_{٣}^{٥} د(س)\,و\,س$ يساوى:

أ) -٢٨ ب) -٤ ج) ٤ د) ٢٨

(٢) إذا كانت $د(س) = |س|$، فإن $\int_{-٢}^{٢} د(س)\,و\,س$ يساوى:

أ) -١ ب) صفر ج) ٢ د) ٤

أوجد قيمة كل مما يأتى:

(٣) $\int_{-١}^{٣} س^{٣}\,و\,س$ (٤) $\int_{١}^{٣} (٣س^{٢} - ٢)\,و\,س$ (٥) $\int_{٠}^{٤} (٢س + ١)^{\frac{٣}{٢}}\,و\,س$

(٦) $\int_{٤}^{٠} \frac{و\,ن}{\sqrt{٨ - ن}}$ (٧) $\int_{٠}^{٢} س(س^{٢} - ٣)^{٢}\,و\,س$ (٨) $\int_{٠}^{٢} س^{٢}\sqrt[٣]{س^{٣} + ١}\,و\,س$

(٩) $\int_{-١}^{٣} |س - ١|\,و\,س$ (١٠) $\int_{-٤}^{٠} س\,(س + ٤)^{٣}\,و\,س$ (١١) $\int_{-١}^{٣} س\sqrt{س + ١}\,و\,س$

(١٢) $\int_{٠}^{١} ٢\,جا\,\pi ع\,و\,ع$ (١٣) $\int_{٠}^{\frac{\pi}{٤}} ظا\,ع\,قا^{٢}\,ع\,و\,ع$ (١٤) $\int_{٠}^{٣} (٢س - ٧هـ^{س})\,و\,س$

أجب عن ما يأتى:

(١٥) إذا كان $\int_{١}^{٥} د(س)\,و\,س = ١٠$، $\int_{١}^{٥} ر(س)\,و\,س = -٢$ احسب قيمة

أ) $\int_{١}^{٥} [د(س) + ر(س)]\,و\,س$ ب) $\int_{١}^{٥} [د(س) - ر(س)]\,و\,س$ ج) $\int_{٥}^{١} ٣\,ر(س)\,و\,س$

(١٦) إذا كان د دالة متصلة على الفترة $[-٤ ، ٤]$، $\int_{٠}^{٤} د(س)\,و\,س = ٣$، احسب قيمة

أ) $\int_{٠}^{٤} [د(س) + ٢]\,و\,س$ ب) $\int_{-٤}^{٤} د(س)\,و\,س$، د فردية ج) $\int_{-٤}^{٤} د(س)\,و\,س$، د زوجية

(١٧) إذا كانت $د(س) = \begin{cases} ٢ & \text{عندما } س < ٢ \\ س & \text{عندما } س \geq ٢ \end{cases}$ أوجد $\int_{٠}^{٦} د(س)\,و\,س$

nezakr.nategа4dk.net



٤ - ٣ تطبيقات على التكامل المحدد

أولا: المساحات في المستوى

سوف تتعلم

- التعرف على المساحة كتكامل محدد.
- إيجاد المساحة المحددة بمنحنى دالة ومحور السينات على فترة مغلقة.
- إيجاد حجم دورانى ناتج عند دوران منطقة محددة بمنحنيين حول محور السينات.

المصطلحات الأساسية


مساحة	Area
وحدة مربعة	Unite Squared
محور الدوران	Axis of Revolution
مجسم دورانى	Solid of Revolution

الأدوات المستخدمة

- آلة حاسبة علمية
- برامج رسومية للحاسب الآلى

فكر و ناقش

١- احسب المساحة الملونة فى كل من الأشكال التالية هندسيًا.



الشكل (١) الشكل (٢) الشكل (٣)

٢- لكل من الأشكال السابقة احسب $\int_{أ}^{ب}$ د(س) ﻫ س حيث د(س) معادلة المنحنى، والمستقيمان س = أ ، س = ب يحدان المنطقة الملونة.

٣- قارن بين مساحة كل شكل وناتج التكامل المحدد له، ماذا تستنتج؟

مساحة منطقة محددة بمنحنى الدالة د ومحور السينات فى الفترة [أ، ب]


نظرية

إذا كانت د دالة متصلة على الفترة [أ، ب] ، م مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة د ومحور السينات والمستقيمين س = أ ، س = ب فإن:

$$م = \int_{أ}^{ب} |د(س)| \, ﻫ \, س$$

مثال المساحة تحت المنحنى

(١) يبين الشكل المقابل منحنى الدالة د حيث د(س) = ١ + ٤س - س^{٢} أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة ومحور السينات والمستقيمين س = ١، س = ٤



نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

الحل

د متصلة على الفترة [١، ٤] ، د(س) > ٠ لكل س ∈ [١، ٤]

∴ م = $\int_{١}^{٤}$ د(س) ى س = $\int_{١}^{٤}$ (١ + ٤س - س^{٢}) ى س

= [س + ٢س^{٢} - $\frac{١}{٣}$ س^{٣}]$_{١}^{٤}$ = [٤ + ٣٢ - $\frac{٦٤}{٣}$] - [١ + ٢ - $\frac{١}{٣}$]

= ٣٦ - $\frac{٦٤}{٣}$ - ٣ + $\frac{١}{٣}$ = ١٢ وحدة مربعة

حاول أن تحل

(١) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة د ومحور السينات والمستقيمين س = -١، س = ٢ حيث د(س) = ٣س^{٢} + ١

مثال **المساحة فوق محور السينات ومنحنى دالة**

(٢) أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة د: د(س) = $\sqrt{٢ س + ٢}$ والمستقيم س = ٣ وفوق محور السينات.

الحل

نوجد أصفار الدالة بوضع د(س) = ٠

∴ $\sqrt{٢ س + ٢}$ = ٠ أى أن: س = -١



∴ المساحة المطلوبة م = $\int_{-١}^{٣}$ د(س) ى س

= $\int_{-١}^{٣}$ (٢س + ٢)$^{\frac{١}{٢}}$ ى س = [$\frac{٣}{٤ \times ٢}$ (٢س + ٢)$^{\frac{٣}{٢}}$]$_{-١}^{٣}$


= $\frac{٣}{٨}$ [٨$^{\frac{٣}{٢}}$ - ٠] = $\frac{٣}{٨}$ (٣٢)$^{\frac{٣}{٢}}$ = ٦ وحدات مربعة

حاول أن تحل

(٢) أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة د: د(س) = $\frac{٤س}{س^{٢} + ١}$ والمستقيم س = ٤ وتقع فوق محور السينات.

مثال **المساحة بين منحنى ومحور السينات**

(٣) إذا كانت د:]-∞، ٣] ← ع حيث د(س) = س^{٣} - ٤س أوجد مساحة المنطقة المحددة بمنحنى الدالة ومحور السينات وتقع أعلى محور السينات.



nezakr.nategа4dk.net

الحل

نوجد نقط تقاطع منحنى الدالة مع محور السينات (أصفار الدالة)

د(س) = س^{٣} - ٤س = س(س^{٢} - ٤) = س (س - ٢) (س + ٢)

عندما د(س) = ٠ ∴ س = ٠ أو س = ٢ أو س = -٢



بدراسة إشارة الدالة د نجد


د(س) ⩽ ٠ على الفترة [-٢، ٠] وعلى الفترة [٢، ٣]

∴ المساحة م = م$_{١}$ + م$_{٢}$ = $\int_{-٢}^{٠}$ (س^{٣} + ٤س) ى س + $\int_{٢}^{٣}$ (س^{٣} - ٤س) ى س

= $\frac{١}{٤}$ س^{٤} - ٢س^{٢}]$_{-٢}^{٠}$ + [$\frac{١}{٤}$ س^{٤} - ٢س^{٢}]$_{٢}^{٣}$

= (٠ - (-٤)) + ($\frac{٨١}{٤}$ - ١٨ - (-٤))

= $\frac{١٢١}{٤}$ وحدة مربعة



ملاحظة هامة

لتعيين المساحة بين منحنى الدالة ومحور السينات والمستقيمين س = -٢ ، س = ١ كما فى الرسم المقابل.

نجد أن:

د(س) ⩽ ٠ عندما س ∈ [-٢، ٠]، د(س) ⩾ ٠ عندما س ∈ [٠، ١]

∴ المساحة م = م$_{١}$ + م$_{٢}$

= $\int_{-٢}^{٠}$ (س^{٣} - ٤س) ى س + | $\int_{٠}^{١}$ (س^{٣} - ٤س) ى س |

= [$\frac{١}{٤}$ س^{٤} - ٢س^{٢}]$_{-٢}^{٠}$ + | $\frac{١}{٤}$ س^{٤} - ٢س^{٢}]$_{٠}^{١}$ |

= ٤ + |($\frac{١}{٤}$ - ٢) - ٠ | = ٤ + |-$\frac{٧}{٤}$ | = $\frac{٢٣}{٤}$ وحدة مربعة.

حاول أن تحل

(٣) أوجد مساحة المنطقة المستوية المحددة بالمنحنى ص = ٣ + ٢س - س^{٢} ومحور السينات.

تفكير ناقد

أوجد مساحة المنطقة المستوية المحددة بالمنحنى ص = ٣ + ٢س - س^{٢} والمستقيمات س = -١، س = ٤ ، ص = ٠

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net

مثال تطبيقات معمارية للمساحة

(٤) صمم مهندس مدخل فندق على شكل قوس معادلته ص = - $\frac{١}{٣}$ (س - ١) (س - ٧) حيث س بالأمتار فإذا غُطى هذا المدخل بزجاج تكلفة المتر المربع الواحد منه ١٥٠٠ جنيه كم تكون تكلفة الزجاج؟

الحل


نمذجة المسألة:

تكاليف زجاج مدخل الفندق = مساحة الزجاج بالأمتار المربعة × تكلفة المتر المربع الواحد

بفرض أن التكاليف الكلية ك جنيهًا ، مساحة الزجاج م متر مربع

∴ ك = ١٥٠٠ م ①

إيجاد مساحة الزجاج:



باعتبار المستوى الأفقى محورًا للسينات معادلته ص = ٠ ومعادلة قوس مدخل الفندق ص = د(س) حيث:

د(س) = - $\frac{١}{٣}$ (س - ١) (س - ٧)

∴ عند د(س) = ٠ فإن: س = ١ أو س = ٧

فتكون د(س) ⩾ ٠ لكل س ∈ [١، ٧]

المساحة م = $\int_{١}^{٧}$ - $\frac{١}{٣}$ (س - ١) (س - ٧) ى س = $\int_{١}^{٧}$ (- $\frac{١}{٣}$ س^{٢} + ٤س - $\frac{٧}{٣}$) ى س

= [- $\frac{١}{٩}$س^{٣} + ٢س^{٢} - $\frac{٧}{٣}$س]$_{١}^{٧}$ = $\frac{٤٩}{٣}$ - (- $\frac{٥}{٣}$) = ١٨ ②

من ① ، ②

∴ ك = ١٥٠٠ × ١٨ = ٢٧٠٠٠

أى أن: تكلفة تغطية مدخل الفندق بالزجاج تساوى ٢٧٠٠٠ جنيه

حاول أن تحل

(٤) إذا كانت تكلفة تغطية المتر المربع الواحد من أرضية ممرات الفندق بالجرانيت ٤٠٠ جنيه وتم تغطية ٥ممرات متطابقة بالجرانيت مساحة كل منها محدودة بمنحنى الدالة د، والمستقيمين س = ٠ ، ص = ٠ حيث د(س) = ١٢ - $\frac{١}{٣}$ س^{٢}. **أوجد تكلفة تغطية الممرات الخمسة.**

nezakr.nategа4dk.net

ثانيًا: حجوم الأجسام الدورانية


فكر و ناقش



هل شاهدت صانع الفواخير وهو يحول التراب إلى تحف وأوانى طهى طعام بخلط الطين الأسوانى بالماء وتقطيعه ووضعه حول محور يدور؛ فيشكله بأصابعه وأدواته؛ لينتج أجسامًا ذات أشكال جذابة. بما تسمى هذه الأجسام؟


- تصمم العبوات البلاستيكية لتعبئة المياة الغازية والعصائر والزيوت بأحجام مختلفة وسعات متعددة. كيف يمكن حساب حجمها أو سعتها عند تصميمها؟


المجسم الدورانى *Solid of Revolution*



ينشأ المجسم الدورانى من دوران منطقة مستوية دورة كاملة حول مستقيم ثابت فى مستويها يسمى «محور الدوران».

توضح الأشكال التالية أمثلة لمجسمات دورانية ترسمها المساحة م عند دورانها دورة كاملة حول المستقيم ل





كرة | أسطوانة قائمة | مخروط قائم

نتيجة نت
nezakr.natega4dk.net


حجم الجسم الناشئ من دوران منطقة مستوية حول محور السينات.

نظرية

إذا كانت د دالة متصلة على الفترة [أ، ب] ، د(س) ⩾ ٠ لكل س ∈ [أ، ب] فإن حجم الجسم الناشئ من دوران المساحة المحددة بالمنحنى ص = د(س) ومحور السينات والمستقيمين س = أ ، س= ب دورة كاملة حول محور السينات هو: ح = $\pi \int_{أ}^{ب} [د(س)]^{٢}$ ﻫ س

مثال

دوران حول محور السينات




٥ أوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المستوية المحددة بمنحنى الدالة د ومحور السينات والمستقيمين س = -١، س = ١ دورة كاملة محور السينات علمًا بأن د(س) = س٢ + ١

الحل:

الدالة د كثيرة الحدود متصلة على الفترة [-١، ١]،

د(س) ⩾ ٠ لكل س ∈ [أ، ب]

بفرض أن حجم الجسم الناشئ من الدوران = ح



∴ ح = $\pi \int_{-١}^{١} (س^{٢} + ١)^{٢}$ ﻫ س

= $\pi \int_{-١}^{١} (س^{٤} + ٢س^{٢} + ١)$ ﻫ س

= $\pi [\frac{١}{٥} س^{٥} + \frac{٢}{٣} س^{٣} + س]_{-١}^{١} = \frac{٥٦}{١٥} \pi$ وحدة مكعبة

حاول أن تحل


٥ أوجد حجم الجسم الناشء من دوران المنطقة المستوية المحددة بمنحنى الدالة د ومحور السينات والمستقيمين س = ٠ ، س = ٣ دورة كاملة حول محور السينات علمًا بأن د(س) = س ما اسم المجسم الناشئ؟ بين كيف نتحقق هندسيًّا من صحة إجابتك.

مثال

تطبيقات الحجوم

٦ باستخدام التكامل أثبت أن حجم المخروط الدائرى القائم يساوى $\frac{\pi}{٣}$ نق٢ ع حيث نق طول نصف قطر قاعدته، ع ارتفاعه.


الحل:



ينتج المخروط الدائرى القائم عن دوران مثلث قائم الزاوية بحيث يقع أحد ضلعى القائمة على محور السينات دورة كاملة حول محور السينات.

nezakr.natega4dk.net

نوجد العلاقة بين س ، ص = د(س)



ظا $\theta = \frac{ص}{س}$ (١) ∴ ص = س ظا θ = د(س)

∵ ح = $\pi \int_{ا}^{ب} [د(س)]^٢$ ى س = $\pi \int_{ا}^{ع} س^٢$ ظا$^٢ \theta$ ى س

= $[\frac{\pi}{٣} س^٣ ظا^٢ \theta]_{ا}^{ع} = \frac{\pi}{٣} ع^٣ ظا^٢ \theta$ (٢)

من (١) ظا $\theta = \frac{ص}{س} = \frac{نق}{ع}$

∴ ظا$^٢ \theta = \frac{نق^٢}{ع^٢}$

بالتعويض فى (٢) ∴ ح = $\frac{\pi}{٣} \frac{نق^٢}{ع^٢} \times ع^٣ = \frac{\pi}{٣} نق^٢ ع$

حاول أن تحل

(٦) باستخدام التكامل أثبت أن:

(أ) حجم الكرة = $\frac{٤}{٣} \pi$ نق^٣ (نق طول نصف قطر الكرة)

(ب) حجم الأسطوانة الدائرية القائمة = π نق^٢ ع

(نق طول نصف قطر قاعدة الأسطوانة ، ع ارتفاعها)

تذكر أن

معادلة الدائرة التى مركزها نقطة الأصل (٠، ٠) وطول نصف قطرها (نق) هى:
س^٢ + ص^٢ = نق^٢

مثال

دوران حول محور السينات

(٧) أوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى $\frac{س^٢}{ا^٢} + \frac{ص^٢}{ب^٢} = ١$ ومحور السينات، حيث ا، ب ثابتان، دورة كاملة حول محور السينات.

الحل:

∵ الدوران حول محور السينات ∴ ص^٢ = ب^٢ (١ - $\frac{س^٢}{ا^٢}$)

حدود التكامل:

ص = ٠ ∴ س^٢ = ا^٢ أى أن س = - ا ، س = ا (لماذا؟)

ح = $\pi \int_{-ا}^{ا} ب^٢ (١ - \frac{س^٢}{ا^٢})$ ى س = ٢ π ب$^٢ \int_{ا}^{ا} (١ - \frac{س^٢}{ا^٢})$ ى س

= ٢ π ب$^٢ [س - \frac{س^٣}{ا^٢ ٣}]_{ا}^{ا}$ = ٢ π ب$^٢ [ا - \frac{١}{٣} ا]$

= $\frac{٤}{٣} \pi$ ب^٢ ا وحدة مكعبة.

حاول أن تحل


(٧) أوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى ص = ٢س - س^٢ ومحور السينات، دورة كاملة حول محور السينات.

nezakr.natega4dk.net


تمـاريـن ٣ - ٤

اكتب التكامل المحدد الذى يعطى المساحة الملونة فى كل مما يأتى واحسب قيمته.


(١)




(٢)



(٣)



(٤)



اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.

(٥) مساحة المنطقة المحددة بالمستقيمات ص = س، س = ٢ ، ص = ٠ ؛ تساوى:

أ) ½ ب) ١

جـ) ٢ د) ٤

(٦) مساحة المنطقة المحددة بالمنحنى ص = س^{٣} والمستقيمات ص = ٠، س = ٢ تساوى

أ) ٨ ب) ٤ جـ) ٢ د) ١

(٧) حجم الجسم الناشىء من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى ص = ٢√س ، ص = ٠ ، س = ١ دورة كاملة حول محور السينات يساوى

أ) $-\pi$ ب) ٠ جـ) π د) $\pi ٢$

(٨) حجم الجسم الناشىء من دوران المنطقة المحددة بالمنحنى ص = √(س + ١) والمستقيمات ص = ٠ ، س = -١، س = ١ دورة كاملة حول محور السينات يساوى

أ) $\frac{\pi ٣}{٢}$ ب) $\frac{\pi ٥}{٢}$ جـ) π د) $\pi ٢$

فى كل مما يأتى إحسب مساحة المنطقة المستوية المحصورة بين:

(٩) المنحنى ص = ٥ - س^{٢} ومحور السينات والمستقيمين س = -٢ ، س = ١

nezakr.nateg4dk.net

(١٠) المستقيمات: س + ٢ص = ٩ ، س = ١ ، س = ٣ ، ص = ٠

(١١) المنحنى ص = $\sqrt{س + ٤}$ والمستقيمات س = ٠ ، س = ٥ ، ص = ٠

(١٢) المنحنى ص = ٣ - ٢س - $س^{٢}$ ومحور السينات

(١٣) المنحنى ص = $\frac{٤}{س^{٢}}$ والمستقيمات س = ١ ، س = ٤ ، ص = ٠

(١٤) منحنى الدالة د: د(س) = (٣ - س) $(س - ١)^{٢}$ ومحورى الاحداثيات حيث د(س) ≤ ٠

(١٥) منحنى الدالة د: د(س) = (س - ١) (س - ٢) (س - ٣) والمستقيمين س = ٤، ص = ٠ حيث د(س) ≤ ٠

أوجد حجم الجسم الناشئ من دوران المنطقة المحددة بالمنحنيات والمستقيمات المعطاة دورة كاملة حول محور السينات فى كل مما يأتى:

(١٦) ص = س ، س = ٣ ، ص = ٠

(١٧) ص = ٣ - س ، س = ٠ ، ص = ٠

(١٨) ص = $\frac{١}{س}$ ، س = ١ ، س = ٤ ، ص = ٠

(١٩) ص = |س| ، س = -٢ ، س = ٤ ، ص = ٠

nezakr.natega4dk.net